

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK {DOBOZ}

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Elülső oldal: ProtecTix 400 mg/2000 mg rácsepegtető oldat kutyák számára

Hátoldal: ProtecTix 400 mg/2000 mg rácsepegtető oldat 25–40 kg közötti kutyák számára

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Tartalma 4,0 ml-es pipettánként:

400 mg imidakloprid

2000 mg permetrin

3. KISZERELÉSI EGYSÉG

1 x 4,0 ml
2 x 4,0 ml
3 x 4,0 ml
4 x 4,0 ml
6 x 4,0 ml
12 x 4,0 ml
24 x 4,0 ml

4. CÉLÁLLAT FAJOK



25 - 40 kg

5. JAVALLATOK

[A doboz elülső oldalára kerülő szöveg:]

- Elpusztítja a kullancsokat, bolhákat és szórtetveket
- Elriasztja a kullancsokat, szúnyogokat, lepkeszúnyogokat, valamint szuronyos istállólegyeket
- Mérsékli a kutya leishmaniosis és a kutya ehrlichiosis fertőzés kockázatát.

6 parazita piktogramja: kullancs, bolha, szórtetű, szúnyog, lepkeszúnyog, szuronyos istállólegy

[A doboz hát oldalára kerülő szöveg:]

- Bolhafertőzés kezelése és megelőzése 4 hétig; alkalmazható a bolhaallergiás dermatitis kezelési stratégia részeként.
- Megszünteti a szórtetvességet.
- Elriasztja és elpusztítja a kullancsokat 3–4 hétig, a kullancsfajtól függően.
- A kezelés időpontjában a kutyán lévő kullancsok a kezelés után még két napig életben maradhatnak, láthatóak lehetnek a kutya bőrébe fúródva. Ezért javasolt a kullancsok eltávolítása a kezelés időpontjában a további vérszívás megakadályozása céljából.
- Elriasztja a lepkeszúnyogokat, szúnyogokat és szuronyos istállólegyeket 2–4 héten át.
- Mérsékli a fertőződés kockázatát legfeljebb 3 hétig a leishmaniosis, 4 hétig az ehrlichiosis esetén.

6. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Rácsepegtetés. Kizárólag külsőleg alkalmazható!

Egy pipetta egy kutya kezeléséhez használható.



Megőrzi hatékonyságát akkor is, ha a szőrzet nedves lesz. A kezelt kutyák közvetlen környezetében a bolhalárvákkal szemben ölő hatást biztosít. Ne alkalmazza 7 hetesnél, illetve 25 kg-nál kisebb kutyákon! Vemhesség, illetve laktáció esetén kizárólag az állatorvos tanácsa szerint alkalmazható.

7. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

8. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Hűtőben vagy fagyasztóban nem tárolható.

Az eredeti csomagolásban tárolandó a fénytől és a nedvességtől való megóvás érdekében.

10. „ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!” SZAVAK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

11. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.



12. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

13. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE



14. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMAI

4420/1/23 NÉBIH ÁTI (1 pipetta)
4420/2/23 NÉBIH ÁTI (2 pipetta)
4420/3/23 NÉBIH ÁTI (3 pipetta)
4420/4/23 NÉBIH ÁTI (4 pipetta)
4420/5/23 NÉBIH ÁTI (6 pipetta)
4420/6/23 NÉBIH ÁTI (12 pipetta)
4420/7/23 NÉBIH ÁTI (24 pipetta)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

{Tasak}

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

ProtecTix



2. A HATÓANYAGOK MENNYISÉGI ADATAI

400 mg Imidacloprid(e)

2000 mg Permethrin(e)

4,0 ml

3. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

4. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

A pipettát a felbontás után azonnal fel kell használni!

beaphar®

**A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN
FELTÜNTETENDŐ ADATOK**

{Pipetta}

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

ProtecTix

**2. A HATÓANYAGOK MENNYISÉGI ADATAI**

400 mg Imidacloprid(e)

2000 mg Permethrin(e)

4,0 ml

3. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

4. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

beaphar®