

Wortlaut der für die äußere Umhüllung (Schachtel mit 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 oder 150 Pipetten) vorgesehenen Angaben

Schachtel mit 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 oder 150 Pipetten.

Bezeichnung des Tierarzneimittels:

EFFIPRO 402 mg Lösung zum Auftropfen für sehr große Hunde (XL)

Fipronil

Wirkstoff(e) und sonstige Bestandteile:

Eine 4,02 ml Pipette enthält:

Wirkstoff(e):

Fipronil 402,00 mg

Sonstige Bestandteile:

Butylhydroxyanisol (Ph. Eur., E320) 0,804 mg

Butylhydroxytoluol (Ph. Eur., E321) 0,402 mg

Darreichungsform:

Lösung zum Auftropfen

Packungsgrösse(n): 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90 oder 150 Pipetten.

Zieltierart(en):

Hund.

Anwendungsgebiet(e):

Behandlung eines Floh- (*Ctenocephalides* spp.) und Zeckenbefalls (*Dermacentor reticulatus*). Die insektizide Wirksamkeit gegen einen erneuten Befall mit adulten Flöhen besteht für bis zu 8 Wochen.

Das Tierarzneimittel hat eine persistierende akarizide Wirkung von bis zu 4 Wochen gegen Zecken (*Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus*). Bei bestimmten Zeckenarten (*Rhipicephalus sanguineus* und *Ixodes ricinus*) werden möglicherweise nicht alle Zecken innerhalb der ersten 48 Stunden nach dem Auftragen abgetötet, sondern erst innerhalb einer Woche.

Das Tierarzneimittel kann als Teil eines Behandlungsplans zur Kontrolle von Flohallergiedermatitis (FAD) verwendet werden, sofern dies zuvor durch einen Tierarzt diagnostiziert wurde.

Art der Anwendung:


Nur zur äußerlichen Anwendung.

1 Pipette mit 4,02 ml für einen Hund mit einem Gewicht von 40 bis 60 kg Körpergewicht.

Für Hunde über 60 kg: zwei Pipetten mit 2,68 ml.

Halten Sie die Pipette senkrecht. Klopfen Sie an den engen Teil der Pipette, damit sich der komplette Inhalt im Hauptteil der Pipette befindet. Knicken Sie die Verschlusskappe der Pipette entlang der markierten Linie ab.

Scheiteln Sie das Fell, so dass die Haut sichtbar wird. Setzen Sie die Pipettenspitze direkt auf die Haut und drücken Sie die Pipette mehrmals, um den Inhalt auf der Haut zu entleeren. Wiederholen Sie das Verfahren an einer oder zwei anderen Stellen entlang des Rückens des Tieres.



(Anmerkung: Die Form der Pipetten sowie die Abbildungen auf den äusseren Umhüllungen/Gebrauchsinformationen können differieren.)

Wartezeit:

Nicht zutreffend.

Besondere Warnhinweise:

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Besondere Lagerungsbedingungen:

Unter 30°C lagern. Trocken lagern. Im Originalbehältnis aufbewahren.

Besondere Vorsichtsmaßnahmen:

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Für Tiere.

Apothekenpflichtig.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren!

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers:

Virbac S.A.

1^{ère} avenue – 2065 m – L.I.D.

06516 Carros

FRANKREICH

Mitvertrieb:

DE: Virbac Tierarzneimittel GmbH

Rögen 20

D-23843 Bad Oldesloe
AT: Virbac Österreich GmbH
Hildebrandgasse 27
A-1180 Wien

DE: Zul.-Nr. 401107.03.00
AT: Z. Nr. 8-00803

Ch.-B.:
Verwendbar bis:

Durchdrückpackungen (Blister) bzw. Pipette

1 Einzelblister bzw. Pipette

EFFIPRO XL



402 mg

Verwendbar bis:

Ch.-B.:

VIRBAC