ETIQUETADO

CAJA CON 3 JERINGAS DE 10 ml

ALBIOTIC

(Lincomicina clorhidrato, neomicina sulfato)

3 x 10 ml

Solución acuosa estéril

Para administración intramamaria a animales en lactación, vía canal lactóforo.

Composición

Cada 10 ml contienen:

Lincomicina base 330 mg

(como lincomicina clorhidrato)

Neomicina base 100 mg

(como neomicina sulfato)

Edetato disódico 5 mg

Agua para inyección c.s.p. 10 ml

Indicaciones

Para el tratamiento de mastitis en vacas lecheras. El producto es efectivo frente especies de estafilococos (cepas productoras y no-productoras de penicilinasas) incluyendo *Staphylococcus aureus*, especies de estreptocos incluyendo *Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae* y *Streptococcus uberis*, y bacterias coliformes incluyendo *Eschericia coli*.

Contraindicaciones

Ninguna

Efectos secundarios

No se conocen

Utilización durante la gestación y la lactación

No hay restricciones

Interacciones

No utilizar concomitantemente con macrólidos.

Posología y modo de administración

Dosis: Inyectar una jeringa (10 ml de producto) en cada cuarterón afectado. Repetir este tratamiento inmediatamente después de cada uno de los dos ordeños siguientes, cada 12 horas, hasta un total de tres dosis consecutivas por cada cuarterón infectado.

Administración: Solo por vía intramamaria tomando precauciones asépticas.

Cuando sea necesario, lavar los pezones o toda la ubre con agua caliente que contenga un desinfectante adecuado y secar completamente. Ordeñar completamente la ubre. Limpiar a fondo los pezones con una toallita impregnada en alcohol u otro antiséptico adecuado. Utilizar una toallita para cada ubre. Quitar el tapón de la cánula de plástico. Mientras se sostiene firmemente el pezón insertar la punta dentro del canal, empujando suavemente el émbolo hasta inyectar todo el contenido. Después de la infusión, dar un masaje al cuarterón para facilitar la distribución del producto. Es aconsejable sumergir los pezones en un baño autorizado, después de la administración del producto.

Sobredosificación

El producto es bien tolerado. En caso de sobredosificación accidental, es bastante improbable que se produzca alguna reacción local o efecto secundario sistémico en el animal, sin embargo, en caso de producirse deberá informarse siguiendo la normativa vigente.

Periodo de supresión

Leche: No debe consumirse la leche durante el tratamiento. Tras la última administración, el tiempo de espera será de 84 horas, primer ordeño en el que la leche es apta para el consumo.

Carne: 3 días.

Condiciones de conservación

Conservar a temperatura inferior a 30°C. Proteger de la congelación.

Presentación

Solución acuosa estéril en jeringas de polietileno (plastets) de 10 ml, en envases de cartón de 3x10 ml, 12x10 ml, 24x10 ml y en cubo de plástico con 96x10 ml y 144x10ml; todas las presentaciones contienen toallitas impregnadas en alcohol para la limpieza de la ubre.

Puede que no se comercialicen todas las presentaciones**.**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

USO VETERINARIO – MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Reg.nº: 1281 ESP

Lote nº:

Caducidad:

Fabricante responsable de la liberación:

Biovet Joint Stock Company
39, Petar Rakov Str.,
4550 Peshtera, Bulgaria

Titular de la autorización de comercialización:

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Amberes
Bélgica

CAJA CON 12 JERINGAS DE 10 ml

ALBIOTIC

(Lincomicina clorhidrato, neomicina sulfato)

12 x 10 ml

Solución acuosa estéril

Para administración intramamaria a animales en lactación, vía canal lactóforo.

Composición

Cada 10 ml contienen:

Lincomicina base 330 mg

(como lincomicina clorhidrato)

Neomicina base 100 mg

(como neomicina sulfato)

Edetato disódico 5 mg

Agua para inyección c.s.p. 10 ml

Indicaciones

Para el tratamiento de mastitis en vacas lecheras. El producto es efectivo frente especies de estafilococos (cepas productoras y no-productoras de penicilinasas) incluyendo *Staphylococcus aureus*, especies de estreptocos incluyendo *Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae* y *Streptococcus uberis*, y bacterias coliformes incluyendo *Eschericia coli*.

Contraindicaciones

Ninguna

Efectos secundarios

No se conocen

Utilización durante la gestación y la lactación

No hay restricciones

Interacciones

No utilizar concomitantemente con macrólidos.

Posología y modo de administración

Dosis: Inyectar una jeringa (10 ml de producto) en cada cuarterón afectado. Repetir este tratamiento inmediatamente después de cada uno de los dos ordeños siguientes, cada 12 horas, hasta un total de tres dosis consecutivas por cada cuarterón infectado.

Administración: Solo por vía intramamaria tomando precauciones asépticas.

Cuando sea necesario, lavar los pezones o toda la ubre con agua caliente que contenga un desinfectante adecuado y secar completamente. Ordeñar completamente la ubre. Limpiar a fondo los pezones con una toallita impregnada en alcohol u otro antiséptico adecuado. Utilizar

una toallita para cada ubre. Quitar el tapón de la cánula de plástico. Mientras se sostiene firmemente el pezón insertar la punta dentro del canal, empujando suavemente el émbolo hasta inyectar todo el contenido. Después de la infusión, dar un masaje al cuarterón para facilitar la distribución del producto. Es aconsejable sumergir los pezones en un baño autorizado, después de la administración del producto.

Sobredosificación

El producto es bien tolerado. En caso de sobredosificación accidental, es bastante improbable que se produzca alguna reacción local o efecto secundario sistémico en el animal, sin embargo, en caso de producirse deberá informarse siguiendo la normativa vigente.

Periodo de supresión

Leche: No debe consumirse la leche durante el tratamiento. Tras la última administración, el tiempo de espera será de 84 horas, primer ordeño en el que la leche es apta para el consumo.

Carne: 3 días.

Condiciones de conservación

Conservar a temperatura inferior a 30°C. Proteger de la congelación.

Presentación

Solución acuosa estéril en jeringas de polietileno (plastets) de 10 ml, en envases de cartón de 3x10 ml, 12x10 ml, 24x10 ml y en cubo de plástico con 96x10 ml y 144x10ml; todas las presentaciones contienen toallitas impregnadas en alcohol para la limpieza de la ubre.

Puede que no se comercialicen todas las presentaciones**.**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

USO VETERINARIO – MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Reg.nº: 1281 ESP

Lote nº:

Caducidad:

Fabricante responsable de la liberación:

Biovet Joint Stock Company
39, Petar Rakov Str.,
4550 Peshtera, Bulgaria

Titular de la autorización de comercialización:

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Amberes
Bélgica

CAJA CON 24 JERINGAS DE 10 ml

ALBIOTIC

(Lincomicina clorhidrato, neomicina sulfato)

24 x 10 ml

Solución acuosa estéril

Para administración intramamaria a animales en lactación, vía canal lactóforo.

Composición

Cada 10 ml contienen:

Lincomicina base 330 mg

(como lincomicina clorhidrato)

Neomicina base 100 mg

(como neomicina sulfato)

Edetato disódico 5 mg

Agua para inyección c.s.p. 10 ml

Indicaciones

Para el tratamiento de mastitis en vacas lecheras. El producto es efectivo frente especies de estafilococos (cepas productoras y no-productoras de penicilinasas) incluyendo *Staphylococcus aureus*, especies de estreptocos incluyendo *Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae* y *Streptococcus uberis*, y bacterias coliformes incluyendo *Eschericia coli*.

Contraindicaciones

Ninguna

Efectos secundarios

No se conocen

Utilización durante la gestación y la lactación

No hay restricciones

Interacciones

No utilizar concomitantemente con macrólidos.

Posología y modo de administración

Dosis: Inyectar una jeringa (10 ml de producto) en cada cuarterón afectado. Repetir este tratamiento inmediatamente después de cada uno de los dos ordeños siguientes, cada 12 horas, hasta un total de tres dosis consecutivas por cada cuarterón infectado.

Administración: Solo por vía intramamaria tomando precauciones asépticas.

Cuando sea necesario, lavar los pezones o toda la ubre con agua caliente que contenga un desinfectante adecuado y secar completamente. Ordeñar completamente la ubre. Limpiar a fondo los pezones con una toallita impregnada en alcohol u otro antiséptico adecuado. Utilizar

una toallita para cada ubre. Quitar el tapón de la cánula de plástico. Mientras se sostiene firmemente el pezón insertar la punta dentro del canal, empujando suavemente el émbolo hasta inyectar todo el contenido. Después de la infusión, dar un masaje al cuarterón para facilitar la distribución del producto. Es aconsejable sumergir los pezones en un baño autorizado, después de la administración del producto.

Sobredosificación

El producto es bien tolerado. En caso de sobredosificación accidental, es bastante improbable que se produzca alguna reacción local o efecto secundario sistémico en el animal, sin embargo, en caso de producirse deberá informarse siguiendo la normativa vigente.

Periodo de supresión

Leche: No debe consumirse la leche durante el tratamiento. Tras la última administración, el tiempo de espera será de 84 horas, primer ordeño en el que la leche es apta para el consumo.

Carne: 3 días.

Condiciones de conservación

Conservar a temperatura inferior a 30°C. Proteger de la congelación.

Presentación

Solución acuosa estéril en jeringas de polietileno (plastets) de 10 ml, en envases de cartón de 3x10 ml, 12x10 ml, 24x10 ml y en cubo de plástico con 96x10 ml y 144x10ml; todas las presentaciones contienen toallitas impregnadas en alcohol para la limpieza de la ubre.

Puede que no se comercialicen todas las presentaciones**.**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

USO VETERINARIO – MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Reg.nº: 1281 ESP

Lote nº:

Caducidad:

Fabricante responsable de la liberación:

Biovet Joint Stock Company
39, Petar Rakov Str.,
4550 Peshtera, Bulgaria

Titular de la autorización de comercialización:

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Amberes
Bélgica

CUBO CON 96 JERINGAS DE 10 ml

ALBIOTIC

(Lincomicina clorhidrato, neomicina sulfato)

96 x 10 ml

Solución acuosa estéril

Para administración intramamaria a animales en lactación, vía canal lactóforo.

Composición

Cada 10 ml contienen:

Lincomicina base 330 mg

(como lincomicina clorhidrato)

Neomicina base 100 mg

(como neomicina sulfato)

Edetato disódico 5 mg

Agua para inyección c.s.p. 10 ml

Indicaciones

Para el tratamiento de mastitis en vacas lecheras. El producto es efectivo frente especies de estafilococos (cepas productoras y no-productoras de penicilinasas) incluyendo *Staphylococcus aureus*, especies de estreptocos incluyendo *Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae* y *Streptococcus uberis*, y bacterias coliformes incluyendo *Eschericia coli*.

Contraindicaciones

Ninguna

Efectos secundarios

No se conocen

Utilización durante la gestación y la lactación

No hay restricciones

Interacciones

No utilizar concomitantemente con macrólidos.

Posología y modo de administración

Dosis: Inyectar una jeringa (10 ml de producto) en cada cuarterón afectado. Repetir este tratamiento inmediatamente después de cada uno de los dos ordeños siguientes, cada 12 horas, hasta un total de tres dosis consecutivas por cada cuarterón infectado.

Administración: Solo por vía intramamaria tomando precauciones asépticas.

Cuando sea necesario, lavar los pezones o toda la ubre con agua caliente que contenga un desinfectante adecuado y secar completamente. Ordeñar completamente la ubre. Limpiar a fondo los pezones con una toallita impregnada en alcohol u otro antiséptico adecuado. Utilizar

una toallita para cada ubre. Quitar el tapón de la cánula de plástico. Mientras se sostiene firmemente el pezón insertar la punta dentro del canal, empujando suavemente el émbolo hasta inyectar todo el contenido. Después de la infusión, dar un masaje al cuarterón para facilitar la distribución del producto. Es aconsejable sumergir los pezones en un baño autorizado, después de la administración del producto.

Sobredosificación

El producto es bien tolerado. En caso de sobredosificación accidental, es bastante improbable que se produzca alguna reacción local o efecto secundario sistémico en el animal, sin embargo, en caso de producirse deberá informarse siguiendo la normativa vigente.

Periodo de supresión

Leche: No debe consumirse la leche durante el tratamiento. Tras la última administración, el tiempo de espera será de 84 horas, primer ordeño en el que la leche es apta para el consumo.

Carne: 3 días

Condiciones de conservación

Conservar a temperatura inferior a 30°C. Proteger de la congelación.

Presentación

Solución acuosa estéril en jeringas de polietileno (plastets) de 10 ml, en envases de cartón de 3x10 ml, 12x10 ml, 24x10 ml y en cubo de plástico con 96x10 ml y 144x10ml; todas las presentaciones contienen toallitas impregnadas en alcohol para la limpieza de la ubre.

Puede que no se comercialicen todas las presentaciones**.**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

USO VETERINARIO – MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Reg.nº: 1281 ESP

Lote nº:

Caducidad:

Fabricante responsable de la liberación:

Biovet Joint Stock Company
39, Petar Rakov Str.,
4550 Peshtera, Bulgaria

Titular de la autorización de comercialización:

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Amberes
Bélgica

CUBO CON 144 JERINGAS DE 10 ml

ALBIOTIC

(Lincomicina clorhidrato, neomicina sulfato)

144 x 10 ml

Solución acuosa estéril

Para administración intramamaria a animales en lactación, vía canal lactóforo.

Composición

Cada 10 ml contienen:

Lincomicina base 330 mg

(como lincomicina clorhidrato)

Neomicina base 100 mg

(como neomicina sulfato)

Edetato disódico 5 mg

Agua para inyección c.s.p.10 ml

Indicaciones

Para el tratamiento de mastitis en vacas lecheras. El producto es efectivo frente especies de estafilococos (cepas productoras y no-productoras de penicilinasas) incluyendo *Staphylococcus aureus*, especies de estreptocos incluyendo *Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae* y *Streptococcus uberis*, y bacterias coliformes incluyendo *Eschericia coli*.

Contraindicaciones

Ninguna

Efectos secundarios

No se conocen

Utilización durante la gestación y la lactación

No hay restricciones

Interacciones

No utilizar concomitantemente con macrólidos.

Posología y modo de administración

Dosis: Inyectar una jeringa (10 ml de producto) en cada cuarterón afectado. Repetir este tratamiento inmediatamente después de cada uno de los dos ordeños siguientes, cada 12 horas, hasta un total de tres dosis consecutivas por cada cuarterón infectado.

Administración: Solo por vía intramamaria tomando precauciones asépticas.

Cuando sea necesario, lavar los pezones o toda la ubre con agua caliente que contenga un desinfectante adecuado y secar completamente. Ordeñar completamente la ubre. Limpiar a fondo los pezones con una toallita impregnada en alcohol u otro antiséptico adecuado. Utilizar

una toallita para cada ubre. Quitar el tapón de la cánula de plástico. Mientras se sostiene firmemente el pezón insertar la punta dentro del canal, empujando suavemente el émbolo hasta inyectar todo el contenido. Después de la infusión, dar un masaje al cuarterón para facilitar la distribución del producto. Es aconsejable sumergir los pezones en un baño autorizado, después de la administración del producto.

Sobredosificación

El producto es bien tolerado. En caso de sobredosificación accidental, es bastante improbable que se produzca alguna reacción local o efecto secundario sistémico en el animal, sin embargo, en caso de producirse deberá informarse siguiendo la normativa vigente.

Periodo de supresión

Leche: No debe consumirse la leche durante el tratamiento. Tras la última administración, el tiempo de espera será de 84 horas, primer ordeño en el que la leche es apta para el consumo.

Carne: 3 días.

Condiciones de conservación

Conservar a temperatura inferior a 30°C. Proteger de la congelación.

Presentación

Solución acuosa estéril en jeringas de polietileno (plastets) de 10 ml, en envases de cartón de 3x10 ml, 12x10 ml, 24x10 ml y en cubo de plástico con 96x10 ml y 144x10ml; todas las presentaciones contienen toallitas impregnadas en alcohol para la limpieza de la ubre.

Puede que no se comercialicen todas las presentaciones**.**

Todo medicamento veterinario no utilizado o los residuos derivados del mismo deberán eliminarse de conformidad con las normativas vigentes.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

USO VETERINARIO – MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Reg.nº: 1281 ESP

Lote nº:

Caducidad:

Fabricante responsable de la liberación:

Biovet Joint Stock Company
39, Petar Rakov Str.,
4550 Peshtera, Bulgaria

Titular de la autorización de comercialización:

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Amberes
Bélgica

ETIQUETA JERINGA DE 10ml

ALBIOTIC

(Lincomicina clorhidrato, neomicina sulfato)

Solución acuosa estéril para administración intramamaria

10 ml

Cada 10 ml contienen lincomicina base (como lincomicina clorhidrato) 330 mg, neomicina base (como neomicina sulfato) 100 mg, edetato disódico 5 mg y agua para inyección c.s.p.

10 ml

Para el tratamiento de mastitis en vacas lecheras.

Periodo de supresión: *Leche*: No debe consumirse la leche durante el tratamiento. Tras la última administración, el tiempo de espera será de 84 horas, primer ordeño en el que la leche es apta para el consumo.

Carne: 3 días.

Instrucciones completas en el prospecto

Conservar a temperatura inferior a 30°C. Proteger de la congelación.

Mantener fuera del alcance y la vista de los niños.

USO VETERINARIO – MEDICAMENTO SUJETO A PRESCRIPCIÓN VETERINARIA

Reg. nº: 1281 ESP

Lote:

Caduca:

Titular de la autorización de comercialización:

Huvepharma NV

Uitbreidingstraat 80

2600 Amberes

Bélgica