

ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR

BOÎTE EN CARTON

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

BOVIX MICROCLOX EDC, 600 mg suspension intramammaire

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque seringue pour administration intramammaire de 3,6 g contient 600 mg de cloxacilline (sous forme de benzathine).

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

12 x 3,6 g
24 x 3,6 g
60 x 3,6 g
120 x 3,6 g

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches au tarissement)

5. INDICATIONS

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie intramammaire

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Viande et abats : zéro jour.

Lait :

- si le vêlage a lieu au moins 42 jours après le traitement : 48 heures après le vêlage.
- si le vêlage a lieu moins de 42 jours après le traitement : 44 jours après le dernier traitement

8. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Kernfarm B.V.

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V663933

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**Étiquette pour seringue****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

BOVIX MICROCLOX EDC

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Chaque seringue pour administration intramammaire de 3,6 g contient 600 mg de cloxacilline (sous forme de benzathine).

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}