

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos**

24 injectoren voor intramammair gebruik, 48 injectoren voor intramammair gebruik, 96 injectoren voor intramammair gebruik

1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

PERMAWAY 600 mg suspensie voor intramammair gebruik voor runderen.
Cloxacilline (benzathine).

**2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL**

Cloxacilline (als benzathine) 600 mg / injector voor intramammair gebruik.

3. FARMACEUTISCHE VORM

Suspensie voor intramammair gebruik

4. VERPAKKINGSGROOTTE

24 injectoren voor intramammair gebruik.
48 injectoren voor intramammair gebruik.
96 injectoren voor intramammair gebruik.

5. DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Rund (droogstaande koeien).

6. INDICATIES**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEGEN**

Voor enkelvoudig intramammair gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJDEN

Vlees en slachtafval: 28 dagen.

Melk: Interval tussen behandeling en afkalven is 42 dagen of langer: 4 dagen na afkalven.

Interval tussen behandeling en afkalven is minder dan 42 dagen: 46 dagen na behandeling.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na aanbreken direct gebruiken.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 25 °C.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering: lees de bijsluiter.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Op diergeneeskundig voorschrift

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Vetoquinol NV/SA

Galileilaan 11/401

B-2845 Niel

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V589635

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**Injector voor intramammair gebruik van 3,6 g****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

PERMAWAY 600 mg suspensie voor intramammair gebruik voor runderen.
Cloxacilline (benzathine).

**2. GEHALTE AAN WERKZAAM BESTANDDEEL**

Cloxacilline (als benzathine) 600 mg / injector voor intramammair gebruik.

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

3,6 g

4. TOEDIENINGSWEGEN

Voor enkelvoudig intramammair gebruik.

5. WACHTTIJDEN

Vlees en slachtafval: 28 dagen.

Melk: Interval tussen behandeling en afkalven is 42 dagen of langer: 4 dagen na afkalven.

Interval tussen behandeling en afkalven is minder dan 42 dagen: 46 dagen na behandeling.

6. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na aanbreken direct gebruiken.

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.