

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel mit 1 Flasche à 50 ml, 100 ml, 250 ml und 500 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Florgane 300 mg/ml Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Florfenicol 300 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Vor Gebrauch schütteln.

Intramuskuläre Anwendung.

Einmalige Injektion von 30 mg Florfenicol pro kg Körpergewicht (1 ml/10 kg) bei Rindern und von 22,5 mg Florfenicol pro kg Körpergewicht (0,75 ml/10 kg) bei Schweinen.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: 37 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.

Schweine:

Essbare Gewebe: 22 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

EMDOKA

Mitvertreiber:

DE: Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 401497.00.00

AT: Z.Nr.: 8-00876

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Sammelverpackung: Umkarton mit 12 × 50 ml, 12 × 100 ml, 12 × 250 ml und 12 × 500 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Florgane 300 mg/ml Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Florfenicol 300 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

100 ml

250 ml

500 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Vor Gebrauch schütteln.

Intramuskuläre Anwendung.

Einmalige Injektion von 30 mg Florfenicol pro kg Körpergewicht (1 ml/10 kg) bei Rindern und von 22,5 mg Florfenicol pro kg Körpergewicht (0,75 ml/10 kg) bei Schweinen.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rinder:

Essbare Gewebe: 37 Tage.

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.

Schweine:

Essbare Gewebe: 22 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.
Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

EMDOKA

Mitvertreiber:
DE: Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

14. ZULASSUNGSNR.

DE: 401497.00.00
AT: Z.Nr.: 8-00876

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett für Flaschen mit 50 ml, 100 ml, 250 ml und 500 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Florgane 300 mg/ml Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:
Florfenicol 300 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:
Rinder:
Essbare Gewebe: 37 Tage.
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.

Schweine:
Essbare Gewebe: 22 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.
Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

EMDOKA

Mitvertreiber:
DE: Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}