

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**

Boîte de 1 flacon de 125 mL
Boîte de 1 flacon de 250 mL
Boîte de 1 flacon de 500 mL
Boîte de 1 flacon de 1 L

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Gabbrovet Multi 140 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson/le lait pour bovins pré-ruminants et porcins.

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 mL contient 140 mg de paromomycine (sous forme de sulfate), équivalent à 140 000 UI d'activité de paromomycine ou équivalent à environ 200 mg de sulfate de paromomycine.

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

125 ml
250 ml
500 ml
1 L

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (veaux pré-ruminants et veaux nouveau-nés) et porcins.

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie orale.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins (bovins pré-ruminants et veaux nouveau-nés) :

- Colibacillose : Posologie : 25-50 mg/kg/jour pendant 3 à 5 jours. Viande et abats : 20 jours
- Cryptosporidiose : Posologie : 150 mg/kg/jour pendant 5 jours. Viande et abats : 110 jours

Porcs : Viande et abats : 3 jours

En raison de l'accumulation de paromomycine dans le foie et les reins, tout traitement répété pendant le temps d'attente doit être évité.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp.

Flacons PEHD de 125, 250, 500 ml et 1 L :

Après ouverture à utiliser dans les 6 mois, avant le ____/____/____

Après dilution dans l'eau de boisson, utiliser dans les 24 heures.

Après dilution dans le lait ou le lait de remplacement, utiliser dans les 6 heures.

Flacons HDPE/EVOH/HDPE de 250, 500 mL et 1 L :

Après ouverture à utiliser dans les 3 mois, avant le ____/____/____

Après dilution dans l'eau de boisson, utiliser dans les 24 heures.

Après dilution dans le lait ou le lait de remplacement, utiliser dans les 6 heures.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Après ouverture, conserver le flacon soigneusement fermé.

Flacons PEHD de 125, 250 ml : À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ



14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V660568 (Flacon PEHD)

BE-V660569 (Flacon HDPE/EVOH/HDPE)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Etiquette du flacon de 125 mL****Etiquette du flacon de 250 mL****Etiquette du flacon de 500 mL****Etiquette du flacon de 1 L****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Gabbrovet Multi 140 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson/le lait pour bovins pré-ruminants et porcins.

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

1 mL contient 140 mg de paromomycine (sous forme de sulfate), équivalant à 140 000 UI d'activité de paromomycine ou équivalant à environ 200 mg de sulfate de paromomycine.

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins (veaux pré-ruminants et veaux nouveau-nés) et porcins.

4. VOIES D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente :

Bovins (bovins pré-ruminants et veaux nouveau-nés) :

- Colibacillose : Posologie : 25-50 mg/kg/jour pendant 3 à 5 jours. Viande et abats : 20 jours

- Cryptosporidiose : Posologie : 150 mg/kg/jour pendant 5 jours. Viande et abats : 110 jours

Porcs : Viande et abats : 3 jours

En raison de l'accumulation de paromomycine dans le foie et les reins, tout traitement répété pendant le temps d'attente doit être évité.

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp.

Flacons PEHD de 125, 250, 500 ml et 1 L :

Après ouverture à utiliser dans les 6 mois, avant le ____/____/____

Après dilution dans l'eau de boisson, utiliser dans les 24 heures.

Après dilution dans le lait ou le lait de remplacement, utiliser dans les 6 heures.

Flacons HDPE/EVOH/HDPE de 250, 500 mL et 1 L :

Après ouverture à utiliser dans les 3 mois, avant le ____/____/____

Après dilution dans l'eau de boisson, utiliser dans les 24 heures.

Après dilution dans le lait ou le lait de remplacement, utiliser dans les 6 heures.

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Après ouverture, conserver le flacon soigneusement fermé.

Flacons PEHD de 125, 250 ml: À conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot