

BIJLAGE II

ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos (indien gebruikt)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Aquapharm Ringerlactaat oplossing voor infusie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Natriumchloride	6,00 mg
Kaliumchloride	0,40 mg
Calciumchloride (als dihydraat)	0,204 mg
Natrium-S-lactaat	3,10 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

30 x 250 ml
20 x 500 ml
10 x 1.000 ml
4 x 3.000 ml
2 x 5.000 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Rund, paard, schaap, geit, varken, hond, kat en konijn.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Intraveneus gebruik (infusie).

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: nul dagen.

Melk: nul uur.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/yyyy}

Na openen direct gebruiken en al het ongebruikte diergeneesmiddel verwijderen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

250 ml zakken: Bewaren beneden 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V511235

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiketten (indien verpakt in een kartonnen doos)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Aquapharm Ringerlactaat Oplossing voor Infusie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Natriumchloride	6,00 mg
Kaliumchloride	0,40 mg
Calciumchloride (als dihydraat)	0,204 mg
Natrium-S-lactaat	3,10 mg

3. DOELDIERSOORTEN

Rund, paard, schaap, geit, varken, hond, kat en konijn.

4. TOEDIENINGSWEGEN

Intraveneus gebruik (infusie).
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJDEN

Wachttijden:
Vlees en slachtafval: nul dagen.
Melk: nul uur.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/yyyy}
Na openen direct gebruiken en al het ongebruikte diergeneesmiddel verwijderen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

250 ml zakken: Bewaren beneden 25 °C.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Etiketten (voor individuele zakken)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Aquapharm Ringerlactaat oplossing voor infusie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:

Natriumchloride	6,00 mg
Kaliumchloride	0,40 mg
Calciumchloride (als dihydraat)	0,204 mg
Natrium-S-lactaat	3,10 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

250 ml
500 ml
1.000 ml
3.000 ml
5.000 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Rund, paard, schaap, geit, varken, hond, kat en konijn.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEGEN**

Intraveneus gebruik (infusie).

7. WACHTTIJDEN

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: nul dagen.

Melk: nul uur.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen direct gebruiken en al het ongebruikte diergeneesmiddel verwijderen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

250 ml zakken: Bewaren beneden 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**14. NUMMERS VAN DE VERGUNNINGEN VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V511235

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}