

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
КЪМ ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА № 0022-2209**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Спорил- маз за говеда
Sporyl – Ointment for cattle

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

100 g съдържа:

Активна субстанция:

Карамфилово масло със съдържание на

Eugenol 2 g

Cetrimide 1.2 g

Експципенти:

За пълния списък на експципенти, вж. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Маз за външно приложение.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Говеда

4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни

За лечение на трихофитози при говеда.

4.3 Противопоказания

Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или някой от експципентите.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Няма

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да не се прилага в очите.

Собственикът на животно трябва да приложи необходимите мерки за предпазване от разпространение на трихофитозата.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагачи ветеринарномедицинския продукт на животните

Да се внимава продуктът да не попада в очите, да се мият ръцете след употреба.

4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност)

Не са известни.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене

Може да се използва при бременност и лактация.

4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие

Не са известни.

4.9 Доза и начин на приложение

След почистване на засегнатите области по кожата да се втрива старателно ежедневно до оздравяване.

След няколко дни се формират крусти. Те трябва да се отстранят преди следващо приложение.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

Не са наблюдавани досега при локална употреба върху кожата.

4.11 Карентен срок (карентни срокове)

Нула дни.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

Фармакотерапевтична група: други антимикотични агенти за локална употреба
Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код : QD01AE20

5.1 Фармакодинамични свойства

Спорилът притежава силно фунгицидно действие, дължащо се на съдържащия се еугенол, основна съставка на карамфиловото масло и дезинфекционно действие, дължащо се на цетримида.

Спорил не причинява дразнене на кожата, добре прониква през нейния повърхностен слой, унищожават дерматофитите и подпомага бързото оздравяване на инфектираната кожа.

5.2 Фармакокинетични особености

Карамфиловото масло е известно като безвредно, липсват фармакокинетични данни. Цетримидът се резорбира незначително след локална употреба върху кожата.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите

- Vaselineum flavum
- Cetyl stearyl alcohol

6.2 Основни несъвместимости

Не са известни.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицинския продукт: 3 години .

6.4. Специални условия за съхранение на продукта

Да не се съхранява при температури над 25 °C.
Опаковката да се затваря плътно.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

Полипропиленова цилиндрична кутия от 100 g с капак на винт.

6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

VetViva Richter GmbH
Durisolstrasse 14
A-4600 Wels
Austria

8. НОМЕР(А) НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА:

No 0022-2209

9. ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

Дата на първото издаване/подновяване на лиценза за употреба: 11/03/2014

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

01/2023

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА

Не е приложимо.

Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР