

**PRILOGA III**  
**OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO**

## **A. OZNAČEVANJE**

**PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI IN STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI**

100 ml ali 250 ml plastenka

**1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Baycox Multi 50 mg/ml peroralna suspenzija za govedo, prašiče in ovce  
toltrazuril

**2. NAVEDBA UČINKOVIN(E)**

Vsak ml vsebuje 50 mg toltrazurila.

**3. FARMACEVTSKA OBLIKA**

Peroralna suspenzija.

**4. VELIKOST PAKIRANJA**

100 ml  
250 ml

**5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**

Govedo (teleta mlečnih pasem, sesna teleta mesnih pasem, bikci mesnih pasem), prašiči (pujski, stari 3–5 dni), ovce (jagnjeta).

**6. INDIKACIJA(E)**

**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Za peroralno uporabo.  
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

**8. KARENCA**

Karenca:

Govedo:

Meso in organi: 63 dni.

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Prašiči:

Meso in organi: 77 dni.

Ovce:

Meso in organi: 42 dni.

Mleko: Ni dovoljena uporaba pri živalih, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

**9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)**

**10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA**

EXP {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite do \_\_\_\_\_

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 6 mesecev.

**11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE**

**12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO**

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

**13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO**

Samo za živali. Rp-Vet.

**14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

**15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM**

Bayer Animal Health GmbH  
51368 Leverkusen  
Nemčija

**16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET**

DC/V/0029/004

**17. PROIZVAJALČEVA ŠTEVILKA SERIJE**

Lot {številka}