

**BIPACKSEDEL**  
**Ophtaclin vet 10 mg/g ögonsalva för hund, katt, och häst**

**1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA**

Innehavare av godkännande för försäljning

Le Vet Beheer B.V.  
Wilgenweg 7  
3421 TV Oudewater,  
Nederländerna

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningsatts:

Produlab Pharma B.V.  
Forellenweg 16  
4941 SJ Raamsdonksveer  
Nederländerna

**2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN**

Ophtaclin vet 10 mg/g ögonsalva för hund, katt, och häst  
Klortetracyclinhydroklorid

**3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER**

1 gram innehåller:

**Aktiva substanser:**

Klortetracyclinhydroklorid	10,0 mg
(motsvarande 9,3 mg klortetracyklin)	

Gulaktig till gul homogen salva

**4. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE(N)**

Behandling av bakteriella ögoninfektioner (keratit, konjunktivit och blefarit) orsakade av *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Proteus* spp. och/eller *Pseudomonas* spp. känsliga för klortetracyklin.

**5. KONTRAINDIKATIONER**

Använd inte vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnen.

**6. BIVERKNINGAR**

Inga kända.

Om du observerar biverkningar eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

## 7. DJURSLAG

Hund, katt och häst.



## 8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

Endast för användning i ögat.

Häst: Applicera 2-3 cm salva (beroende på djurets storlek) innanför nedre ögonlocket 4 gånger om dagen i 5 dagar. Om ingen förbättring skett efter 3 dagars behandling ska alternativ behandling övervägas.

Hund och katt: Applicera 0.5-2 cm salva (beroende på djurets storlek) innanför nedre ögonlocket 4 gånger om dagen i 5 dagar. Om ingen förbättring skett efter 3 dagars behandling ska alternativ behandling övervägas.

## 9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

### 10. KARENSTID(ER)

Kött och slaktbiprodukter: 1 dygn

Ej godkänt för användning till lakterande hästar som producerar mjölk avsedd för humankonsumtion.

### 11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25 °C.

Hållbarhet efter tubens öppnande: 14 dagar

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på behållaren efter Utg.dat.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

### 12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

#### Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

På grund av trolig variabilitet (tid, geografiskt) beträffande förekomst av tetracyklinresistenta bakterier rekommenderas bakteriologisk provtagning och känslighetstestning.

Officiella, nationella och lokala riktlinjer beträffande antimikrobiell behandling ska beaktas vid användning av det veterinärmedicinska läkemedlet.

Användning av detta läkemedel på annat sätt än vad som anges i bipacksedeln kan öka förekomsten av bakterier som är resistenta mot klortetracyklin och kan minska effekten av behandling med andra tetracykliner på grund av potentialen för korsresistens.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

Direkt hudkontakt ska undvikas under administrering på grund av möjlig sensibilisering och/eller överkänslighetsreaktioner. Ogenomträngliga handskar ska användas vid hantering av detta läkemedel. Vid hudkontakt, tvätta exponerad hud med tvål och vatten. Om du får symtom efter exponering såsom ett hudutslag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

Användning under dräktighet eller laktation

Säkerheten av detta läkemedel har inte fastställts under dräktighet och laktation. Använd endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

Andra läkemedel och Ophtaclin vet 10 mg/g ögonsalva för hund, katt, och häst

Uppgift saknas.

Överdoserings (symptom, akuta åtgärder, motgift)

Uppgift saknas.

**13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL**

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

**14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES**

2019-11-13

**15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**

Epoxihartslackerad aluminiumtub med ett innehåll på 5 g, med en HDPE-kanyl och skruvlock. En tub i en kartong.