

ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**DOOS 4 ml & 20 ml injectieflacon****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Paracox-8 suspensie voor suspensie voor oraal gebruik / suspension pour suspension buvable /
Suspension zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Oöcysten/Oocystes/Oozysten pro dos. (0,004 ml):

<i>E. acervulina</i> HP	500
<i>E. brunetti</i> HP	100
<i>E. maxima</i> CP	200
<i>E. maxima</i> MFP	100
<i>E. mitis</i> HP	1000
<i>E. necatrix</i> HP	500
<i>E. praecox</i> HP	100
<i>E. tenella</i> HP	500

3. VERPAKKINGSGROOTTE

4 ml (1000 doses/ Dosen)

20 ml (5000 doses/ Dosen)

4. DOELDIERSOORT(EN)

Kippen
Poulets
Hühner

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oplosmiddel moet gebruikt worden voor spray op de kip toediening.
Le solvant doit être utilisé pour pulvérisation au couvoir.
Lösungsmittel muss verwendet werden bei der Anwendung als Spray bei Hühnern.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit: 0 d/j/T.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen/verduunning gebruiken binnen / Après ouverture/dilution à utiliser dans / Nach Anbruch/Verdünnen aufbrauchen innerhalb von 4 u/h/S.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Gekoeld bewaren en transporteren / À conserver et transporter réfrigéré / Kühl lagern und transportieren.

Niet bewaren onder /Ne pas conserver en-dessous de /Nicht lagern unter 2°C.

Bescherm(en) tegen licht / Protéger de la lumière / Vor Licht schützen.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Ad us. vet.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V172541 (vaccin)

BE-V541635 (oplosmiddel)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****PETG injectieflacons 4 ml & 20 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Paracox-8

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

Pro dos. (0,004 ml):

<i>E. acervulina</i> HP	500
<i>E. brunetti</i> HP	100
<i>E. maxima</i> CP	200
<i>E. maxima</i> MFP	100
<i>E. mitis</i> HP	1000
<i>E. necatrix</i> HP	500
<i>E. praecox</i> HP	100
<i>E. tenella</i> HP	500

4 ml (1000 D)

20 ml (5000 D)

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen/verdunding gebruiken binnen / Après ouverture/dilution à utiliser dans / Nach
Anbruch/Verdünnen aufbrauchen innerhalb von 4 u/h/S.

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING (ETIKET) VAN HET OPLOSMIDDEL MOETEN WORDEN VERMELD**Etiket PET fles (100 ml & 500 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Oplosmiddel voor Paracox voor spray op de kip toediening
Solvant pour Paracox pour pulvérisation au couvoir
Lösungsmittel für Paracox zur Herstellung als Spray bei Hühnern

Fles van 100 ml

Fles van 500 ml

2. DOELDIERSOORT(EN)

Kippen
Poulets
Hühner

3. TOEDIENINGSWEG(EN)

Lees vóór gebruik de Paracox-5/-8 bijsluiter.
Lire la notice de Paracox-5/-8 avant utilisation.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage von Paracox-5/-8.

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

5. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren bij 2°C - 25°C.
Conserver entre + 2°C et + 25°C.
Zwischen 2° C und 25° C lagern.

6. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**7. PARTIJNUMMER**

Lot {nummer}