

**ANNEXE III**  
**ÉTIQUETAGE ET NOTICE**

**A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Kelbomar 100 mg/ml solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque ml contient :

Marbofloxacine 100 mg

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

100 ml

250 ml

6 x 100 ml

6 x 250 ml

10 x 100 ml

10 x 250 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

**4. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, porcins (truies)

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Bovins: par voie intramusculaire (i.m.), sous-cutanée (s.c.), intraveineuse (i.v.)

Porcins (truies): par voie intramusculaire (i.m.)

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Bovins :

Infections respiratoires :

- 2 mg/kg pendant 3-5 jours (i.v./i.m./s.c.) :

Viande et abats : 6 jours.

Lait : 36 heures.

- 8 mg/kg dose unique (i.m.) :

Viande et abats : 3 jours.

Lait : 72 heures.

Mammites aiguës :

- 2 mg/kg pendant 3 jours (i.v./i.m./s.c.) :

Viande et abats : 6 jours.

Lait : 36 heures.

Porcins (truies) :  
Viande et abats : 4 jours.

**8. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. {mm/aaaa}  
Après ouverture à utiliser dans 28 jours.  
Après ouverture à utiliser avant...

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans l'emballage d'origine de façon à le protéger de la lumière.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Kela sa

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V442355

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Etiquette 100 – 250 ml****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Kelbomar 100 mg/ml solution injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Chaque ml contient :

Marbofloxacine 100 mg

**3. ESPÈCES CIBLES**

Bovins, porcins (truies)

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Bovins : par voie intramusculaire (i.m.), sous-cutanée (s.c.), intraveineuse (i.v.)

Porcins (truies) : par voie intramusculaire (i.m.)

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente :

Bovins :

Infections respiratoires :

- 2 mg/kg pendant 3-5 jours (i.v./i.m./s.c.) :

Viande et abats : 6 jours.

Lait : 36 heures.

- 8 mg/kg dose unique (i.m.) :

Viande et abats : 3 jours.

Lait : 72 heures.

Mammites aiguës :

- 2 mg/kg pendant 3 jours (i.v./i.m./s.c.) :

Viande et abats : 6 jours.

Lait : 36 heures.

Porcins (truies) :

Viande et abats : 4 jours.

**6. DATE DE PÉREMOPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.

Après ouverture, utiliser avant...

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans l'emballage d'origine de façon à le protéger de la lumière.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Kela sa

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}