

A. ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

(Картонена кутия) 10 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

VETBENDAZOL/ВЕТБЕНДАЗОЛ,
30 % Перорална паста с фенбендазол за коне

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

1 ml паста съдържа:
300 mg fenbendazole
Monopropylen glycol, carboxymethyl cellulose, sodium benzoate, demineralised water до 1 ml.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Паста за перорално приложение.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

Спринцовка от 10 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коня.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Продуктът съдържа ендопаразитицид от класа на бензоимидазолите, който е активен срещу гастроинтестинални и белодробни нематодни видове (възрастни, ларви, яйца), който паразитират при коне, поради което е предназначен за предпазване и лечение на нематодози, причинени от: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equines*, *Strongylus edentatus*, *Trichonema* (= *Cyathostomum*), *Parascaris equorum*, *Strongyloides westeri*, *Oxyuris equi*.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

VETBENDAZOL трябва да се прилага перорално.

Единична доза от 10 mg/kg телесна маса, еквивалентна на 10 ml паста за кон, тежащ 300 kg.

Една спринцовка от 20 ml осигурява препоръчаната доза на кон, тежащ 600 kg.

Спринцовката се поставя в ъгъла на устата на коня и се натиска буталото. Продуктът е сладко овкусен, поради което се приема лесно от животното. По съвет на ветеринарен лекар, противопаразитното третиране може да бъде удължено до 5 дни.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Не се разрешава за употреба при животни, чието месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След отваряне използвай в рамките на 10 дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от замръзване.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Няма установени токсични ефекти за околната среда. След изпразване опаковката трябва да бъде поставена в събирателен контейнер.

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО
--

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”
--

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
--

S.C. VANELLI S.R.L.
Strada Iasi- Targu Frumos Km 10,
Sat Letcani, Comuna Letcani ,707280
Jud. Iasi, Romania
Tel.: 40 232 253 442
E-mail: office@vanellivet.ro, www.vanellivet.ro

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП
--

№ 0022-1988

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

<Партида> <Lot> <П №> {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

(Картонена кутия) 20 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

VETBENDAZOL/ВЕТБЕНДАЗОЛ,
30 % Перорална паста с фенбендазол за коне

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

1 ml паста съдържа:
300 mg fenbendazole
Monopropylen glycol, carboxymethyl cellulose, sodium benzoate, demineralised water до 1 ml.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Паста за перорално приложение.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

Спринцовка от 20 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Продуктът съдържа ендопаразитицид от класа на бензоимидазолите, който е активен срещу гастроинтестинални и белодробни нематодни видове (възрастни, ларви, яйца), който паразитират при коне, поради което е предназначен за предпазване и лечение на нематодози, причинени от: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equines*, *Strongylus edentatus*, *Trichonema* (= *Cyathostomum*), *Parascaris equorum*, *Strongyloides westeri*, *Oxyuris equi*.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

VETBENDAZOL трябва да се прилага перорално.
Единична доза от 10 mg/kg телесна маса, еквивалентна на 10 ml паста за кон, тежащ 300 kg.
Една спринцовка от 20 ml осигурява препоръчаната доза на кон, тежащ 600 kg.
Спринцовката се поставя в ъгъла на устата на коня и се натиска буталото. Продуктът е сладко овкусен, поради което се приема лесно от животното. По съвет на ветеринарен лекар, противопаразитното третиране може да бъде удължено до 5 дни.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Не се разрешава за употреба при животни, чието месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}

След отваряне използвай в рамките на 10 дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от замръзване.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Няма установени токсични ефекти за околната среда. След изпразване опаковката трябва да бъде поставена в събирателен контейнер.

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

S.C. VANELLI S.R.L.

Strada Iasi- Targu Frumos Km 10,

Sat Letcani, Comuna Letcani ,707280

Jud. Iasi, Romania

Tel.: 40 232 253 442

E-mail: office@vanellivet.ro, www.vanellivet.ro

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

№ 0022-1988

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

<Партида> <Lot> <П №> {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

(Картонена кутия) 1000 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

VETBENDAZOL/ВЕТБЕНДАЗОЛ,
30 % Перорална паста с фенбендазол за коне

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

1 ml паста съдържа:
300 mg fenbendazole
Monopropylen glycol, carboxymethyl cellulose, sodium benzoate, demineralised water до 1 ml.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Паста за перорално приложение.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

Полипропиленова кофичка от 1000 ml, съдържаща 20 ml полиетиленова градуирана спринцовка, пакетирани индивидуално в полиетиленова торбичка, споена в двата края.

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коне.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Продуктът съдържа ендопаразитицид от класа на бензоимидазолите, който е активен срещу гастроинтестинални и белодробни нематодни видове (възрастни, ларви, яйца), който паразитират при коне, поради което е предназначен за предпазване и лечение на нематодози, причинени от: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equines*, *Strongylus edentatus*, *Trichonema* (= *Cyathostomum*), *Parascaris equorum*, *Strongyloides westeri*, *Oxyuris equi*.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

VETBENDAZOL трябва да се прилага перорално.
Единична доза от 10 mg/kg телесна маса, еквивалентна на 10 ml паста за кон, тежащ 300 kg.
Една спринцовка от 20 ml осигурява препоръчаната доза на кон, тежащ 600 kg.
Спринцовката се поставя в ъгъла на устата на коня и се натиска буталото. Продуктът е сладко овкусен, поради което се приема лесно от животното. По съвет на ветеринарен лекар, противопаразитното третиране може да бъде удължено до 5 дни.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Не се разрешава за употреба при животни, чието месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}
След отваряне използвай в рамките на 10 дни.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.
Да се пази от замръзване.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Няма установени токсични ефекти за околната среда. След изпразване опаковката трябва да бъде поставена в събирателен контейнер.
Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

S.C. VANELLI S.R.L.
Strada Iasi- Targu Frumos Km 10,
Sat Letcani, Comuna Letcani ,707280
Jud. Iasi, Romania
Tel.: 40 232 253 442
E-mail: office@vanellivet.ro, www.vanellivet.ro

16. НОМЕРНА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

№ 0022-1988

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

<Партида> <Lot> <П №> {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Етикет на спринцовка от 10 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

VETBENDAZOL/ВЕТБЕНДАЗОЛ,
30 % Перорална паста с фенбендазол за коне

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

1 ml паста съдържа:
300 mg fenbendazole

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

Спринцовка от 10 ml

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пероралното приложение в единична доза от 10 mg/kg телесна маса, еквивалентна на 10 ml паста за кон, тежащ 300 kg.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Не се разрешава за употреба при животни, чието месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора.

6. ПАРТИДЕН НОМЕР

<Партида> <Lot> <П№> {номер}

7. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}
След отваряне използвай в рамките на 10 дни.

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Етикет на спринцовка от 20 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

VETBENDAZOL/ВЕТБЕНДАЗОЛ,
30 % Перорална паста с фенбендазол за коне

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

1 ml паста съдържа:
300 mg fenbendazole

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

Спринцовка от 20 ml

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пероралното приложение в единична доза от 10 mg/kg телесна маса, еквивалентна на 10 ml паста за кон тежащ, 300 kg.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Не се разрешава за употреба при животни, чието месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора.

6. ПАРТИДЕН НОМЕР

<Партида> <Lot> <П№> {номер}

7. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}
След отваряне използвай в рамките на 10 дни.

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Етикет на полипропиленова кофичка от 1000 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

VETBENDAZOL/ВЕТБЕНДАЗОЛ,
30 % Перорална паста с фенбендазол за коне

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

1 ml паста съдържа:
300 mg fenbendazole

3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ

Полипропиленова кофичка от 1000 ml, съдържаща 20 ml полиетиленова градуирана
спринцовка, пакетирана индивидуално в полиетиленова торбичка, споена в двата края.

4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Пероралното приложение в единична доза от 10 mg/kg телесна маса, еквивалентна на 10 ml
паста за кон, тежащ 300 kg.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.
Не се разрешава за употреба при животни, чието месо и вътрешни органи са предназначени за
консумация от хора.

6. ПАРТИДЕН НОМЕР

<Партида> <Lot> <П№> {номер}

7. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}
След отваряне използвай в рамките на 10 дни.

8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

В. ЛИСТОВКА

ЛИСТОВКА:
VETBENDAZOL/ВЕТБЕНДАЗОЛ,
30 % Перорална паста с фенбендазол за коне

1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ

Притежател на лиценза за употреба:

S.C. VANELLI S.R.L.
Strada Iasi- Targu Frumos Km 10,
Sat Letcani, Comuna Letcani ,707280
Jud. Iasi, Romania
Tel.: 40 232 253 442
E-mail: office@vanellivet.ro, www.vanellivet.ro

Производител, отговорен за освобождаване на партидата:

SC VANELLI SRL
Sos Iasi-Tg-Frumos, km. 10 Iasi,
707410-Romania
Tel.: 40 232 253 442
E-mail: office@vanellivet.ro, www.vanellivet.ro

2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

VETBENDAZOL/ВЕТБЕНДАЗОЛ,
30 % Перорална паста с фенбендазол за коне

3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ

1 ml паста съдържа:

Активна субстанция:
Fenbendazole 300 mg

Ексципиенти: monopropylen glycol, carboxymethyl cellulose, sodium benzoate, demineralised water.

4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Продуктът съдържа ендопаразитицид от класа на бензоимидазолите, който е активен срещу гастроинтестинални и белодробни нематодни видове (възрастни, ларви, яйца), които паразитират при коне, поради което е предназначен за предпазване и лечение на нематодози, причинени от: *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equines*, *Strongylus edentatus*, *Trichonema* (= *Cyathostomum*), *Parascaris equorum*, *Strongyloides westeri*, *Oxyuris equi*.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Няма.

6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ

Продуктът е добре поносим в терапевтичните дози. 20-кратно превишена доза не причинява неблагоприятни реакции.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Коня.

8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ

VETBENDAZOL трябва да се прилага перорално. Единичната доза е 10 mg/kg телесна маса, еквивалентна на 10 ml паста за кон, тежаш 300 kg. Една спринцовка от 20 ml осигурява препоръчаната доза на кон, тежаш 600 kg. Спринцовката се поставя в ъгъла на устата на коня, след което се натиска буталото. Подукът е сладко овкусен, поради което се приема лесно от животното. За да се осигури прилагането на точна доза е необходимо телесната маса да бъде определена възможно най-точно. Точността на дозиращото устройство трябва да бъде проверена. Ако животните трябва да се третира заедно, а не поотделно, те трябва да бъдат групирани според телесната им маса и съответната доза, за да се избегне по-ниско дозиране или предозиране.

По съвет на ветеринарен лекар, противопаразитното третиране може да бъде удължено до 5 дни.

9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Да се прилага по съвет на ветеринарен лекар.

10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора. Не се разрешава за употреба при животни, чието месо и вътрешни органи са предназначени за консумация от хора.

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от замръзване.

Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 10 дни.

12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП:

Поради възможността от повишаване на риска за развитие на устойчивост и неефективна терапия е необходимо е да бъдат предприети мерки за избягване на:

- твърде честото повторно използване на антихелминтици от същия клас за продължителен период от време;

- понижена дозировка, която може да се дължи на погрешна преценка на телесната маса на животното, неправилно приложение на продукта.

При подозирани клинични прояви за наличие на резистентност е необходимо обследване чрез извършване на подходящи тестове (например тест „редукция броя на яйцата във фекалиите”).

Когато резултатите от теста (тестовете) твърдо предполагат наличие на резистентност към даден антихелминтик е необходимо да се използва друг антихелминтик, принадлежащ към друг фармакологичен клас с различен начин на действие.

Устойчивост към фенбендазол е била установена при *Trichonema* при конете. Поради това употребата на продукта трябва да се базира на местната (регионална, на ниво ферма) епидемиологична информация, относно чувствителността на *Trichonema* и препоръки как да бъде ограничено по-нататъшно развитие на резистентност към антихелминтици.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност.

13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

04/2020

15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба.

S.C. VANELLI S.R.L.
Strada Iasi- Targu Frumos Km 10,
Sat Letcani, Comuna Letcani ,707280
Jud. Iasi, Romania
Tel.: 40 232 253 442
E-mail: office@vanellivet.ro, www.vanellivet.ro