

KENNZEICHNUNG**PACKUNGSBEILAGE**

Alcide UDDERgold PM vet (Base)
Konzentrat (Base) zur Herstellung einer Zitzentauchmittellösung für Rinder
(Milchkühe)

Nur mit Alcide UDDERgold PM vet (Activator) verwenden

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND HERSTELLERS

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein,
Deutschland

Distributor:
Heemskerk België bvba
Poppel, Belgien
T: 014 - 47 95 44
F: 014 - 47 95 45

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Alcide UDDERgold PM vet (Base)
Konzentrat (Base) zur Herstellung einer Zitzentauchmittellösung für Rinder (Milchkühe)
Nur mit Alcide UDDERgold PM vet (Activator) verwenden
Wirkstoff: Natriumchlorit

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Alcide UDDERgold PM vet (Base) ist eine viskose klare/weiße Lösung mit 6,4 mg/ml Natriumchlorit als Wirkstoff und Dinatriumedetatdihydrat.

Beim Mischen mit Alcide UDDERgold PM vet Activator entsteht eine goldgelbe Lösung mit einem nominellen Gehalt von 0,32 % (g/v) Natriumchlorit, die zu einer anfänglichen Gleichgewichtskonzentration von 0,016 % (g/v) chloriger Säure und einem Nennwert von 0,29 % (g/v) Natriumchlorit führt.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Alcide UDDERgold PM vet ist ein Zitzentauchmittel zur Anwendung bei Milchkühen nach dem Melken als Vorbeugung gegen Mastitis durch Erreger wie *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* oder *Escherichia coli*. Die Gelformulierung bildet bis zum nächsten Melken eine schützende Barriere auf der Zitzenspitze.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei traumatisierten oder entzündeten Zitzen.

Anwendung bei Kühen mit Anzeichen von Hautirritation oder Überempfindlichkeit gegen das Tierarzneimittel aussetzen.

Nicht zur Reinigung von Melkgeräten verwenden.

6. NEBENWIRKUNGEN

In seltenen Fällen kann es zu einer Reizung der Zitzen kommen, dies hängt jedoch zum großen Teil von den Hygienemaßnahmen ab, d. h. ob etwaige Rückstände vor dem Melken wirksam entfernt wurden. Sammeln sich Rückstände der Zitzentauchmittellösung an, kann sich eine trockene Kruste bilden. Das Entfernen dieser Kruste kann zu Wunden und gereizten Zitzen führen.

Falls Sie eine schwerwiegende Nebenwirkung oder andere Nebenwirkungen bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Milchkühe)

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur topischen Anwendung als Zitzentauchmittel. Geben Sie Alcide UDDERgold PM vet Base und Activator in gleichen Mengen in einen sauberen Messzylinder oder Dippbecher und mischen Sie die Komponenten, bis sich die Mischung einheitlich gefärbt hat. Die goldgelbe Farbe des gemischten Produkts kann mit der Zeit verblassen; dieser Vorgang kann durch höhere Temperaturen beschleunigt werden. Die Wirksamkeit des Produkts wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Euter und Zitzen vor dem Melken waschen und trocknen. Sofort **nach** dem Melken alle Zitzen bis mindestens zur Hälfte ihrer Länge in das zubereitete Zitzentauchmittel eintauchen. Die Zitzen an der Luft trocknen lassen, bevor die Kühe auf die Weide gelassen werden, vor allem bei frostiger Witterung. Unter diesen Bedingungen dauert das Trocknen etwa 8 bis 20 Minuten. Nicht abwischen. Für jede Kuh und jeden Melkvorgang werden im Durchschnitt etwa 7,5 ml des Tierarzneimittels verbraucht. Alcide UDDERgold PM vet immer frisch zubereitet und unverdünnt verwenden.

Die Zitzen vor dem nächsten Melken gründlich und sachgemäß mit einem geeigneten Euterreinigungsmittel waschen. Falls Anzeichen einer Erkrankung fortbestehen oder neu auftreten, einen Tierarzt zu Rate ziehen.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die Dippbecher sollen nach jedem Melken ausgeleert und vor der nächsten Anwendung ausgewaschen werden. Wenn das Tierarzneimittel sichtbare Verschmutzungen aufweist, den Inhalt entsorgen und mit frischer Lösung auffüllen. Das zubereitete Tierarzneimittel innerhalb von 3 Stunden verwenden.

10. WARTEZEIT

Rind:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Vor Licht schützen. Nicht einfrieren*.

Im fest verschlossenen Originalbehältnis aufbewahren.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

* Einfrieren hat keine Auswirkungen auf die Funktion des Tierarzneimittels, sofern der gefrorene Inhalt vor dem Mischen von Base und Activator vollständig aufgetaut ist und gut durchmischt wird.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach der Rekonstitution gemäß den Anweisungen: 3 Stunden

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Dieses Tierarzneimittel darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Zitzen vor dem Melken gründlich und sachgemäß mit Wasser oder einem geeigneten Euterreinigungsmittel waschen und trocknen. Die Kühe bei frostiger Witterung nicht ins Freie lassen, bevor das Zitzentauchmittel vollständig getrocknet ist. Unter diesen Bedingungen dauert das Trocknen etwa 8 bis 20 Minuten. Falls Anzeichen einer Erkrankung fortbestehen oder neu auftreten, einen Tierarzt zu Rate ziehen.

Überdosis: nicht zutreffend.

Warnhinweise für den Anwender:

Nach der Verwendung des Produktes die Hände waschen.

Auf ausreichende Belüftung achten, da reizende Chlordioxidgase freigesetzt werden können. Augenreizend. Nicht in die Augen gelangen lassen. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Auftreten einer Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Bei unbeabsichtigtem Kontakt das Tierarzneimittel durch Verdünnen entfernen, d. h.: bei äußerlichem Kontakt: mit Wasser spülen; bei Verschlucken: Wasser trinken; bei Einatmen: an die frische Luft gehen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

März 2013

15. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

3,785 l (10 l, 20 l)

Verw. bis: MM/JJJJ

Für Tiere

Zulassungsnummer: BE-V318631

Ch.-B.:

Nicht verschreibungspflichtig

KENNZEICHNUNG**PACKUNGSBEILAGE**

Alcide UDDERgold PM vet (Activator)
Konzentrat (Activator) zur Herstellung einer Zitzentauchmittellösung für Rinder
(Milchkühe)
Nur mit Alcide UDDERgold PM vet (Base) verwenden

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND HERSTELLERS

Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein,
Deutschland

Distributor:
Heemskerk België bvba
Poppel, Belgien
T: 014 - 47 95 44
F: 014 - 47 95 45

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Alcide UDDERgold PM vet (Activator)
Konzentrat (Activator) zur Herstellung einer Zitzentauchmittellösung für Rinder (Milchkühe)
Nur mit Alcide UDDERgold PM vet (Base) verwenden
Wirkstoff: Milchsäure

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Alcide UDDERgold PM vet (Activator) ist eine viskose gelbe Lösung mit 26,4 mg/ml Milchsäure als Wirkstoff, Natriumbenzoat (E 211) und Tartrazin (E 102).

Beim Mischen mit Alcide UDDERgold PM vet Base entsteht eine goldgelbe Lösung mit einem nominellen Gehalt von 0,32 % (g/v) Natriumchlorit, die zu einer anfänglichen Gleichgewichtskonzentration von 0,016 % (g/v) chloriger Säure und einem Nennwert von 0,29 % (g/v) Natriumchlorit führt.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Alcide UDDERgold PM vet ist ein Zitzentauchmittel zur Anwendung bei Milchkühen nach dem Melken als Vorbeugung gegen Mastitis durch Erreger wie *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis* oder *Escherichia coli*. Die Gelformulierung bildet bis zum nächsten Melken eine schützende Barriere auf der Zitzenspitze.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei traumatisierten oder entzündeten Zitzen.

Anwendung bei Kühen mit Anzeichen von Hautirritation oder Überempfindlichkeit gegen das Tierarzneimittel aussetzen.

Nicht zur Reinigung von Melkgeräten verwenden.

6. NEBENWIRKUNGEN

In seltenen Fällen kann es zu einer Reizung der Zitzen kommen, dies hängt jedoch zum großen Teil von den Hygienemaßnahmen ab, d. h. ob etwaige Rückstände vor dem Melken wirksam entfernt wurden. Sammeln sich Rückstände der Zitzentauchmittellösung an, kann sich eine trockene Kruste bilden. Das Entfernen dieser Kruste kann zu Wunden und gereizten Zitzen führen.

Falls Sie eine schwerwiegende Nebenwirkung oder andere Nebenwirkungen bei Ihrem Tier/Ihren Tieren feststellen, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese Ihrem Tierarzt mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Milchkühe)

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur topischen Anwendung als Zitzentauchmittel. Geben Sie die Alcide UDDERgold PM vet Base und Activator in gleichen Mengen in einen sauberen Messzylinder oder Dippbecher und mischen Sie die Komponenten, bis sich die Mischung einheitlich gefärbt hat. Die goldgelbe Farbe des gemischten Produkts kann mit der Zeit verblassen; dieser Vorgang kann durch höhere Temperaturen beschleunigt werden. Die Wirksamkeit des Produkts wird dadurch nicht beeinträchtigt.

Euter und Zitzen vor dem Melken waschen und trocknen. Sofort **nach** dem Melken alle Zitzen bis mindestens zur Hälfte ihrer Länge in das zubereitete Zitzentauchmittel eintauchen. Die Zitzen an der Luft trocknen lassen, bevor die Kühe auf die Weide gelassen werden, vor allem bei frostiger Witterung. Unter diesen Bedingungen dauert das Trocknen etwa 8 bis 20 Minuten. Nicht abwischen. Für jede Kuh und jeden Melkvorgang werden im Durchschnitt etwa 7,5 ml des Tierarzneimittels verbraucht. Alcide UDDERgold PM vet immer frisch zubereitet und unverdünnt verwenden.

Die Zitzen vor dem nächsten Melken gründlich und sachgemäß mit einem geeigneten Euterreinigungsmittel waschen. Falls Anzeichen einer Erkrankung fortbestehen oder neu auftreten, einen Tierarzt zu Rate ziehen.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Die Dippbecher sollen nach jedem Melken ausgeleert und vor der nächsten Anwendung ausgewaschen werden. Wenn das Tierarzneimittel sichtbare Verschmutzungen aufweist, den Inhalt entsorgen und mit frischer Lösung auffüllen. Das zubereitete Tierarzneimittel innerhalb von 3 Stunden verwenden.

10. WARTEZEIT

Rind:

Essbare Gewebe: Null Tage

Milch: Null Stunden

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Vor Licht schützen. Nicht einfrieren*.

Im fest verschlossenen Originalbehälter aufbewahren.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

* Einfrieren hat keine Auswirkungen auf die Funktion des Tierarzneimittels, sofern der gefrorene Inhalt vor dem Mischen von Base und Activator vollständig aufgetaut ist und gut durchmischt wird.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Etikett angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Haltbarkeit nach der Rekonstitution gemäß den Anweisungen: 3 Stunden

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Nur zur äußerlichen Anwendung.

Dieses Tierarzneimittel darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden.

Zitzen vor dem Melken gründlich und sachgemäß mit Wasser oder einem geeigneten Euterreinigungsmittel waschen und trocknen. Die Kühe bei frostiger Witterung nicht ins Freie lassen, bevor das Zitzentauchmittel vollständig getrocknet ist. Unter diesen Bedingungen dauert das Trocknen etwa 8 bis 20 Minuten. Falls Anzeichen einer Erkrankung fortbestehen oder neu auftreten, einen Tierarzt zu Rate ziehen.

Überdosis: nicht zutreffend.

Warnhinweise für den Anwender:

Nach der Verwendung des Produktes die Hände waschen.

Auf ausreichende Belüftung achten, da reizende Chlordioxidgase freigesetzt werden können. Augenreizend. Nicht in die Augen gelangen lassen. Bei Augenkontakt mit reichlich Wasser ausspülen. Bei Auftreten einer Reizung einen Arzt hinzuziehen.

Bei unbeabsichtigtem Kontakt das Tierarzneimittel durch Verdünnen entfernen, d. h.: bei äußerlichem Kontakt: mit Wasser spülen; bei Verschlucken: Wasser trinken; bei Einatmen: an die frische Luft gehen.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

März 2013

3,785 l (10 l, 20 l)

Verw. bis: MM/JJJJ

Für Tiere

Zulassungsnummer: BE-V318631

Ch.-B.:

Nicht verschreibungspflichtig