

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Tetra-Delta intramamarna suspenzija za krave v laktaciji

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

10 ml sterilne intramamarne suspenzije (en injektor) vsebuje:

Zdravilne učinkovine:

novobiocin v obliki natrijevega novobiocinata	100,0 mg
neomicin v obliki neomicinijevega sulfata	105,0 mg
prokainijev penicilinat	100,0 mg
dihidrostreptomicin v obliki dihidrostreptomicinijevega sulfata	100,0 mg
prednizolon	10,0 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Intramamarna suspenzija

4. VELIKOST PAKIRANJA

20 injektorjev
20 vrečk x 10 injektorjev

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Krave v laktaciji

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Intramamarno

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:

Govedo

Meso in organi: 7 dni.

Mleko: 108 ur.

9. POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25°C.

12. POSEBNI VARNOSTNO UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEUPORABLJENEGA ZDRAVILA, ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI ” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je navedba smiselna

Samo za živali – Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM.”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium SA,
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0330/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Injektor

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Tetra-Delta intramamarna suspenzija za krave v laktaciji

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Novobiocin 100 mg, neomicin 105 mg, prokainijev penicilinat 100 mg, dihidrostreptomycin 100 mg in prednizolon 10 mg

3. VSEBINA IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

4. POT UPORABE ZDRAVILA

i/mam

5. KARENCA

Karenca:

Govedo

Meso in organi: 7 dni.

Mleko: 108 ur.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

6. BESEDILO " SAMO ZA ŽIVALI. "

Samo za živali.