

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Schachtel mit 200, 500 oder 1000 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Virbamec F Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Wirkstoffe:

Ivermectin _____ 10 mg/ml

Clorsulon _____ 100 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

200 ml

500 ml

1000 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe: 66 Tage

Milch:

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Nicht bei Milchkühen außerhalb der Laktation und bei trächtigen Färsen 60 Tage vor dem Abkalben anwenden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Originalbehältnis aufbewahren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V274951

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Fläschchen mit 200 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Virbamec F Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Ivermectin	10	mg/ml
Clorsulon	100	mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe: 66 Tage
Milch:
Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Originalbehältnis aufbewahren.
Vor Licht schützen.
Nach Entnahme der ersten Dosis das Produkt innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Fläschchen mit 500 und 1000 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Virbamec F Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Ivermectin	10	mg/ml
Clorsulon	100	mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Essbare Gewebe: 66 Tage

Milch:

Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

Nicht bei Milchkühen außerhalb der Laktation und bei trächtigen Färsen 60 Tage vor dem Abkalben anwenden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.

Im Originalbehältnis aufbewahren.

Nach Entnahme der ersten Dosis das Produkt innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

VIRBAC

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}