

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**UMKARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Presedine 10 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Detomidinhydrochlorid 10,0 mg/ml
(entsprechend 8,36 mg/ml Detomidin)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 ml

10 ml

20 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd und Rind

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre oder intravenöse Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Pferde, Rinder:

Essbare Gewebe: 2 Tage

Milch: 12 Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen. Nach Anbrechen verwendbar bis ___/___

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Alfasan Nederland B.V.

Mitvertreiber:
PowerVet - Florian Schaible GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z.Nr.: 841758

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**Durchstechflaschen aus Glas zu 5 ml (in einer 10-ml-Durchstechflasche)****Durchstechflaschen aus Glas zu 10 ml****Durchstechflaschen aus Glas zu 20 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Presedine

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Detomidinhydrochlorid 10,0 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.