

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PolyVar Yellow 275 mg imprägnierter Streifen für den Bienenstock

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Streifen für den Bienenstock: 275 mg Flumethrin.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 imprägnierter Streifen für den Bienenstock
100 imprägnierter Streifen für den Bienenstock

4. ZIELTIERART(EN)

Honigbiene (*Apis mellifera*).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

Behandlung der Varroose (*Varroa destructor*).

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Anwendung im Bienenstock. Zugang zum Bienenstock als Schleuse verwenden.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit für Honig: Null Tage.
Nicht während der Trachtzeit anwenden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.


11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco 

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V508133

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Folienbeutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

PolyVar Yellow 275 mg imprägnierter Streifen für den Bienenstock

2. WIRKSTOFF(E)

Pro Streifen für den Bienenstock: 275 mg Flumethrin.

3. ZIELTIERART(EN)Honigbiene (*Apis mellifera*).**4. ARTEN DER ANWENDUNG**


Anwendung im Bienenstock.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit für Honig: Null Tage.
Nicht während der Trachtzeit anwenden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen sofort verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**Elanco **9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}