

BIJSLUITER**Propodine 10 mg/ml emulsie voor injectie/infusie voor honden en katten****1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Dechra Regulatory B.V.

Handelsweg 25

5531 AE Bladel

Nederland

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte: Corden Pharma S.p.A

Viale dell'Industria 3

20867 Caponago

Italië

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Propodine 10 mg/ml emulsie voor injectie/infusie voor honden en katten

Propofol

3. GEHALTE AAN WERKZAAM EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzaam bestanddeel:

Propofol 10,0 mg

Witte of nagenoeg witte homogene emulsie.

4. INDICATIE(S)

- algemene anesthesie voor kortdurende diagnostische of chirurgische procedures (maximaal 5 minuten);
- inductie en onderhoud van algemene anesthesie;
- inductie van algehele anesthesie die wordt onderhouden door inhalatieanesthetica.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen.

6. BIJWERKINGEN

De inductie verloopt gewoonlijk vlot. Toch worden tekenen van excitatie (bv. fietsbewegingen met de ledematen, nystagmus, focale spiertrekkingen/myoclonus, opisthotonus) waargenomen bij honden en katten. Voorbijgaande apneu en milde hypotensie kunnen zeer vaak voorkomen tijdens inductie van

anesthesie. Ook een arteriële bloeddrukstijging gevolgd door een daling is mogelijk waar te nemen. Zie rubriek 12 (Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren). Het is mogelijk dat het percentage hemoglobine dat verzadigd is met zuurstof (SpO_2) daalt zonder dat apneu wordt waargenomen.

Er zijn soms gevallen van overmatige speekselvorming en braken gemeld tijdens de herstelfase bij honden. In zeldzame gevallen is excitatie tijdens de herstelfase waargenomen bij honden. Stramme ledematen en aanhoudende hik zijn in zeer zeldzame gevallen waargenomen bij honden. Er is een geïsoleerde melding gemaakt van een hond met groen verkleurde urine na een langdurige infusie met propofol.

Bij katten zijn in een klein aantal gevallen (soms) niezen, occasioneel kokhalzen en likken aan poten en gezicht waargenomen tijdens de recovery.

Herhaalde langdurige (> 20 minuten) anesthesie met propofol kan bij katten oxidatieve schade veroorzaken en leiden tot de vorming van Heinz-bodies, alsook niet-specifieke verschijnselen zoals anorexia, diarree en mild faciaal oedeem. Het herstel kan ook langer duren. Herhaalde anesthesie beperken tot toediening met intervallen van meer dan 48 uur verkleint de kans dat dit gebeurt.

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten)

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORTEN

Hond en kat



8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

Voor intraveneus gebruik.

Inductie van anesthesie:

De inductiedosering van het diergeneesmiddel in onderstaande tabel is gebaseerd op gepubliceerde gegevens afkomstig van gecontroleerde laboratorium- en veldstudies én op klinische ervaring. De tabel geeft de gemiddelde inductiedosis voor honden en katten. Deze doses dienen uitsluitend als leidraad. **De feitelijke dosis moet worden getitreerd volgens de reactie van het dier in kwestie en kan significant lager of hoger liggen dan de gemiddelde dosis.**

De doseerspuit moet worden klaargemaakt op basis van het hieronder getoonde dosisevolume van het diergeneesmiddel, berekend volgens het lichaamsgewicht. Het diergeneesmiddel moet worden

toegediend tot het anesthesieniveau voldoende is voor endotracheale intubatie. Wanneer anesthesie wordt geïnduceerd met propofol moet het diergeneesmiddel langzaam genoeg worden geïnjecteerd om een evenwicht tot stand te brengen tussen plasma en de plaats waar het effect optreedt en snel genoeg om redistributie vanuit de hersenen te vermijden, omdat dat kan resulteren in een ontoereikend anesthesieniveau (m.a.w. toediening gedurende ongeveer 10-40 seconden). Waar propofol samen met een opioïde wordt gebruikt, moet het langzamer worden toegediend, bijvoorbeeld gedurende 40-60 seconden. Zie rubriek 12 (Interactie).

Het gebruik van pre-anesthetica (premedicatie) kan de benodigde hoeveelheid propofol aanzienlijk verlagen, afhankelijk van het type en de dosis van de gebruikte pre-anesthetica. Als propofol gebruikt wordt in combinatie met bv. ketamine, fentanyl of benzodiazepines om anesthesie te induceren (zogenoeten co-inductie), kan de totale dosis propofol verder verlaagd worden.

Dosisaanbevelingen voor inductie van anesthesie:

	Dosis mg/kg lichaamsgewicht	Dosisvolume ml/kg lichaamsgewicht
HONDEN		
Zonder premedicatie	6,5 mg/kg	0,65 ml/kg
Met premedicatie		
Met niet- α -2-agonist (op basis van acepromazine)	4,0 mg/kg	0,40 ml/kg
Met α -2-agonist	2,0 mg/kg	0,20 ml/kg
KATTEN		
Zonder premedicatie	8,0 mg/kg	0,80 ml/kg
Met premedicatie		
Met niet- α -2-agonist (op basis van acepromazine)	6,0 mg/kg	0,60 ml/kg
Met α -2-agonist	4,5 mg/kg	0,45 ml/kg

Propofol wordt gebruikt als inductiemiddel in combinatie met andere premedicatieregimes. Zie rubriek 12 (Interactie) voor meer details.

Onderhoud van anesthesie:

Na inductie van anesthesie met het diergeneesmiddel, kan het dier geïntubeerd worden en kan het diergeneesmiddel of een inhalatieanestheticum worden gebruikt om de anesthesie te onderhouden. Onderhoudsdoses van het diergeneesmiddel kunnen worden toegediend als herhaalde bolusinjecties of als een continue infusie. Continue en langdurige blootstelling kan leiden tot een langzamere recovery, voornamelijk bij katten.

Herhaalde bolusinjectie:

Waar anesthesie in stand wordt gehouden met herhaalde bolusinjecties, variëren de dosissnelheid en de duur van het effect afhankelijk van het dier. Een stapsgewijze dosistoename van ongeveer 1-2 mg/kg (0,1-0,2 ml/kg lichaamsgewicht) bij honden en 0,5-2 mg/kg (0,05-0,2 ml/kg lichaamsgewicht) bij katten is mogelijk wanneer de anesthesie te licht wordt. Deze dosis mag indien nodig herhaald worden om de anesthesie voldoende diep te houden.

Continue infusie:

Voor continue infusie anesthesie bedraagt de voorgestelde dosissnelheid om te beginnen 0,30,4 mg/kg/min (1,82,4 ml/kg/uur) bij honden en 0,20,3 mg/kg/min (1,21,8 ml/kg/uur) bij katten. Het gebruik van pre-anesthetica (premedicatie) of een gelijktijdige infusie van bv. ketamine of opioïden kan de vereiste hoeveelheid propofol verlagen afhankelijk van het type en de dosis van de gebruikte geneesmiddelen. De feitelijke infusiesnelheid moet gebaseerd zijn op de reactie van het dier in kwestie en het gewenste anesthesieniveau, en kan stapsgewijs worden aangepast met telkens 0,010,05 mg/kg/minuut (0,06-0,3 ml/kg/uur), gebaseerd op de evaluatie van de diepte van de

anesthesie en de cardiovasculaire respons. Als het anesthesieniveau snel moet toenemen, kan een aanvullende bolus propofol (0,51 mg/kg [0,05-0,1 ml/kg] bij honden en 0,2-0,5 mg/kg [0,02-0,05 ml/kg] bij katten) worden toegediend.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Schud de injectieflacon zacht maar grondig vóór opening. Zie rubriek 12 (Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort).

10. WACHTTIJD(EN)

Niet van toepassing.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Niet in de vriezer bewaren.

Bewaar in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Diergeneesmiddel dat uit de verpakking is gehaald, moet onmiddellijk worden gebruikt. Het resterende diergeneesmiddel in de injectieflacon moet worden weggegooid.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de buitenverpakking en het etiket na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.

Houdbaarheid na eerste opening van de container: direct gebruiken.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Dit diergeneesmiddel is een stabiele emulsie. Vóór gebruik moet het diergeneesmiddel visueel geïnspecteerd worden op de afwezigheid van zichtbare druppeltjes of vreemde deeltjes. Zijn die aanwezig, dan moet het diergeneesmiddel worden weggegooid. Niet gebruiken als er nog steeds sprake is van fasescheiding na zacht schudden.

Als het diergeneesmiddel te langzaam geïnjecteerd wordt, kan het anesthesieniveau onvoldoende blijken, omdat de benodigde drempelwaarde voor farmacologische activiteit niet wordt bereikt.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Tijdens inductie van anesthesie kunnen milde hypotensie en voorbijgaande apneu optreden.

Als het diergeneesmiddel te snel geïnjecteerd wordt, kan cardiopulmonaire depressie voorkomen (apneu, bradycardie, hypotensie).

Als het diergeneesmiddel gebruikt wordt, moeten er voorzieningen beschikbaar zijn om de luchtwegen vrij te houden, kunstmatig te beademen en zuurstof toe te dienen. Het wordt aangeraden om een endotracheale tube te gebruiken na inductie van anesthesie. Geadviseerd wordt om extra zuurstof toe te dienen terwijl de anesthesie wordt onderhouden.

Voorzichtigheid is geboden bij honden en katten met hart-, ademhalings-, nier- of leverstoornissen of bij hypovolemische of verzwakte dieren.

Als propofol gelijktijdig met opioïden wordt gebruikt, kan een anticholinergicum (bv. atropine) worden gebruikt in geval van bradycardie overeenkomstig een baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts. Zie rubriek over interacties.

Voorzichtigheid is geboden wanneer het diergeneesmiddel wordt toegediend aan dieren met hypoproteïnemie, hyperlipidemie of heel lichte dieren, aangezien deze dieren gevoeliger kunnen zijn voor bijwerkingen.

Propofol heeft geen analgetische eigenschappen. Daarom zijn aanvullende analgetica nodig wanneer een pijnlijke procedure wordt verwacht.

Er is gemeld dat de klaring van propofol langzamer verloopt en apneu vaker voorkomt bij honden ouder dan 8 jaar in vergelijking met jongere dieren. Extra voorzichtigheid is geboden wanneer het diergeneesmiddel aan oudere dieren wordt toegediend. Zo kan een lagere dosis propofol in dergelijke gevallen volstaan voor inductie.

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen bij honden of katten jonger dan 4 maanden. Bij die dieren mag het dan ook alleen gebruikt worden overeenkomstig een baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Er is gemeld dat de klaring van propofol bij windhonden langzamer verloopt en dat de recovery van de anesthesie mogelijk langer duurt dan bij andere.

Gebruik aseptische technieken wanneer het diergeneesmiddel wordt toegediend, want het bevat geen antimicrobieel bewaarmiddel.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Propofol is een krachtig geneesmiddel: bijzondere voorzichtigheid is geboden om accidentele zelfinjectie te vermijden. Laat de beschermkap op de naald tot het moment van injectie.

In geval van accidentele zelfinjectie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond, maar **BESTUUR GEEN VOERTUIG**, aangezien sedatie kan optreden.

Vermijd contact met huid en ogen, aangezien dit diergeneesmiddel irritatie kan veroorzaken. Spoel spatten onmiddellijk met veel water van de huid en uit de ogen. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.

Dit diergeneesmiddel kan overgevoeligheidsreacties (allergische reacties) veroorzaken bij personen die al gevoelig zijn voor propofol of andere geneesmiddelen, soja of eieren. Personen met een bekende overgevoeligheid voor deze stoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Advies voor de arts:

Laat de patiënt niet alleen. Houd de luchtwegen vrij en zorg voor symptomatische en ondersteunende behandeling.

Dracht en lactatie:

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet bewezen tijdens dracht (bij foetussen/pasgeborenen) en tijdens lactatie.

Propofol passeert de placenta. Uit studies met propofol bij drachtige ratten en konijnen bleken geen schadelijke effecten op de dracht van de behandelde dieren of op de voortplantingsresultaten van hun jongen. Toch wijst beschikbare wetenschappelijke literatuur erop dat blootstelling (niet-menselijke primaten: matig anesthesieniveau gedurende 5 uur; ratten: 0,3-0,6 mg/kg/min gedurende 1 tot 2 uur) aan propofol tijdens de periode waarin de hersenen zich ontwikkelen, de neurologische ontwikkeling van foetussen en pasgeborenen negatief kan beïnvloeden.

Studies bij mensen toonden aan dat kleine hoeveelheden (< 0,1% van de maternale dosis binnen 24 uur na dosering) propofol worden uitgescheiden in de moedermelk.

Uitsluitend gebruiken overeenkomstig de baten/risicobeoordeling door de behandelende dierenarts.

Propofol is veilig gebruikt bij honden voor de inductie van anesthesie voorafgaand aan een keizersnede. Gezien het risico op sterfte bij pasgeborenen wordt het gebruik van propofol om de anesthesie tijdens een keizersnede te onderhouden afgeraden.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Propofol is gebruikt in combinatie met vaak gebruikte premedicatie (bv. atropine, acepromazine, benzodiazepines [bv. diazepam, midazolam], α -2-agonisten [bv. medetomidine, dexmedetomidine], opioïden [bv. methadon, buprenorfine]), andere inductiemiddelen (bv. ketamine) en vóór onderhoud met inhalatiemiddelen (bv. halothaan, distikstofmonoxide, isofluraan, sevofluraan).

Het gelijktijdig gebruik van sedativa of analgetica verlaagt waarschijnlijk de dosis propofol die nodig is om anesthesie te induceren en te onderhouden. Zie rubriek 8.

Gelijktijdig gebruik van propofol en opioïden kan een significante ademhalingsdepressie en een sterke daling van de hartslag veroorzaken. Een hartstilstand is waargenomen bij honden die propofol kregen gevolgd door alfentanil. Om het risico op apneu te verminderen, moet propofol langzaam worden toegediend, bijvoorbeeld in 40-60 seconden. Zie ook de rubriek Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren.

Gelijktijdige toediening van propofol en infusies met opioïden (bv. fentanyl, alfentanil) om algemene anesthesie in stand te houden, kan resulteren in een verlengde recovery.

Toediening van propofol met andere geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden door cytochroom P450 (iso-enzym 2B11 bij honden), zoals chlooramfenicol, ketoconazol en loperamide, vermindert de klaring van propofol en verlengt de recoveryfasel van de anesthesie.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Onbedoelde overdosering veroorzaakt waarschijnlijk cardiorespiratoire depressie.

Ademhalingsdepressie moet worden behandeld met kunstmatige beademing met zuurstof. De cardiovasculaire werking moet worden ondersteund door bloeddrukverhogende middelen en intraveneuze vloeistoffen toe te dienen.

Bij honden kunnen doses van meer dan 9 mg/kg toegediend met een snelheid van 2 mg/s cyanose van de slijmvliezen veroorzaken. Mydriase kan ook worden waargenomen na een overdosis. Cyanose en mydriase wijzen erop dat extra zuurstof nodig is. Bij doses van meer dan 16,5 mg/kg toegediend met een snelheid van 2 mg/s is apneu gemeld die langer dan 90 seconden duurde. Bij doses van 20 mg/kg en meer toegediend met een snelheid van 0,5 mg/s is sterfte gemeld.

Herhaalde infusies van 0,6-0,7 mg/kg/min gedurende ongeveer 1 uur per dag gedurende 14 opeenvolgende dagen resulteerden bij honden in een verhoogde hartslag en gemiddelde arteriële bloeddruk en een daling van het aantal rode bloedcellen, hemoglobine en hematocriet. Hoewel de dieren kunstmatig beademd werden, waren er aanwijzingen van respiratoire acidose, waarschijnlijk te wijten aan depressie van de ademhalingscentra met onvoldoende alveolaire ventilatie en CO₂-accumulatie tot gevolg.

Een kat stierf aan apneu na injectie van 19,5 mg/kg, toegediend als een enkelvoudige dosis.

Belangrijke onverenigbaarheden:

Niet mengen met andere diergeneesmiddelen, met uitzondering van dextrose 5% intraveneuze infusie of natriumchloride 0,9% intraveneuze infusie.

13. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

September 2019

15. OVERIGE INFORMATIE

Kleurloze type I glazen injectieflacons van 20 ml, 50 ml en 100 ml, afgesloten met een gecoate bromobutylrubberen stop en een aluminium felscapsule in een kartonnen doos.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

KANALISATIE

Op diergeneeskundig voorschrift
BE-V545351