

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Porcilis M Hyo ID ONCE
Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

M. hyopneumoniae, inaktiviert, Stamm 11 $\geq 6,5 \log_2$ AK-Titer/Dosis

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 Dosen
5x50 Dosen
10x50 Dosen
100 Dosen
5x100 Dosen
10x100 Dosen

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intradermalen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Stunden aufbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.

Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Intervet Deutschland GmbH

AT: Intervet GesmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr.: PEI.V.11476.01.1

AT: Z. Nr.: 8-20328

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Durchstechflaschen zu 10 ml oder 20 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Porcilis M Hyo ID ONCE

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN** $\geq 6,5 \log_2$ AK-Titer *M. hyopneumoniae*/Dosis

50 Dosen

100 Dosen

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Stunden aufbrauchen.