

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Saszetka (1 kg – 100 g)

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Nanotrim 464,2 mg/g + 100 mg/g proszek do podania w wodzie do picia/w mleku

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy gram zawiera:

Substancja czynna:

Sulfachloropirydazyna 464,20 mg (co odpowiada 500 mg sulfachloropirydazyny sodowej)

Trimetoprim 100 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 g

1 kg

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kura, indyk, świnia, bydło (cielęta z nierozwiniętą funkcją przedżołądków).

5. WSKAZANIA LECZNICZE

6. DROGI PODANIA

Podanie w wodzie do picia/w mleku (preparacie mlekozastępczym) (patrz szczegóły dla każdego gatunku docelowego).

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Kurczęta

Tkanki jadalne: 3 dni.

Indyki

Tkanki jadalne: 9 dni.

Świnie

Tkanki jadalne: 7 dni.

Bydło (cielęta z nierozwiniętą funkcją przedżołądków)

Tkanki jadalne: 7 dni.

Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków produkujących jaja lub odchowywanych z zamiarem pozyskiwania jaj przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Produkt po rozpuszczeniu w wodzie do picia należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Produkt po rozpuszczeniu w preparacie mlekozastępczym należy zużyć w ciągu 1 godziny.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią. Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać saszetkę szczelnie zamkniętą.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Huvepharma NV

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia:

15. NUMER SERII

Lot