

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

UMKARTON

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Baytril Direct 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Enrofloxacin 100 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind: **s.c.** oder **i.v.**

Schwein: **i.m.**

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:

Essbare Gewebe:

s.c.: 14 Tage.

i.v.: 7 Tage.

Milch:

s.c.: 120 Stunden.

i.v.: 72 Stunden.

Schwein:

Essbare Gewebe: **i.m.:** 12 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Frost schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco 

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Z. Nr.: 8-01123

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

DURCHSTECHFLASCHE

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Baytril Direct 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Enrofloxacin 100 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schwein.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind: **s.c.** oder **i.v.**

Schwein: **i.m.**

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:

Essbare Gewebe:

s.c.: 14 Tage.

i.v.: 7 Tage.

Milch:

s.c.: 120 Stunden.

i.v.: 72 Stunden.

Schwein:

Essbare Gewebe: **i.m.:** 12 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: _____

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Frost schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Elanco 

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}