

**NOTICE**

Albiotic, solution intramammaire pour bovins en lactation

**1. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ ET DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE FABRICATION RESPONSABLE DE LA LIBÉRATION DES LOTS, SI DIFFÉRENT****Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché :**

Huvepharma NV  
Uitbreidingstraat 80  
2600 Anvers  
Belgique

**Fabricant responsable de la libération des lots :**

Biovet Joint Stock Company  
39, Petar Rakov Str.  
4550 Peshtera  
Bulgarie

**2. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Albiotic, solution intramammaire pour bovins en lactation

**3. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET AUTRE(S) INGRÉDIENT(S)****Substances actives:**

*Lincomycini hydrochloridum* (= *Lincomycinum* 330 mg) – *Neomycini sulfas* (= *Neomycinum* 100 mg) –

-

**Excipients:**

*Dinatrii edetas* - *Aqua ad iniectabilia q.s. ad 10 ml.*

**4. INDICATION(S)**

Traitement, chez les bovins en lactation, des mammites causées par les staphylocoques (les souches pénicillinase-positives comme les souches pénicillinase-négatives), y compris *Staphylococcus aureus*; les streptocoques, tels que *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae* et *Streptococcus uberis* ; et les bactéries coliformes, y compris *Escherichia coli*, sensibles à la lincomycine et/ou la néomycine.

**5. CONTRE-INDICATIONS**

Ne pas utiliser chez des animaux hypersensibles à la lincomycine ou à la néomycine.

## **6. EFFETS INDÉSIRABLES**

Aucun connu.

Si vous constatez des effets indésirables graves ou d'autres effets ne figurant pas sur cette notice, veuillez en informer votre vétérinaire.

## **7. ESPÈCE(S) CIBLE(S)**

Les bovins en lactation.

## **8. POSOLOGIE POUR CHAQUE ESPÈCE, VOIE(S) ET MODE D'ADMINISTRATION**

Infusez un injecteur de 10 ml par quartier infecté, trois fois à 12 heures d'intervalles.

Mode d'administration: intramammaire, avec les précautions nécessaires pour respecter l'asepsie. Si nécessaire, bien nettoyer le(s) trayon(s) ou la mamelle entière avec de l'eau chaude et un antiseptique approprié, et essuyez complètement. Traire complètement le quartier. Désinfectez la pointe du trayon avec une serviette d'alcool ou un désinfectant approprié. Utilisez une nouvelle serviette pour chaque trayon. Enlevez le capuchon de la canule plastique. Insérez la pointe de la canule dans le canal du trayon. Poussez le piston complètement pour administrer tout le contenu de l'injecteur et puis massez doucement le quartier pour répartir le produit dans les sinus galactophores. Après infusion, il est conseillé de traiter tous les trayons avec une solution désinfectante appropriée.

## **9. CONSEILS POUR UNE ADMINISTRATION CORRECTE**

Aucun.

## **10. TEMPS D'ATTENTE**

Lait: 84 heures.

Viande et abats: 3 jours.

## **11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ne dépassant pas 30 °C. Protéger du gel.

Ne pas utiliser ce médicament vétérinaire après la date de péremption figurant sur l'étiquette après EXP.

## **12. MISE(S) EN GARDE PARTICULIÈRE(S)**

*Précautions particulières d'emploi chez les animaux :*

La sélection de résistances est susceptible d'évoluer chez certains micro-organismes pathogènes ; l'utilisation du produit devrait donc être basée sur les résultats des tests de sensibilité.

*Précautions particulières à prendre par la personne administrant le médicament aux animaux :*

Il est conseillé aux personnes hypersensibles aux lincosamines ou aux aminoglycosides, d'utiliser des gants pendant la manipulation de l'injecteur.

*Gestation et lactation :*

Peut être utilisé au cours de la gestation et lactation

*Interactions médicamenteuses ou autres formes d'interactions :*

Un antagonisme peut survenir avec des macrolides.

*Surdosage (symptômes, conduite d'urgence, antidotes) :*

Le produit est bien toléré par les vaches laitières en lactation.

En cas de surdosage accidentel, aucune réaction locale ou systémique n'est attendue. Tout signe qui pourrait indiquer des effets secondaires possibles doit être signalé au vétérinaire traitant.

### **13. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Tous médicaments vétérinaires non utilisés ou déchets dérivés de ces médicaments doivent être éliminés conformément aux exigences locales.

### **14. DATE DE LA DERNIÈRE NOTICE APPROUVÉE**

Novembre 2019

### **15. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

BE-V202517

Applicateurs intramammaires en polyéthylène de 10 ml et serviettes d'alcool pour désinfecter les trayons.

Boîtes de 3 x 10 ml, 12 x 10 ml, 24 x 10 ml et 96 x 10 ml

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire