

## SOMMARIO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

FRONTLINE® SPRAY (*fipronil 0,25%*)

### 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

#### 2.1 Principio attivo

Fipronil ..... 0,25 g

#### 2.2 Eccipienti

- Isopropanolo.....80 ml  
- Copolividone.....2 g  
- Acqua deionizzata q.b. a.....100 ml

### 3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione per uso esterno

### 4. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE

Il fipronil è un insetticida/acaricida, appartenente alla famiglia dei fenilpirazoli, che agisce a livello dei canali del cloro - su cui agisce anche il neurotrasmettitore acido gamma aminobutirrico (GABA) - bloccando il trasferimento pre e post-sinaptico degli ioni cloro attraverso la membrana cellulare. Questo determina una alterazione della trasmissione dell'impulso nervoso, quindi delle funzioni del sistema nervoso centrale degli insetti e degli acari, con conseguente morte dell'ectoparassita. Il fipronil si concentra nelle ghiandole sebacee dei follicoli piliferi da dove viene "rilasciato", naturalmente, nel tempo.

### 5. PARTICOLARI DI NATURA CLINICA

#### 5.1 Specie di destinazione

Cane - Gatto

#### 5.2 Indicazioni per l'utilizzo

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da **zecche**, da **pulci** e da **pidocchi** nei cani e nei gatti di 2 giorni, o più, di età.

- Il fipronil esplica rapidamente la sua azione letale sulle **zecche**, impedendo lo sviluppo del parassita e l'eventuale trasmissione di infezioni di cui la zecca sia vettore. È attivo contro le principali specie di zecche presenti sul territorio nazionale, tra cui *Ixodes ricinus*, responsabile della trasmissione della malattia di Lyme al cane, al gatto e all'uomo.

- Il fipronil agisce sulle **pulci** uccidendo rapidamente le forme adulte, prevenendo così la deposizione di uova e quindi nuove infestazioni. Grazie all'azione letale sulle pulci adulte, il fipronil contribuisce efficacemente al controllo ed alla risoluzione della Dermatite Allergica da Pulci (DAP) che, nel cane e nel gatto, è provocata dall'azione sensibilizzante esercitata dagli antigeni contenuti nella saliva di tali parassiti.
- Il fipronil inoltre, con un singolo trattamento, controlla e risolve in modo rapido e definitivo le infestazioni da **pidocchi** nel cane e nel gatto, in particolare quelle provocate da *Trichodectes canis*, pidocchio masticatore del cane e da *Felicola subrostratus*, pidocchio masticatore del gatto

### 5.3 Controindicazioni

Non usare su animali con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare in animali malati (malattie sistemiche, con febbre...) o convalescenti.

Non usare nei conigli, poiché potrebbero manifestarsi reazioni avverse potenzialmente mortali.

### 5.4 Effetti indesiderati

Qualora gli animali si leccino, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente agli eccipienti del prodotto.

Tra gli estremamente rari fenomeni di sospette reazioni avverse, sono state descritte transitorie reazioni cutanee come eritema, prurito o alopecia dopo applicazione. Eccezionalmente, sono stati osservati ipersalivazione, sintomi neurologici reversibili (iperestesia, abbattimento, sintomi nervosi), vomito o sintomatologia respiratoria.

Non superare la dose consigliata.

### 5.5 Speciali precauzioni di impiego

Solo per uso esterno

I bagni, la pioggia, gli shampoo non interferiscono sulla durata dell'attività del prodotto nei confronti degli ectoparassiti.

È importante che gli animali non si leccino l'un l'altro dopo il trattamento.

Si consiglia di non permettere ai cani di nuotare in corsi d'acqua nei 2 giorni successivi all'applicazione del prodotto, poiché il fipronil può essere dannoso per gli organismi acquatici.

Se non correttamente applicato, singole zecche potrebbero attaccarsi al cane o al gatto. Per questa ragione, nel peggiore dei casi, non può essere completamente esclusa la trasmissione di malattie infettive.

Le pulci presenti sugli animali spesso infestano la cesta dell'animale, le coperte e le zone in cui l'animale vive, in particolare tappeti, tende e tessuti d'arredamento; questi, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario, possono essere trattati con un insetticida apposito e regolarmente ripuliti con un aspiratore.

## 5.6 Utilizzo durante la gravidanza e l'allattamento

Il prodotto può essere utilizzato nella cagna e nella gatta sia durante la gravidanza che nel periodo dell'allattamento.

FRONTLINE® SPRAY è ben tollerato dai cuccioli e dai gattini, dopo trattamento delle madri durante l'allattamento. Cuccioli e gattini di 2 giorni di età possono essere trattati senza alcun rischio.

## 5.7 Interazioni con altri medicinali veterinari ed altri tipi di interazione

Nessuna interazione nota.

## 5.8 Posologia e modalità di somministrazione

- Posologia:  
In funzione della lunghezza del pelo, nebulizzare da 3 a 6 ml di prodotto/Kg di peso. Tale volume corrisponde a:
  - \* 2 - 4 nebulizzazioni/Kg di peso, se si impiega il flacone da 250 ml o da 500 ml (1 erogazione è pari a 1,5 ml)
  - \* 6 - 12 nebulizzazioni/Kg di peso, se si impiega il flacone da 100 ml (1 erogazione è pari a 0,5 ml)

Nebulizzare "contropelo" tutta la superficie del corpo dell'animale, da una distanza di 10 - 20 cm, tenendo il flacone in posizione verticale.

La nebulizzazione va praticata in modo omogeneo, così da "bagnare" uniformemente il pelo di tutto il corpo.

Al termine della nebulizzazione, frizionare accuratamente il dorso, le spalle, i fianchi, l'addome, le zampe ed il collo per fare arrivare il prodotto a diretto contatto con la cute.

Per la testa e l'area attorno agli occhi, applicare il prodotto su un guanto e passarlo delicatamente "contropelo" su queste parti.

Al termine di queste operazioni, lasciare asciugare naturalmente

Un'unica applicazione del prodotto protegge l'animale da nuove infestazioni da **zecche**, da **pulci** e da **pidocchi**, in particolare:

- da zecche: fino ad 1 mese dopo il trattamento sia nel cane che nel gatto
- da pulci: \* fino a 3 mesi dopo il trattamento nel cane  
\* fino a 5 settimane dopo il trattamento nel gatto

Per una corretta prevenzione ectoparassitaria è consigliabile effettuare trattamenti mensili nei periodi di maggiore stagionalità.

In assenza di dati di innocuità, l'intervallo minimo di trattamento deve essere di 4 settimane.

## 5.9 Sovradosaggio (sintomi, procedure di emergenza, antidoti)

Il rischio dell'insorgenza di effetti collaterali (vedi paragrafo 5.4) può aumentare in caso di sovradosaggio, quindi gli animali dovrebbero sempre essere trattati con la posologia corrispondente al relativo peso corporeo.

Non superare le dosi consigliate.

### **5.10 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Non spruzzare il prodotto negli occhi degli animali, sulle mucose e nell'interno dell'orecchio

### **5.11 Tempo di sospensione**

Non pertinente

### **5.12 Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Conservare lontano da fiamme o fonti di calore

- Conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande
- Durante l'uso non contaminare alimenti, mangimi, bevande o recipienti destinati a contenerli
- Aerare adeguatamente l'ambiente durante l'erogazione del prodotto
- Per l'erogazione del prodotto, proteggere le mani con guanti
- Non inalare, non ingerire né fare ingerire
- Evitare il contatto con donne in stato di gravidanza e con bambini piccoli
- In caso di ingestione accidentale consultare un medico

Il prodotto può provocare irritazione alle mucose e agli occhi. Si consiglia quindi di evitare il contatto con la bocca e con gli occhi.

Si consiglia di evitare il contatto con Frontline Spray agli animali o alle persone con sensibilità accertata nei confronti di insetticidi o alcool. Evitare che il contenuto entri in contatto con le mani. In tal caso, lavarsi le mani con acqua e sapone.

In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua.

Lavarsi le mani dopo l'utilizzo.

Non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il pelo non sia asciutto. Si consiglia quindi di non trattare gli animali durante il giorno, ma di trattarli alla sera e, se appena trattati, di non farli dormire con i proprietari, in particolare con i bambini.

Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

## **6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

### **6.1 Incompatibilità**

Non note

### **6.2 Periodo di validità**

36 mesi

### **6.3 Speciali precauzioni per la conservazione**

Conservare in luogo fresco, asciutto e lontano da fiamme o fonti di calore

#### **6.4 Natura e contenuto delle confezioni**

Il prodotto è disponibile in 3 confezioni:

- Flacone spray in polietilene ad alta densità da 100 ml dotato di pompetta dosatrice che eroga 0,5 ml/spruzzo (cannula in polietilene a bassa densità)
- Flacone in polietilene ad alta densità da 250 ml chiuso con tappo, con annessa pompetta dosatrice che eroga 1,5 ml/spruzzo (cannula in polietilene a bassa densità)
- Flacone in polietilene ad alta densità da 500 ml chiuso con tappo, con annessa pompetta dosatrice che eroga 1,5 ml/spruzzo (cannula in polietilene a bassa densità)

#### **6.5 Precauzioni particolari da prendere per l'eliminazione del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivati da tale medicinale**

Il prodotto non utilizzato o le confezioni vuote devono essere smaltite secondo la legislazione vigente.

Il fipronil può essere dannoso per gli organismi acquatici. Non contaminare stagni, corsi d'acqua o canali con il prodotto o con i contenitori vuoti.

#### **7. NOME ED INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. – Via Vezza d'Oglio 3 – 20139 Milano

**LA VENDITA NON E' RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE  
E NON E' SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

Etichetta esterna/foglio illustrativo

**FRONTLINE® SPRAY**  
*(Fipronil 0,25%)*  
 100 ml  
**CANI - GATTI**

**PER USO ESTERNO**

**COMPOSIZIONE**

**Principio attivo:**

Fipronil 0,25 g

***Eccipienti:*** q.b. a 100 ml

**INDICAZIONI**

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da **zecche**, da **pulci** e da **pidocchi** nei cani e nei gatti di 2 giorni, o più, di età.

- Il fipronil esplica rapidamente la sua azione letale sulle **zecche**, impedendo lo sviluppo del parassita e l'eventuale trasmissione di infezioni di cui la zecca sia vettore. E' attivo contro le principali specie di zecche presenti sul territorio nazionale, tra cui *Ixodes ricinus*, responsabile della trasmissione della malattia di Lyme al cane, al gatto e all'uomo.
- Il fipronil agisce sulle **pulci** uccidendo rapidamente le forme adulte, prevenendo così la deposizione di uova e quindi nuove infestazioni. Grazie all'azione letale sulle pulci adulte, il fipronil contribuisce efficacemente al controllo ed alla risoluzione della Dermatite Allergica da Pulci (DAP) che, nel cane e nel gatto, è provocata dall'azione sensibilizzante esercitata dagli antigeni contenuti nella saliva di tali parassiti.
- Il fipronil inoltre, con un singolo trattamento, controlla e risolve in modo rapido e definitivo le infestazioni da **pidocchi** nel cane e nel gatto, in particolare quelle provocate da *Trichodectes canis*, pidocchio masticatore del cane e da *Felicola subrostratus*, pidocchio masticatore del gatto

**APPLICAZIONE CONSIGLIATA:** 6-12 nebulizzazioni per ogni kg di peso.

**POSOLOGIA**

In funzione della lunghezza del pelo, nebulizzare da 3 a 6 ml di prodotto/kg di peso. Tale volume corrisponde a 6-12 nebulizzazioni (1 erogazione è pari a 0,5 ml) per ogni kg di peso.

Un'unica applicazione del prodotto protegge l'animale da nuove infestazioni da **zecche**, da **pulci** e da **pidocchi**, in particolare:

- da zecche: fino ad 1 mese dopo il trattamento sia nel cane che nel gatto
- da pulci: \* fino a 3 mesi dopo il trattamento nel cane  
 \* fino a 5 settimane dopo il trattamento nel gatto

Per una corretta prevenzione ectoparassitaria è consigliabile effettuare trattamenti mensili nei periodi di maggiore stagionalità

#### **VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso esterno: mediante nebulizzazione

#### **MODALITA' D'USO**

Nebulizzare "contropelo" tutta la superficie del corpo dell'animale, da una distanza di 10-20 cm, tenendo il flacone in posizione verticale.

La nebulizzazione va praticata in modo omogeneo, così da "bagnare" uniformemente il pelo di tutto il corpo.

Al termine della nebulizzazione, frizionare accuratamente il dorso, le spalle, i fianchi, l'addome, le zampe ed il collo per far arrivare il prodotto a diretto contatto con la cute.

Per la testa e l'area attorno agli occhi, applicare il prodotto su un guanto e passarlo delicatamente "contropelo" su queste parti.

Al termine di queste operazioni, lasciare asciugare naturalmente.

Il fipronil si concentra nelle ghiandole sebacee dei follicoli piliferi, nelle 24 ore successive all'applicazione.

I bagni, la pioggia, gli shampoo non interferiscono sulla durata d'attività del prodotto nei confronti degli ectoparassiti.

#### **CONTROINDICAZIONI**

Non usare su animali con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare in animali malati (malattie sistemiche, con febbre...) o convalescenti.

Non usare nei conigli, poiché potrebbero manifestarsi reazioni avverse potenzialmente mortali.

#### **EFFETTI COLLATERALI**

*Qualora gli animali si leccino, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente agli eccipienti del prodotto.*

Tra gli estremamente rari fenomeni di sospette reazioni avverse, sono state descritte transitorie reazioni cutanee come eritema, prurito o alopecia dopo applicazione. Eccezionalmente, sono stati osservati ipersalivazione, sintomi neurologici reversibili (iperestesia, abbattimento, sintomi nervosi), vomito o sintomatologia respiratoria.

Non superare la dose consigliata.

#### **PRECAUZIONI D'USO**

Solo per uso esterno.

Evitare di spruzzare il prodotto negli occhi degli animali, sulle mucose e all'interno dell'orecchio.

I bagni, la pioggia, gli shampoo non interferiscono sulla durata dell'attività del prodotto nei confronti degli ectoparassiti.

E' importante che gli animali non si leccino l'un l'altro dopo il trattamento.

Si consiglia di non permettere ai cani di nuotare in corsi d'acqua nei 2 giorni successivi all'applicazione del prodotto poiché il fipronil può essere dannoso per gli organismi acquatici.

Se non correttamente applicato, singole zecche potrebbero attaccarsi al cane o al gatto. Per questa ragione, nel peggiore dei casi, non può essere completamente esclusa la trasmissione di malattie infettive.

Le pulci presenti sugli animali spesso infestano la cesta dell'animale, le coperte e le zone in cui l'animale vive, in particolare tappeti, tende e tessuti d'arredamento; questi, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario possono essere trattati con un insetticida apposito, e regolarmente ripuliti con un aspiratore.

## UTILIZZO DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Il prodotto può essere usato nella cagna e nella gatta sia durante la gravidanza che durante il periodo dell'allattamento.

## AVVERTENZE

- Conservare lontano da fiamme o fonti di calore
--

- conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande
- durante l'uso non contaminare alimenti, mangimi, bevande o recipienti destinati a contenerli
- aerare adeguatamente l'ambiente, durante l'erogazione del prodotto
- per l'erogazione del prodotto, proteggere le mani con guanti
- non inalare, non ingerire né fare ingerire
- evitare il contatto con donne in stato di gravidanza e con bambini piccoli
- in caso di ingestione accidentale consultare un medico

Il prodotto può provocare irritazione alle mucose e agli occhi. Si consiglia quindi di evitare il contatto con la bocca e con gli occhi. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua.

Si consiglia di evitare il contatto con Frontline Spray agli animali o alle persone con sensibilità accertata nei confronti di insetticidi o alcool e di non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il pelo non sia asciutto.

Lavarsi le mani dopo l'utilizzo.

Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

## CONSERVAZIONE

In luogo fresco e asciutto e lontano da fiamme o fonti di calore

Lotto n.                      Scad.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato



A.I.C. n. 103029017 del Ministero della Salute

**PER USO VETERINARIO**

**TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE  
E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO**

Il prodotto non utilizzato o le confezioni vuote devono essere smaltite secondo la legislazione vigente.

Non contaminare stagni, corsi d'acqua o canali con il prodotto o con i contenitori vuoti.

Officina di produzione: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS - Tolosa (Francia)

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim AH IT S.p.A.

Etichetta esterna/foglio illustrativo

**FRONTLINE® SPRAY**  
*(Fipronil 0,25%)*  
 250 ml  
**CANI - GATTI**

**PER USO ESTERNO**

**COMPOSIZIONE**

**Principio attivo:**

Fipronil 0,25 g

***Eccipienti:*** q.b. a 100 ml

**INDICAZIONI**

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da **zecche**, da **pulci** e da **pidocchi** nei cani e nei gatti di 2 giorni, o più, di età.

- Il fipronil esplica rapidamente la sua azione letale sulle **zecche**, impedendo lo sviluppo del parassita e l'eventuale trasmissione di infezioni di cui la zecca sia vettore. E' attivo contro le principali specie di zecche presenti sul territorio nazionale, tra cui *Ixodes ricinus*, responsabile della trasmissione della malattia di Lyme al cane, al gatto e all'uomo.
- Il fipronil agisce sulle **pulci** uccidendo rapidamente le forme adulte, prevenendo così la deposizione di uova e quindi nuove infestazioni. Grazie all'azione letale sulle pulci adulte, il fipronil contribuisce efficacemente al controllo ed alla risoluzione della Dermatite Allergica da Pulci (DAP) che, nel cane e nel gatto, è provocata dall'azione sensibilizzante esercitata dagli antigeni contenuti nella saliva di tali parassiti.
- Il fipronil inoltre, con un singolo trattamento, controlla e risolve in modo rapido e definitivo le infestazioni da **pidocchi** nel cane e nel gatto, in particolare quelle provocate da *Trichodectes canis*, pidocchio masticatore del cane e da *Felicola subrostratus*, pidocchio masticatore del gatto

**APPLICAZIONE CONSIGLIATA:** 2-4 nebulizzazioni per ogni kg di peso.

**POSOLOGIA**

In funzione della lunghezza del pelo, nebulizzare da 3 a 6 ml di prodotto/kg di peso. Tale volume corrisponde a 2-4 nebulizzazioni (1 erogazione è pari a 1,5 ml) per ogni kg di peso.

Un'unica applicazione del prodotto protegge l'animale da nuove infestazioni da **zecche**, da **pulci** e da **pidocchi**, in particolare:

- da zecche: fino ad 1 mese dopo il trattamento sia nel cane che nel gatto
- da pulci: \* fino a 3 mesi dopo il trattamento nel cane  
 \* fino a 5 settimane dopo il trattamento nel gatto

Per una corretta prevenzione ectoparassitaria è consigliabile effettuare trattamenti mensili nei periodi di maggiore stagionalità

## **VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso esterno: mediante nebulizzazione

## **MODALITA' D'USO**

Nebulizzare "contropelo" tutta la superficie del corpo dell'animale, da una distanza di 10-20 cm, tenendo il flacone in posizione verticale.

La nebulizzazione va praticata in modo omogeneo, così da "bagnare" uniformemente il pelo di tutto il corpo.

Al termine della nebulizzazione, frizionare accuratamente il dorso, le spalle, i fianchi, l'addome, le zampe ed il collo per far arrivare il prodotto a diretto contatto con la cute.

Per la testa e l'area attorno agli occhi, applicare il prodotto su un guanto e passarlo delicatamente "contropelo" su queste parti.

Al termine di queste operazioni, lasciare asciugare naturalmente.

Il fipronil si concentra nelle ghiandole sebacee dei follicoli piliferi, nelle 24 ore successive all'applicazione.

I bagni, la pioggia, gli shampoo non interferiscono sulla durata d'attività del prodotto nei confronti degli ectoparassiti.

## **CONTROINDICAZIONI**

Non usare su animali con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare in animali malati (malattie sistemiche, con febbre...) o convalescenti.

Non usare nei conigli, poiché potrebbero manifestarsi reazioni avverse potenzialmente mortali.

## **EFFETTI COLLATERALI**

Qualora gli animali si leccino, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente agli eccipienti del prodotto.

Tra gli estremamente rari fenomeni di sospette reazioni avverse, sono state descritte transitorie reazioni cutanee come eritema, prurito o alopecia dopo applicazione. Eccezionalmente, sono stati osservati ipersalivazione, sintomi neurologici reversibili (iperestesia, abbattimento, sintomi nervosi), vomito o sintomatologia respiratoria.

Non superare la dose consigliata.

## **PRECAUZIONI D'USO**

Solo per uso esterno.

Evitare di spruzzare il prodotto negli occhi degli animali, sulle mucose e all'interno dell'orecchio.

I bagni, la pioggia, gli shampoo non interferiscono sulla durata dell'attività del prodotto nei confronti degli ectoparassiti.

E' importante che gli animali non si leccino l'un l'altro dopo il trattamento.

Si consiglia di non permettere ai cani di nuotare in corsi d'acqua nei 2 giorni successivi all'applicazione del prodotto poiché il fipronil può essere dannoso per gli organismi acquatici.

Se non correttamente applicato, singole zecche potrebbero attaccarsi al cane o al gatto. Per questa ragione, nel peggiore dei casi, non può essere completamente esclusa la trasmissione di malattie infettive.

Le pulci presenti sugli animali spesso infestano la cesta dell'animale, le coperte e le zone in cui l'animale vive, in particolare tappeti, tende e tessuti d'arredamento; questi, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario, possono essere trattati con un insetticida apposito e regolarmente ripuliti con un aspiratore.

## UTILIZZO DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Il prodotto può essere usato nella cagna e nella gatta sia durante la gravidanza che durante il periodo dell'allattamento.

## AVVERTENZE

- Conservare lontano da fiamme o fonti di calore

- conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande
- durante l'uso non contaminare alimenti, mangimi, bevande o recipienti destinati a contenerli
- aerare adeguatamente l'ambiente, durante l'erogazione del prodotto
- per l'erogazione del prodotto, proteggere le mani con guanti
- non inalare, non ingerire né fare ingerire
- evitare il contatto con donne in stato di gravidanza e con bambini piccoli
- in caso di ingestione accidentale consultare un medico

Il prodotto può provocare irritazione alle mucose e agli occhi. Si consiglia quindi di evitare il contatto con la bocca e con gli occhi. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua.

Si consiglia di evitare il contatto con Frontline Spray agli animali o alle persone con sensibilità accertata nei confronti di insetticidi o alcool e di non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il pelo non sia asciutto.

Lavarsi le mani dopo l'utilizzo.

Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

## CONSERVAZIONE

In luogo fresco e asciutto e lontano da fiamme o fonti di calore

Lotto n.                      Scad.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato

A.I.C. n. 103029029 del Ministero della Salute

**PER USO VETERINARIO**

**TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE  
E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO**

Il prodotto non utilizzato o le confezioni vuote devono essere smaltite secondo la legislazione vigente.

Non contaminare stagni, corsi d'acqua o canali con il prodotto o con i contenitori vuoti.

Officina di produzione: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS - Tolosa (Francia)

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim AH IT S.p.A.

Etichetta esterna/foglio illustrativo

**FRONTLINE® SPRAY**  
(Fipronil 0,25%)  
500 ml  
CANI - GATTI

**PER USO ESTERNO**

**COMPOSIZIONE**

**Principio attivo:**

Fipronil 0,25 g

***Eccipienti:*** q.b. a 100 ml

**INDICAZIONI**

Trattamento e prevenzione delle infestazioni da **zecche**, da **pulci** e da **pidocchi** nei cani e nei gatti di 2 giorni, o più, di età.

- Il fipronil esplica rapidamente la sua azione letale sulle **zecche**, impedendo lo sviluppo del parassita e l'eventuale trasmissione di infezioni di cui la zecca sia vettore. E' attivo contro le principali specie di zecche presenti sul territorio nazionale, tra cui *Ixodes ricinus*, responsabile della trasmissione della malattia di Lyme al cane, al gatto e all'uomo.
- Il fipronil agisce sulle **pulci** uccidendo rapidamente le forme adulte, prevenendo così la deposizione di uova e quindi nuove infestazioni. Grazie all'azione letale sulle pulci adulte, il fipronil contribuisce efficacemente al controllo ed alla risoluzione della Dermatite Allergica da Pulci (DAP) che, nel cane e nel gatto, è provocata dall'azione sensibilizzante esercitata dagli antigeni contenuti nella saliva di tali parassiti.
- Il fipronil inoltre, con un singolo trattamento, controlla e risolve in modo rapido e definitivo le infestazioni da **pidocchi** nel cane e nel gatto, in particolare quelle provocate da *Trichodectes canis*, pidocchio masticatore del cane e da *Felicola subrostratus*, pidocchio masticatore del gatto

**APPLICAZIONE CONSIGLIATA:** 2-4 nebulizzazioni per ogni kg di peso.

**POSOLOGIA**

In funzione della lunghezza del pelo, nebulizzare da 3 a 6 ml di prodotto/kg di peso. Tale volume corrisponde a 2-4 nebulizzazioni (1 erogazione è pari a 1,5 ml) per ogni kg di peso.

Un'unica applicazione del prodotto protegge l'animale da nuove infestazioni da **zecche**, da **pulci** e da **pidocchi**, in particolare:

- da zecche: fino ad 1 mese dopo il trattamento sia nel cane che nel gatto
- da pulci: \* fino a 3 mesi dopo il trattamento nel cane

\* fino a 5 settimane dopo il trattamento nel gatto

Per una corretta prevenzione ectoparassitaria è consigliabile effettuare trattamenti mensili nei periodi di maggiore stagionalità

## **VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Uso esterno: mediante nebulizzazione

## **MODALITA' D'USO**

Nebulizzare "contropelo" tutta la superficie del corpo dell'animale, da una distanza di 10-20 cm, tenendo il flacone in posizione verticale.

La nebulizzazione va praticata in modo omogeneo, così da "bagnare" uniformemente il pelo di tutto il corpo.

Al termine della nebulizzazione, frizionare accuratamente il dorso, le spalle, i fianchi, l'addome, le zampe ed il collo per far arrivare il prodotto a diretto contatto con la cute.

Per la testa e l'area attorno agli occhi, applicare il prodotto su un guanto e passarlo delicatamente "contropelo" su queste parti.

Al termine di queste operazioni, lasciare asciugare naturalmente.

Il fipronil si concentra nelle ghiandole sebacee dei follicoli piliferi, nelle 24 ore successive all'applicazione.

I bagni, la pioggia, gli shampoo non interferiscono sulla durata d'attività del prodotto nei confronti degli ectoparassiti.

## **CONTROINDICAZIONI**

Non usare su animali con estese lesioni della pelle.

Non utilizzare in animali malati (malattie sistemiche, con febbre...) o convalescenti.

Non usare nei conigli, poiché potrebbero manifestarsi reazioni avverse potenzialmente mortali.

## **EFFETTI COLLATERALI**

*Qualora gli animali si leccino, si può osservare una transitoria ipersalivazione dovuta principalmente agli eccipienti del prodotto.*

Tra gli estremamente rari fenomeni di sospette reazioni avverse, sono state descritte transitorie reazioni cutanee come eritema, prurito o alopecia dopo applicazione.

Eccezionalmente, sono stati osservati ipersalivazione, sintomi neurologici reversibili (iperestesia, abbattimento, sintomi nervosi), vomito o sintomatologia respiratoria.

Non superare la dose consigliata.

## **PRECAUZIONI D'USO**

Solo per uso esterno.

Evitare di spruzzare il prodotto negli occhi degli animali, sulle mucose e all'interno dell'orecchio.

I bagni, la pioggia, gli shampoo non interferiscono sulla durata dell'attività del prodotto nei confronti degli ectoparassiti.

E' importante che gli animali non si leccino l'un l'altro dopo il trattamento.

Si consiglia di non permettere ai cani di nuotare in corsi d'acqua nei 2 giorni successivi all'applicazione del prodotto poiché il fipronil può essere dannoso per gli organismi acquatici.

Se non correttamente applicato, singole zecche potrebbero attaccarsi al cane o al gatto. Per questa ragione, nel peggiore dei casi, non può essere completamente esclusa la trasmissione di malattie infettive.

Le pulci presenti sugli animali spesso infestano la cesta dell'animale, le coperte e le zone in cui l'animale vive, in particolare tappeti, tende e tessuti d'arredamento; questi, in caso di infestazioni massive e all'inizio del trattamento antiparassitario, possono essere trattati con un insetticida apposito e regolarmente ripuliti con un aspiratore.

## UTILIZZO DURANTE LA GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO

Il prodotto può essere usato nella cagna e nella gatta sia durante la gravidanza che durante il periodo dell'allattamento.

## AVVERTENZE

- Conservare lontano da fiamme o fonti di calore
--

- conservare lontano da alimenti, mangimi e bevande
- durante l'uso non contaminare alimenti, mangimi, bevande o recipienti destinati a contenerli
- aerare adeguatamente l'ambiente, durante l'erogazione del prodotto
- per l'erogazione del prodotto, proteggere le mani con guanti
- non inalare, non ingerire né fare ingerire
- evitare il contatto con donne in stato di gravidanza e con bambini piccoli
- in caso di ingestione accidentale consultare un medico

Il prodotto può provocare irritazione alle mucose e agli occhi. Si consiglia quindi di evitare il contatto con la bocca e con gli occhi. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua.

Si consiglia di evitare il contatto con Frontline Spray agli animali o alle persone con sensibilità accertata nei confronti di insetticidi o alcool e di non toccare gli animali e non far giocare i bambini con gli animali trattati fino a che il pelo non sia asciutto.

Lavarsi le mani dopo l'utilizzo.

Non fumare, bere o mangiare durante l'applicazione.

## CONSERVAZIONE

In luogo fresco e asciutto e lontano da fiamme o fonti di calore

Lotto n.                      Scad.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato



A.I.C. n. 103029031 del Ministero della Salute

**PER USO VETERINARIO**

**TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE  
E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**NON DISPERDERE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO**

Il prodotto non utilizzato o le confezioni vuote devono essere smaltite secondo la legislazione vigente.

Non contaminare stagni, corsi d'acqua o canali con il prodotto o con i contenitori vuoti.

Officina di produzione: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS - Tolosa (Francia)

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim AH IT S.p.A.