

*Vaistinis preparatas neberegistruotas*

**I PRIEDAS**

**VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS**

## 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas labai mažiems šunims  
Activyl 150 mg užlašinamasis tirpalas mažiems šunims  
Activyl 300 mg užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio šunims  
Activyl 600 mg užlašinamasis tirpalas dideliems šunims  
Activyl 900 mg užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims

## 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

### Veikliosios medžiagos:

viename ml yra 195 mg indoksakarbo.  
Vienoje vienadozėje pipetėje yra:

	Vienkartinė dozė (ml)	Indoksakarbas (mg)
Activyl labai mažiems šunims (1,5–6,5 kg)	0,51	100
Activyl mažiems šunims (6,6–10 kg)	0,77	150
Activyl vidutinio dydžio šunims (10,1–20 kg)	1,54	300
Activyl dideliems šunims (20,1–40 kg)	3,08	600
Activyl labai dideliems šunims (40,1–60 kg)	4,62	900

### Pagalbinės medžiagos:

izopropilo alkoholio 354 mg/ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

## 3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.  
Skaidrus bespalvis ar geltonas tirpalas.

## 4. KLINIKINIAI DUOMENYS

### 4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys.

### 4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Gydyti esant užsikrėtimui blusomis (*Ctenocephalides felis*) ir jo profilaktikai. Veiksmingumas nuo naujos blusų invazijos trunka 4 sav. po vienkartinio gydymo.

Gyvūno artimiausioje aplinkoje esančios vystymosi stadijų blusos žūsta po sąlyčio su Activyl gydytais gyvūnais.

### 4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

### 4.4. Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

### 4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

#### Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vaisto negalima naudoti jaunesniems nei 8 sav. amžiaus šunims, nes vaisto saugumas šiems šunims nenustatytas.

Vaisto negalima naudoti šunims, sveriantiems mažiau nei 1,5 kg, nes vaisto saugumas šiems šunims nenustatytas.

Būtina užtikrinti, kad dozė (pipetė) atitiktų gydomo šuns svorį (žr. 4.9 p.).

Vaistą reikia naudoti tik ant odos paviršiaus ir ant nepažeistos odos. Vaistą reikia užlašinti vietoje, kur šuo negali jo nulaižyti, kaip aprašyta 4.9 p. Būtina užtikrinti, kad ką tik gydyti gyvūnai nelaižytų vienas kito. Gydytus gyvūnus reikia laikyti atskirai, kol išdžius vaisto užlašinimo vieta.

Vaistas skirtas tik išoriniam naudojimui. Negalima naudoti per burną ar bet kokiais kitais būdais. Reikia stengtis, kad vaistas nepatektų į šuns akis.

Vaistas išlieka veiksmingas išmaudžius gyvūną su šampūnu, sušlapinus kailį (plaukiojant, maudant) ir veikiant saulės spinduliams. Vis dėlto 48 val. po naudojimo gyvūnų nereikėtų maudyti su šampūnu ar leisti jiems plaukioti.

Visiems namų ūkyje esantiems šunims reikia naudoti tinkamą priemonę nuo blusų.

Rekomenduojama tinkamai apdoroti gyvūno aplinką papildomomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis.

#### Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Pipetes iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuotėje.

Naudojant veterinarinį vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Paketėlis yra neatidaroamas vaikų. Siekiant apsaugoti vaikus nuo tiesioginio sąlyčio su vaistu, iki naudojimo jį reikia laikyti paketėlyje. Panaudotas pipetes reikia nedelsiant išmesti.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas indoksakarbui, turi vengti sąlyčio su šiuo vaistu.

Naudojus šį vaistą, kai kuriems žmonės pasireiškė vietinės ir (arba) sisteminės reakcijos. Siekiant išvengti nepalankių reakcijų:

- vaistą reikia naudoti gerai vėdinamoje vietoje;
- negalima liesti neseniai gydytų gyvūnų, kol neišdžiūvo užlašinimo vieta;
- gydymo dieną vaikams draudžiama liesti gydytus gyvūnus ir negalima gyvūnams leisti miegoti su savo šeiminkais, ypač vaikais;

- po naudojimo reikia nedelsiant nusiplauti rankas ir nedelsiant nuplauti ant odos patekusį vaistą su muilu ir vandeniu;
- būtina vengti sąlyčio su akimis, kadangi vaistas gali vidutiniškai dirginti akis. Vaisto atsitiktinai patekus į akis, reikia lėtai ir kruopščiai plauti vandeniu.

Jei pasireiškia simptomai, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti informacinį lapelį.

Šis vaistas yra labai degus. Saugoti nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ar kitų užsidegimo šaltinių.

#### 4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Labai retais atvejais trumpą laiką gali pasireikšti seilėtekis, jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaižo užlašinimo vietą. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be gydymo. Taisyklingai naudojant (žr. 4.9 p.), užlašinimo vieta rečiau nulaižoma.

Labai retais atvejais užlašinimo vietoje gali pasireikšti tokios vietinės reakcijos kaip trumpalaikis niežulys, eritema, alopecija ar dermatitas. Šie požymiai paprastai išnyksta be gydymo.

Šio veterinarinio vaisto naudojimas užlašinimo vietoje gali sukelti vietinį laikiną susiriebalavimą ar plaukų sulipimą. Taip pat gali būti matomos sausos baltos vaisto liekanos. Tai normalu ir paprastai išnyksta per keletą dienų po vaisto naudojimo. Šie pokyčiai neturi įtakos veterinarinio vaisto saugumui ar veiksmingumui.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (vieno gydymo metu nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

#### 4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas.

##### Vaikingumas

Negalima naudoti vaikingumo metu.

##### Laktacija

Negalima naudoti laktacijos metu.

##### Vaisingumas

Negalima naudoti veisiamiems gyvūnams.

#### 4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

Klinikinių tyrimų metu, kai Activyl buvo naudojamas kartu su deltametrino antkakliais, impregnuotais iki 4 % deltametrino, susijusių nepalankių reakcijų nepasireiškė.

#### 4.9. Dozės ir naudojimo būdas

##### Dozavimo planas

Rekomenduojama dozė yra 15 mg indoksakarbū 1 kg kūno svorio, atitinkanti 0,077 ml 1 kg kūno svorio. Toliau esančioje lentelėje pateikiamas naudotinos pipetės dydis, atsižvelgiant į šuns kūno svorį:

Šuns svoris (kg)	Naudotinos pipetės dydis	Tūris (ml)	Indoksakarbū (mg/kg)
1,5–6,5	Labai mažiems šunims	0,51	ne mažiau kaip 15
6,6–10	Mažiems šunims	0,77	15–23
10,1–20	Vidutinio dydžio šunims	1,54	15–30
20,1–40	Dideliems šunims	3,08	15–30
40,1–60	Labai dideliems šunims	4,62	15–23
> 60	Reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio pipetes		

#### Naudojimo būdas


Užlašinti. Naudoti tik ant šuns odos.

Atidarykite vieną paketėlį ir išimkite pipetę.

**1 žingsnis.** Kad vaistą būtų lengva naudoti, šuo turėtų stovėti. Laikykite pipetę vertikaliai toliau nuo savo veido. Lenkiant pipetės galiuką nulaužkite jį ir prilenkite prie pipetės.

**2 žingsnis.** Praskirkite plaukus, kad matytumėte odą. Priglauskite pipetės galiuką prie odos šunims tarp menčių.

Stipriai suspauskite pipetę ir išspauskite visą turinį tiesiai ant odos.



Didesniems šunims pipetės (-čių) turinį reikia tolygiai paskirstyti 2-4 vietose išilgai nugaros, nuo pečių iki uodegos pagrindo. Neužlašinkite per daug tirpalo vienoje vietoje, kad nenuvarvėtų.



#### Gydymo planas

Vieną kartą skirtas veterinarinis vaistas apsaugo nuo tolesnio užsikrėtimo blusomis 4 sav.

#### **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina**

8 kartus kas 4 sav. ar 6 kartus kas 2 sav. skyrus 5 kartus didesnę nei rekomenduojama dozė šuniukams nuo 8 sav. amžiaus, nepalankių reakcijų nepastebėta.

#### 4.11. Išlauka

Netaikytina.

### 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos vietiniam naudojimui, įskaitant insekticidus: indoksakarbą.

ATCvet kodas: QP53AX27.

#### 5.1. Farmakodinaminės savybės

Indoksakarbą yra ektoparazitocidinė medžiaga, priklausanti oksadiazino junginių grupei. Metabolizuotas indoksakarbą veikia suaugusias blusas, blusų lervas ir kiaušinėlius. Įrodyta, kad te naikinančio poveikio suaugusioms blusoms, indoksakarbą veikia ir gydomo šuns artimiausioje aplinkoje esančias lervų vystymosi stadijų blusas.

Indoksakarbą yra vaisto pirmtakas, kurį, norint pasiekti farmakodinaminį poveikį, turi aktyvinti vabzdžio fermentai. Jis patenka į vabzdžio organizmą, kai šis jį praryja, o taip pat nedidelis kiekis absorbuojamas per vabzdžio kutikulę. Vaistui jautrių vabzdžių vidurinėje žarnoje vabzdžių fermentai atskelia nuo pirminio junginio karbometoksilo grupę ir paverčia vaisto pirmtaką biologiškai aktyvia forma. Biologiškai aktyvus metabolitas veikia kaip nuo įtampos priklausomas natrio kanalų antagonistas, kuris blokuoja kanalus, reguliuojančius natrio jonų patekimą į vabzdžių nervų sistemą. Dėl to greitai, per 0–4 val. po gydymo, sutrinka vabzdžių mityba, po to – kiaušinėlių dėjimas (ovipozicija), sukeliama vabzdžių paralyžius ir žūtis, pasireišianti per 4–48 val.

#### 5.2. Farmakokinetinės savybės

Vieną kartą užlašinus vaisto, 4 sav. po gydymo indoksakarbo vis dar galima aptikti ant plaukų ir odos. Taip pat vyksta absorbcija per odą, tačiau sisteminė absorbcija yra dalinė ir klinikiniam efektyvumui neturi reikšmės. Absorbuotas indoksakarbą aktyviai metabolizuojamas kepenyse į įvairius metabolitus. Iš organizmo daugiausia išsiskiria su išmatomis.

#### Savybės aplinkoje

Žr. 6.6 p.

### 6. FARMACINIAI DUOMENYS

#### 6.1. Pagalbinų medžiagų sąrašas

Triacetinas,  
etilo acetoacetatas,  
izopropilo alkoholis.

#### 6.2. Nesuderinamumai

Nežinoma.

#### 6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 4 metai.

#### **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.  
Pipetes reikia laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

#### **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1, 4 arba 6 paketėliai; kiekviename paketėlyje yra viena vienadozė pipetė. Vienoje vienadozėje pipetėje yra 0,51 ml, 0,77 ml, 1,54 ml, 3,08 ml arba 4,62 ml užlašinamojo tirpalo. Vienoje dėžutėje yra tik vieno dydžio vienadozės pipetės. Pipetė sudaryta iš lakštinės plėvelės (iš polipropileno, ciklinio olefinkopolimero ir polipropileno) ir folijos dangtelio (iš aliuminio ir polipropileno, sujungtų ekstruzijos būdu), supakuotų į užlydytus aliumininius maišelius.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

#### **6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su juo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Activyl negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

### **7. REGISTRUOTOJAS**

Intervet International BV  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nyderlandai

### **8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)**

EU/2/10/118/001-010  
EU/2/10/118/015-019

### **9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA**

Registravimo data 2011-02-18.  
Perregistravimo data 2016-01-07.

### **10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje <http://www.ema.europa.eu/>.

**DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI**

Néra.

*Vaistinis preparatas neberegistruotas*



## 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms

Activyl 200 mg užlašinamasis tirpalas didelėms katėms

## 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

### Veikliosios medžiagos:

viename ml yra 195 mg indoksakarbo.

Vienoje vienodozėje pipetėje yra:

	Vienkartinė dozė (ml)	Indoksakarbas (mg)
Activyl mažoms katėms ( $\leq 4$ kg)	0,51	100
Activyl didelėms katėms ( $> 4$ kg)	1,03	200

### Pagalbinės medžiagos:

izopropilo alkoholio 354 mg/ml.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

## 3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

Skaidrus bespalvis ar geltonas tirpalas.

## 4. KLINIKINIAI DUOMENYS

### 4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Katės.

### 4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Gydyti esant užsikrėtimui blusomis (*Ctenocephalides felis*) ir jo profilaktikai. Veiksmingumas nuo naujos blusų invazijos trunka 4 sav. po vienkartinio gydymo.

Veterinarinis vaistas gali būti naudojamas kaip gydymo nuo blusų sukkelto alerginio dermatito strategijos dalis (BAD).

Gyvūno artimiausioje aplinkoje esančios vystymosi stadijų blusos žūsta po sąlyčio su Activyl gydytais gyvūnais.

### 4.3. Kontraindikacijos

Nėra.

### 4.4. Specialieji išpėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Vaisto saugumas jaunesnėms nei 8 sav. amžiaus katėms nenustatytas.

Vaisto saugumas katėms, sveriančioms mažiau nei 0,6 kg, nenustatytas.

#### **4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės**

##### Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina užtikrinti, kad dozė (pipetė) atitiktų gydomos katės svorį (žr. 4.9 p.).

Vaistą reikia naudoti tik ant odos paviršiaus ir ant nepažeistos odos. Vaistą reikia užlašinti vietoje, kur katė negali jo nulaižyti, kaip aprašyta 4.9 p. Būtina užtikrinti, kad katė tik gydyti gyvūnai nelaižytų vienas kito. Gydytus gyvūnus reikia laikyti atskirai, kol išdžius vaisto užlašinimo vieta.

Vaistas skirtas tik išoriniam naudojimui. Negalima naudoti per burną ar bet kokiais kitais būdais. Reikia stengtis, kad vaistas nepatektų į katės akis.

Vaistas išlieka veiksmingas išmaudžius gyvūną su šampūnu, sušlapinus kailį (plaukiojant, maudant) ir veikiant saulės spinduliams. Vis dėlto 48 val. po naudojimo gyvūnų nereikėtų maudyti su šampūnu ar leisti jiems plaukioti.

Visoms namų ūkyje esančioms katėms reikia naudoti tinkamą priemonę nuo blusų.

Rekomenduojama tinkamai apdoroti gyvūno aplinką papildomomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis.

##### Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Pipetės iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuotėje.

Naudojant veterinarinį vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Paketėlis yra neatidaromas vaikų. Siekiant apsaugoti vaikus nuo tiesioginio sąlyčio su vaistu, iki naudojimo jį reikia laikyti paketėlyje. Panaudotas pipetės reikia nedelsiant išmesti.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas indoksakarbui, turi vengti sąlyčio su šiuo vaistu.

Naudojus šį vaistą, kai kuriems žmonėms pasireiškė vietinės ir (arba) sisteminės reakcijos. Siekiant išvengti nepalankių reakcijų:

- vaistą reikia naudoti gerai vėdinamoje vietoje;
- negalima liesti neseniai gydytų gyvūnų, kol neišdžiuvo užlašinimo vieta;
- gydymo dieną vaikams draudžiama liesti gydytus gyvūnus ir negalima gyvūnams leisti miegoti su savo šeiminiškais, ypač vaikais;
- po naudojimo reikia nedelsiant nusiplauti rankas ir nedelsiant nuplauti ant odos patekusį vaistą su muilu ir vandeniu;
- būtina vengti sąlyčio su akimis, kadangi vaistas gali vidutiniškai dirginti akis. Vaisto atsitiktinai patekus į akis, reikia lėtai ir kruopščiai plauti vandeniu.

Jei pasireiškia simptomai, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti informacinį lapelį.

Šis vaistas yra labai degus. Saugoti nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ar kitų užsidegimo šaltinių.

#### 4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Retais atvejais pastebėti neurologiniai požymiai (pvz., koordinacijos sutrikimas, drebulys, ataksija, traukuliai, išsiplėtę vyzdžiai ir regos sutrikimas). Retais atvejais pastebėti tokie požymiai kaip vėmimas, o labai retais atvejais – anoreksija, mieguistumas, padidėjęs aktyvumas ir kniaukimas. Visi požymiai paprastai išnyksta po palaikomojo gydymo.

Labai retais atvejais trumpą laiką gali pasireikšti seilėtekis, jei gyvūnas iš karto po naudojimo palažo užlašinimo vieta. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be gydymo. Taisyklingai naudojant (žr. 4.9 p.), užlašinimo vieta rečiau nulaižoma.

Retais atvejais užlašinimo vietoje gali pasireikšti tokios vietinės reakcijos kaip trumpalaikis niežulys, eritema, alopecija ar dermatitas. Šie požymiai paprastai išnyksta be gydymo.

Šio veterinarinio vaisto naudojimas užlašinimo vietoje gali sukelti vietinį, laikiną susiribalavimą ar plaukų sulipimą. Taip pat gali būti matomos sausos baltos vaisto liekanos. Tai normalu ir paprastai išnyksta per keletą dienų po vaisto naudojimo. Šie pokyčiai neturi įtakos veterinarinio vaisto saugumui ar veiksmingumui.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konversija:

- labai dažna (vieno gydymo metu nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

#### 4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Veterinarinio vaisto saugumas vaikingumo ir laktacijos metu nenustatytas.

##### Vaikingumas

Negalima naudoti vaikingumo metu.

##### Laktacija

Negalima naudoti laktacijos metu.

##### Vaisingumas

Negalima naudoti veisiamiesiems gyvūnams.

#### 4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

#### 4.9. Dozės ir naudojimo būdas

##### Dozavimo planas

Rekomenduojama dozė yra 25 mg indoksakarbo 1 kg kūno svorio, atitinkanti 0,128 ml 1 kg kūno svorio. Toliau esančioje lentelėje pateikiamas naudotinos pipetės dydis, atsižvelgiant į katės kūno svorį:

Katės svoris (kg)	Naudotinos pipetės dydis	Tūris (ml)	Indoksakarbais (mg/kg)
≤ 4	Mažoms katėms	0,51	ne mažiau kaip 25
> 4	Didelėms katėms	1,03	ne daugiau kaip 50

## Naudojimo būdas


Užlašinti. Naudoti tik ant katės odos.

Atidarykite vieną paketėlį ir išimkite pipetę.

**1 žingsnis.** Kad vaistą būtų lengva naudoti, katė turėtų stovėti. Laikykite pipetę vertikaliai toliau nuo savo veido. Lenkiant pipetės galiuką nulaužkite jį ir prilenkite prie pipetės.

**2 žingsnis.** Praskirkite plaukus, kad matytumėte odą. Priglauskite pipetės galiuką prie odos ties kaukolės pagrindu, kur katė negali jo nusilaižyti.

Stipriai suspauskite pipetę ir išspauskite visą jos turinį tiesiai ant odos.



## Gydymo planas

Vieną kartą skirtas veterinarinis vaistas apsaugo nuo tolesnio užsikrėtimo blusomis 4 sav.

### **4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina**

8 kartus kas 4 sav. ar 6 kartus kas 2 sav. skyrus 5 kartus didesnę nei rekomenduojama dozę kačiukams nuo 8 sav. amžiaus, nepalankių reakcijų nepastebėta.

### **4.11. Išlauka**

Netaikytina.

## **5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS**

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos vietiniam naudojimui, įskaitant insekticidus: indoksakarbą.

ATCvet kodas: QP53AX27.

### **5.1. Farmakodinaminės savybės**

Indoksakarbą yra ektoparazitocidinė medžiaga, priklausanti oksadiazino junginių grupei. Metabolizuotas indoksakarbą veikia suaugusias blusas, blusų lervas ir kiaušinėlius. Įrodyta, kad be naikinančio poveikio suaugusioms blusoms, indoksakarbą veikia ir gydomo gyvūno artimiausioje aplinkoje esančias lervų vystymosi stadijų blusas.

Indoksakarbą yra vaisto pirmtakas, kurį, norint pasiekti farmakodinaminį poveikį, turi aktyvinti vabzdžio fermentai. Jis patenka į vabzdžio organizmą, kai šis jį praryja, o taip pat nedidelis kiekis absorbuojamas per vabzdžio kutikulę. Vaistui jautrių vabzdžių vidurinėje žarnoje vabzdžių fermentai atskelia nuo pirminio junginio karbometoksilo grupę ir paverčia vaisto pirmtaką biologiškai aktyvia forma. Biologiškai aktyvus metabolitas veikia kaip nuo įtampos priklausomas natrio kanalų antagonistas, kuris blokuoja kanalus,

reguliuojančius natrio jonų patekimą į vabzdžių nervų sistemą. Dėl to greitai, per 0–4 val. po gydymo, sutrinka vabzdžių mityba, po to – kiaušinėlių dėjimas (ovipozicija), sukeliamas vabzdžių paralyžius ir žūtis, pasireišianti per 4–48 val.

## **5.2. Farmakokinetinės savybės**

Vieną kartą užlašinus vaisto, 4 sav. po gydymo indoksakarbos vis dar galima aptikti ant plaukų ir odos. Taip pat vyksta absorbcija per odą, tačiau sisteminė absorbcija yra dalinė ir klinikiniam efektyvumui neturi reikšmės. Absorbuotas indoksakarbos aktyviai metabolizuojamas kepenyse į įvairius metabolitus. Iš organizmo daugiausia išsiskiria su išmatomis.

## **Savybės aplinkoje**

Žr. 6.6 p.

# **6. FARMACINIAI DUOMENYS**

## **6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas**

Triacetinas,  
etilo acetoacetatas,  
izopropilo alkoholis.

## **6.2. Nesuderinamumai**

Nežinoma.

## **6.3. Tinkamumo laikas**

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 4 metai.

## **6.4. Specialieji laikymo nurodymai**

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia. Pipetes reikia laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

## **6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys**

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1, 4 arba 6 paketėliai; kiekviename paketėlyje yra viena vienadozė pipetė. Vienoje vienadozėje pipetėje yra 0,51 ml arba 1,03 ml užlašinamojo tirpalo. Vienoje dėžutėje yra tik vieno dydžio vienadozės pipetės. Pipetė sudaryta iš lankstinės plėvelės (iš polipropileno, ciklinio olefinkopolimero ir polipropileno) ir folijos dangtelio (iš aliuminio ir polipropileno, sujungtų ekstruzijos būdu), supakuotą į užlydytus aliumininis maišelius.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

## **6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Activyl negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

#### **7. REGISRUOTOJAS**

Intervet International BV  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nyderlandai

#### **8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAD)**

EU/2/10/118/011-014  
EU/2/10/118/020-021

#### **9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA**

Registravimo data 2011-02-18.  
Perregistravimo data 2016-01-07.

#### **10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA**

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje  
<http://www.ema.europa.eu/>.

#### **DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (AT)BA NAUDOTI**

Nėra.

**II. PRIEDAS**

- A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ**
- B. SAŁYGOS AR APRIBOJIMAI DĒC TIEKIMO IR NAUDOJIMO**
- C. DUOMENYS APIE DLK**

**A. GAMINTOJAS, ATSAKINGAS UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ**

Gamintojo, atsakingo už vaisto serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas

Intervet Productions S.A.  
Rue de Lyons  
27460 Igoville  
Prancūzija

**B. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI DĖL TIEKIMO IR NAUDOJIMO**

Šunims: parduodama be recepto.  
Katėms: parduodama tik su veterinariniu receptu.

**C. DUOMENYS APIE DLK**

Netaikytina.

Vaistinis preparatas neberegistruotas



Vaistinis preparatas neberegistruotas

**III PRIEDAS**

**ŽENKLINIMAS IR INFORMACINIS LAPELIS**

Vaistinis preparatas neberegistruotas

**A. ŽENKLINIMAS**

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**

**KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas labai mažiems šunims (1,5–6,5 kg)  
Activyl 150 mg užlašinamasis tirpalas mažiems šunims (6,6–10 kg)  
Activyl 300 mg užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio šunims (10,1–20 kg)  
Activyl 600 mg užlašinamasis tirpalas dideliems šunims (20,1–40 kg)  
Activyl 900 mg užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims (40,1–60 kg)

indoksakarbas

**2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)**

Indoksakarbas 100 mg  
Indoksakarbas 150 mg  
Indoksakarbas 300 mg  
Indoksakarbas 600 mg  
Indoksakarbas 900 mg

**3. VAISTO FORMA**

Užlašinamasis tirpalas

**4. PAKUOTĖS DYDIS**

1 pipetė  
4 pipetės  
6 pipetės

**5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)**

Šunys 1,5–6,5 kg  
Šunys 6,6–10 kg  
Šunys 10,1–20 kg  
Šunys 20,1–40 kg  
Šunys 40,1–60 kg

**6. INDIKACIJA (-OS)**

Gydyti esant užsikrėtimui blusomis ir jo profilaktikai.



## 7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

### Užlašinti.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

## 8. IŠLAUKA

## 9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

### Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Pipetes iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuotėje.

## 10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

## 11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

## 12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINAI

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

Veterinarinis vaistas negali patekti į vandens telkinius.

## 13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

## 14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

## 15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nyderlandai

**16. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)**

EU/02/10/118/001  
EU/02/10/118/002  
EU/02/10/118/003  
EU/02/10/118/004  
EU/02/10/118/005  
EU/02/10/118/006  
EU/02/10/118/007  
EU/02/10/118/008  
EU/02/10/118/009  
EU/02/10/118/010  
EU/02/10/118/015  
EU/02/10/118/016  
EU/02/10/118/017  
EU/02/10/118/018  
EU/02/10/118/019

**17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Serijs {numeris}

Vaistinis preparatas neberegiuotas

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**

**KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms ( $\leq 4$  kg)  
Activyl 200 mg užlašinamasis tirpalas didelėms katėms ( $> 4$  kg)

indoksakarbaz

**2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)**

Indoksakarbaz 100 mg  
Indoksakarbaz 200 mg

**3. VAISTO FORMA**

Užlašinamasis tirpalas

**4. PAKUOTĖS DYDIS**

1 pipetė  
4 pipetės  
6 pipetės

**5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)**

Katės  $\leq 4$  kg  
Katės  $> 4$  kg

**6. INDIKACIJA (-OS)**

**7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS**

Užlašinti.

Užlašinti tik ant odos ties kaukolės pagrindu.  
Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

**8. IŠLAUKA**

**9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA**

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.  
Pipetes iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuotėje.

**10. TINKAMUMO DATA**

Tinka iki {mėnuo/metai}

**11. SPECIALIOSIOS LAIKYMO SĄLYGOS**

Laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.  
Veterinarinis vaistas negali patekti į paviršinius vandenius.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA**

Tik veterinariniam naudojimui. Parduodama tik su veterinariniu receptu.

**14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“**

Saugoti nuo vaikų.

**15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Intervet International BV  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nyderlandai

**16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)**

EU/02/10/118/011  
EU/02/10/118/012  
EU/02/10/118/013  
EU/02/10/118/014  
EU/02/10/118/020  
EU/02/10/118/021

**17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS**

Serijs {numeris}

*Vaistinis preparatas neberegistruotas*



**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ**

**PAKETĖLIS**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas labai mažiems šunims  
Activyl 150 mg užlašinamasis tirpalas mažiems šunims  
Activyl 300 mg užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio šunims  
Activyl 600 mg užlašinamasis tirpalas dideliems šunims  
Activyl 900 mg užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims

indoksakarbis

**2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS**

100 mg  
150 mg  
300 mg  
600 mg  
900 mg

**3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)**

**4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

Užlašinti.

**5. IŠLAUKA**

**6. SERIJOS NUMERIS**

Lot {numeris}

**7. TINKAMUMO DATA**

EXP {mėnuo/metai}

**8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“**

Tik veterinariniam naudojimui.

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ  
PAKETĖLIS**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms  
Activyl 200 mg užlašinamasis tirpalas didelėms katėms

indoksakarbais

**2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS**

100 mg  
200 mg

**3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)**

**4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

Užlašinti.

**5. IŠLAUKA**

**6. SERIJOS NUMERIS**

Lot {numeris}

**7. TINKAMUMO DATA**

EXP {mėnuo/meta }

**8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“**

Tik veterinariam naudojimui.

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ  
LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (pipetės etiketė)**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas šunims 1,5 – 6,5 kg  
Activyl 150 mg užlašinamasis tirpalas šunims 6,6 – 10 kg  
Activyl 300 mg užlašinamasis tirpalas šunims 10,1 – 20 kg  
Activyl 600 mg užlašinamasis tirpalas šunims 20,1 – 40 kg  
Activyl 900 mg užlašinamasis tirpalas šunims 40,1 – 60 kg

indoksakarbis

**2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS**

Intervet International BV

**3. TINKAMUMO DATA**

EXP {mėnuo/metai}

**4. SERIJOS NUMERIS**

Lot {numeris}

**5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“**

Tik veterinariam naudojimui

**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINPLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ  
LIZDINĖ PLOKŠTELĖ (pipetės etiketė)**

**1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas katėms ≤ 4 kg  
Activyl 200 mg užlašinamasis tirpalas katėms > 4 kg

indoksakarbais

**2. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS**

Intervet International BV

**3. TINKAMUMO DATA**

EXP {mėnuo/metai}

**4. SERIJOS NUMERIS**

Lot {numeris}

**5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“**

Tik veterinariam naudojimui.

Vaistinis preparatas neberegistruotas

**B. INFORMACINIS LAPELIS**

**INFORMACINIS LAPELIS**  
**Activyl užlašinamasis tirpalas šunims**

**1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas

Intervet International BV  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nyderlandai

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Intervet Productions S.A.  
Rue de Lyons  
27460 Igoville  
Prancūzija

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas labai mažiems šunims  
Activyl 150 mg užlašinamasis tirpalas mažiems šunims  
Activyl 300 mg užlašinamasis tirpalas vidutinio dydžio šunims  
Activyl 600 mg užlašinamasis tirpalas dideliems šunims  
Activyl 900 mg užlašinamasis tirpalas labai dideliems šunims  
indoksakarbais

**3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS**

**Veikliosios medžiagos:**

viename ml yra 195 mg indoksakarbais.

Vienoje Activyl pipetėje yra:

	<b>Tūris (ml)</b>	<b>Indoksakarbais (mg)</b>
Activyl labai mažiems šunims (1,5–6,5 kg)	0,51	100
Activyl mažiems šunims (6,6–10 kg)	0,77	150
Activyl vidutinio dydžio šunims (10,1–20 kg)	1,54	300
Activyl dideliems šunims (20,1–40 kg)	3,08	600
Activyl labai dideliems šunims (40,1–60 kg)	4,62	900

Sudėtyje taip pat yra izopropilo alkoholio 354 mg/ml.

Skaidrus bepalvis ar geltonas tirpalas.

**4. INDIKACIJA (-OS)**

Gydyti esant užsikrėtimui blusomis (*Ctenocephalides felis*) ir jo profilaktikai. Veiksmingumas nuo naujos blusų invazijos trunka 4 sav. po vienkartinio gydymo.

Gyvūno artimiausioje aplinkoje esančios vystymosi stadijų blusos žūsta po sąlyčio su Activyl gydytais gyvūnais.

## 5. KONTRAINDIKACIJOS

Nėra.

## 6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Labai retais atvejais trumpą laiką gali pasireikšti seilėtekis (seilėjimasis), jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaužo užlašinimo vietą. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be gydymo. Taisyklingai naudojant (žr. 9 p.), užlašinimo vieta rečiau nulaužoma.

Labai retais atvejais užlašinimo vietoje gali pasireikšti tokios vietinės reakcijos kaip trumpalaikis niežulys, eritema (odos paraudimas), alopecija (plaukų išslinkimas) ar dermatitas (odos uždegimas). Šie požymiai paprastai išnyksta be gydymo.

Šio veterinarinio vaisto naudojimas užlašinimo vietoje gali sukelti vietinį, laikiną susiribalavimą ar plaukų sulipimą. Taip pat gali būti matomos sausos baltos vaisto liekanos. Tai normalu ir paprastai išnyksta per keletą dienų po vaisto naudojimo. Šie pokyčiai neturi įtakos veterinarinio vaisto saugumui ir veiksmingumui.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis toliau konvencija:

- labai dažna (vieno gydymo metu nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, slauginant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

## 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

## 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Užlašinti. Naudoti tik ant šuns odos.

Rekomenduojama dozė yra 15 mg indoksakarbo 1 kg kūno svorio, atitinkanti 0,077 ml 1 kg kūno svorio. Toliau esančioje lentelėje pateikiamas naudotinos pipetės dydis, atsižvelgiant į šuns kūno svorį:

Šuns svoris (kg)	Naudotinos pipetės dydis
1,5–6,5	Activyl 100 mg labai mažiems šunims
6,6–10	Activyl 150 mg mažiems šunims
10,1–20	Activyl 300 mg vidutinio dydžio šunims
20,1–40	Activyl 600 mg dideliems šunims
40,1–60	Activyl 900 mg labai dideliems šunims


Šuns svoris (kg)	Naudotinos pipetės dydis
> 60	Reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio pipetes

## 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO


Atidarykite vieną paketėlį ir išimkite pipetę.

**1 žingsnis.** Kad vaistą būtų lengva naudoti, šuo turėtų stovėti. Laikykite pipetę vertikaliai ir liaukite nuo savo veido. Lenkiant pipetės galiuką nulaužkite jį ir prilenkite prie pipetės.

**2 žingsnis.** Praskirkite plaukus, kad matytumėte odą. Priglauskite pipetės galiuką prie odos tarp menčių. Stipriai suspauskite pipetę ir išspauskite visą turinį tiesiai ant odos.



Didesniems šunims pipetės (-čių) turinį reikia tolygiai paskirstyti 2-4 vietose išilgai nugaros, nuo pečių iki uodegos pagrindo. Neužlašinkite per daug tirpalo vienoje vietoje, kad nenuvarvėtų.



## 10. IŠLAUKA

Netaikytina.

## 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia.

Pipetes reikia laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Nenaudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės, folijos ir pipetės po „Tinka iki/EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.



## 12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams  
Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Šio veterinarinio vaisto saugumas jaunesniems nei 8 sav. amžiaus šunims nenustatytas.

Šio veterinarinio vaisto saugumas šunims, sveriantiems mažiau nei 1,5 kg, nenustatytas.

Būtina užtikrinti, kad dozė (pipetė) atitiktų gydomo šuns svorį (žr. 8 p.).

Vaistą reikia naudoti tik ant odos paviršiaus ir ant nepažeistos odos. Vaisto dozė reikia užlašinti vietoje, kur šuo negali jo nulaižyti, ir būtina užtikrinti, kad ką tik gydyti gyvūnai nelaižytų vienas kito. Gydytus gyvūnus reikia laikyti atskirai, kol išdžius vaisto užlašinimo vieta.

Vaistas skirtas tik užlašinti ant šunų odos. Negalima jo duoti šuniui į burną ar naudoti kitais būdais. Reikia stengtis, kad vaistas nepatektų į šuns akis.

Vaistas išlieka veiksmingas išmaudžius gyvūną su šampūnu, sušlagentus kailį (plaukiojant, maudant) ir veikiant saulės spinduliams. Vis dėlto 48 val. po naudojimo šunų nereikėtų maudyti su šampūnu ar leisti jiems plaukioti.

Visiems namų ūkyje esantiems šunims reikia naudoti tinkamą priemonę nuo blusų.

Rekomenduojama tinkamai apdoroti gyvūno aplinką papildomomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojamiems vaistą gyvūnams

Pipetės iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuotėje.

Naudojant veterinarinį vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Paketėlis yra neatidaromas vaikų. Siekiant apsaugoti vaikus nuo tiesioginio sąlyčio su vaistu, iki naudojimo jį reikia laikyti paketėlyje. Panaudotas pipetės reikia nedelsiant išmesti.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas indoksakarbui, neturėtų naudoti šio vaisto.

Naudojus šį vaistą, kai kuriems žmonėms pasireiškė vietinės ir (arba) sisteminės reakcijos. Siekiant išvengti nepalankių reakcijų:

- vaistą reikia naudoti gerai vėdinamoje vietoje;
- negalima liesti neseniai gydytų gyvūnų, kol neišdžiūvo užlašinimo vieta;
- gydymo dieną vaikams draudžiama liesti gydytus gyvūnus ir negalima gyvūnams leisti miegoti su savo šeimininkais, ypač vaikais;
- po naudojimo reikia nedelsiant nusiplauti rankas ir nedelsiant nuplauti ant odos patekusį vaistą su muilu ir vandeniu;
- būtina vengti sąlyčio su akimis, kadangi vaistas gali vidutiniškai dirginti akis. Vaisto atsitiktinai patekus į akis, reikia lėtai ir kruopščiai plauti vandeniu.

Jei pasireiškia simptomai, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti informacinį lapelį.

Šis vaistas yra labai degus. Saugoti nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ar kitų užsidegimo šaltinių.

Vaikingumas ir vaisingumas

Negalima naudoti vaikingoms kalėms ir veisiamiems šunims.

### Laktacija

Negalima naudoti kalėms laktacijos metu.

### Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Klinikinių tyrimų metu, kai Activyl buvo naudojamas kartu su deltametrino antkakliais, impregnuotais iki 4 % deltametrino, susijusių nepalankių reakcijų nepasireiškė.

Pasitarkite su veterinarijos gydytoju, jei šunims vaistą ketinate naudoti kartu su kitais produktais ar vaistais.

## **13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIUKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Activyl negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams. Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

## **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA**

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje <http://www.ema.europa.eu/>.

## **15. KITA INFORMACIJA**

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1, 4 arba 6 paketėliai. Kiekviename paketėlyje yra viena viendozė pipetė.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

### **België/Belgique/Belgien:**

VIRBAC BELGIUM NV,  
Esperantolaan 4,  
BE-3001 Leuven,  
Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

### **Lietuva:**

OŪ ZOOVETVARU,  
Uusaru 5,  
76505 Saue/Harjumaa,  
Estija,  
Tel: + 372 6 709 006

### **Република България:**

Ергон-Миланова ЕООД,  
Р България, гр София,  
ж.к.Люлин 10, бл.145,  
ergon-m@inbox.contact.bg

### **Luxembourg/Luxemburg:**

VIRBAC BELGIUM NV,  
Esperantolaan 4,  
BE-3001 Leuven,  
Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

### **Česká republika:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
France,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

### **Magyarország:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Franciaország,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Danmark:**

VIRBAC Danmark A/S,  
Profilvej 1,  
DK-6000 Kolding,  
Tlf: + 45 7552 1244

**Deutschland:**

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH,  
Rögen 20,  
DE-22843 Bad Oldesloe,  
Tel: + 49 (4531) 805 111

**Eesti:**

OÜ ZOOVETVARU,  
Uusaru 5,  
EE-76505 Saue/Harjumaa,  
Tel: + 372 6 709 006

**Ελλάδα:**

VIRBAC HELLAS A.E.,  
13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,  
EL-144 52 Μεταμόρφωση,  
Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ,  
Τηλ: + 30 210 6219520,  
[info@virbac.gr](mailto:info@virbac.gr)

**España:**

VIRBAC ESPAÑA S.A.,  
Angel Guimerá 179-181,  
ES-8950 Esplugues de Llobregat,  
[infocliente@virbac.es](mailto:infocliente@virbac.es)

**France:**

VIRBAC France,  
13<sup>ème</sup> rue – L.I.D. – BP 27,  
FR-06517 Carros,  
[service-conso@virbac.fr](mailto:service-conso@virbac.fr)

**Hrvatska:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Francuska,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Ireland:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,

**Malta:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Franza,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Nederland:**

VIRBAC NEDERLAND BV,  
Hermesweg 15,  
NL-3771 ND Barneveld,  
Tel: + 31 (0) 342 427 127

**Norge:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Frankrike,  
Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Österreich:**

VIRBAC Österreich GmbH,  
Hildebrandgasse 27,  
A-1180 Wien,  
Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

**Polska:**

VIRBAC SP. Z O.O.,  
Ul. Pulawska 314,  
PL-02 819 Warszawa,  
Tel.: + 48 22 855 40 46

**Portugal:**

VIRBAC DE PORTUGAL,  
LABORATÓRIOS LDA,  
R.do Centro Empresarial,  
Ed13-Piso 1- Esc.3,  
Quinta da Beloura,  
PT-2710-693 Sintra,  
Tel: + 351 219 245 020

**România:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Franța,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Slovenija:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,

France  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Ísland:**  
VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Frakkland,  
Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Italia:**  
VIRBAC SRL,  
Via Ettore Bugatti, 15,  
IT-20142 Milano,  
Tel: + 39 02 40 92 47 1

**Κύπρος:**  
VIRBAC HELLAS A.E.,  
13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,  
EL-144 52 Μεταμόρφωση,  
Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ,  
Τηλ: + 30 210 6219520,  
[info@virbac.gr](mailto:info@virbac.gr)

**Latvija:**  
OÜ ZOOVETVARU,  
Uusaru 5,  
76505 Saue/Harjumaa,  
Igaunija,  
Tel: + 372 6 709 006

Francija,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Slovenská republika:**  
VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Francúzsko,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Suomi/Finland:**  
VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Ranska/Frankrike,  
Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Sverige:**  
VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Frankrike,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**United Kingdom:**  
VIRBAC Ltd,  
Suffolk IP30 9 UP – UK,  
Tel: + 44 (0) 1359 243243

**INFORMACINIS LAPELIS**  
**Activyl užlašinamasis tirpalas katėms**

**1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS**

Registruotojas

Intervet International BV  
Wim de Körverstraat 35  
5831 AN Boxmeer  
Nyderlandai

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

Intervet Productions S.A.  
Rue de Lyons  
27460 Igoville  
Prancūzija

**2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Activyl 100 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms  
Activyl 200 mg užlašinamasis tirpalas didelėms katėms  
indoksakarbais

**3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS**

**Veikliosios medžiagos:**

viename ml yra 195 mg indoksakarbais.  
Vienoje Activyl pipetėje yra:

	<b>Tūris (ml)</b>	<b>Indoksakarbais (mg)</b>
Activyl mažoms katėms ( $\leq 4$ kg)	0,51	100
Activyl didelėms katėms ( $> 4$ kg)	1,03	200

Sudėtyje taip pat yra izopropilo alkoholio 354 mg/ml.

Skaidrus bespalvis ar geltonas tirpalas.

**4. INDIKACIJA (-OS)**

Gydyti esant užsikrėtimui blusomis (*Ctenocephalides felis*) ir jo profilaktikai. Veiksmingumas nuo naujos blusų infestacijos trunka 4 sav. po vienkartinio gydymo.

Vaistas gali būti naudojamas kaip gydymo nuo blusų sukeltos alerginio dermatito strategijos dalis (BAD). Gyvūnų artimiausioje aplinkoje esančios vystymosi stadijų blusos žūsta po sąlyčio su Activyl gydytais gyvūnais.

**5. KONTRAINDIKACIJOS**

Nėra.

## 6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Retais atvejais pastebėti tokie neurologiniai požymiai kaip koordinacijos sutrikimas, tremoras (drebulys), ataksija (netvirta eisena), traukuliai, midriazė (išsiplėtę vyzdžiai) ir regos sutrikimas. Retais atvejais pastebėti tokie požymiai kaip emezė (vėmimas), o labai retais atvejais – anoreksija (apetito sumažėjimas), letargija (mieguistumas), padidėjęs aktyvumas ir kniaukimas. Visi požymiai paprastai išnyksta be gydymo.

Labai retais atvejais trumpą laiką gali pasireikšti seilėtekis (seilėjimasis), jei katė iš karto po naudojimo nulaužo užlašinimo vietą. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be gydymo. Tinkamai naudojant (žr. 9 p.), užlašinimo vieta rečiau nulaužoma.

Retais atvejais užlašinimo vietoje gali pasireikšti tokios naudojimo vietos reakcijos kaip trumpalaikis niežulys, eritema (odos paraudimas), alopecija (plaukų slinkimas) ar dermatitas (odos uždegimas). Šie požymiai paprastai išnyksta be gydymo.

Šio veterinarinio vaisto naudojimas užlašinimo vietoje gali sukelti vietinį, laikiną susiribalavimą ar kailio susivėlimą. Taip pat gali būti matomos sausos baltos vaisto liekanos. Tai normalu ir paprastai išnyksta per keletą dienų po vaisto naudojimo. Šie pokyčiai neturi įtakos veterinarinio vaisto saugumui ir veiksmingumui.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (vieno gydymo metu nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šį antrą informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinės gydytoją.

## 7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Katės.

## 8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Užlašinti. Naudoti tik ant katės odos.

Rekomenduojama dozė yra 25 mg indoksakarbo 1 kg kūno svorio, atitinkanti 0,128 ml 1 kg kūno svorio. Toliau esančioje lentelėje pateikiamas naudotinos pipetės dydis, atsižvelgiant į katės kūno svorį:


Katės svoris (kg)	Naudotinos pipetės dydis
≤ 4	Activyl 100 mg mažoms katėms
> 4	Activyl 200 mg didelėms katėms

## 9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Atidarykite paketėlį ir išimkite pipetę.

**1 žingsnis.** Kad vaistą būtų lengva naudoti, katė turėtų stovėti. Laikykite pipetę vertikaliai toliau nuo savo veido. Lenkiant pipetės galiuką nulaužkite jį ir prilenkite prie pipetės.

**2 žingsnis.** Praskirkite plaukus taip, kad matytumėte odą. Priglauskite pipetės galiuką prie odos prie kaukolės pagrindo, kur katė negali jo nulaižyti. Stipriai suspauskite pipetę ir išspauskite visą jos turinį tiesiai ant odos.



## 10. IŠLAUKA

Netaikytina.

## 11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Šiam veterinariniam vaistui specialių laikymo temperatūros sąlygų nereikia. Pipetės reikia laikyti originalioje pakuotėje, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės, folijos ir pipetės po „Tinka iki/EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

## 12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Specialieji nurodymai, naudojant atširų rūšių paskirties gyvūnams

Šio veterinarinio vaisto saugumas jaunesnėms nei 8 sav. amžiaus katėms nenustatytas.

Šio veterinarinio vaisto saugumas katėms, sveriančioms mažiau nei 0,6 kg, nenustatytas.

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina užtikrinti, kad dozė (pipetė) atitiktų gydomos katės svorį (žr. 8 p.).

Vaistą reikia naudoti tik ant odos paviršiaus ir ant nepažeistos odos. Vaisto dozę reikia užlašinti vietoje, kur katė negali jo nulaižyti, ir būtina užtikrinti, kad ką tik gydyti gyvūnai nelaižytų vienas kito. Gydytus gyvūnus reikia laikyti atskirai, kol išdžius vaisto užlašinimo vieta.

Vaistas skiriamas tik užlašinti ant kačių odos. Negalima jo duoti į burną ar naudoti bet kokiais kitais būdais. Reikia stengtis, kad vaistas nepatektų į katės akis.

Vaistas išlieka veiksmingas išmaudžius gyvūną su šampūnu, sušlapinus kailį (plaukiojant, maudant) ir veikiant saulės spinduliams. Vis dėlto 48 val. po naudojimo nereikėtų maudyti su šampūnu ar leisti joms plaukioti.

Visoms namų ūkyje esančioms katėms reikia naudoti tinkamą priemonę nuo blusų.

Rekomenduojama tinkamai apdoroti gyvūno aplinką papildomomis cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams  
Pipetes iki naudojimo reikia laikyti originalioje pakuotėje.

Naudojant veterinarinį vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Paketėlis yra neatidaromas vaikų. Siekiant apsaugoti vaikus nuo tiesioginio sąlyčio su vaistu, iki naudojimo jį reikia laikyti paketėlyje. Panaudotas pipetes reikia nedelsiant išmesti.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas indoksakarbui, neturėtų naudoti šio vaisto.  
Naudojus šį vaistą, kai kuriems žmonės pasireiškė vietinės ir (arba) sisteminės reakcijos. Siekiant išvengti nepalankių reakcijų:

- vaistą reikia naudoti gerai vėdinamoje vietoje;
- negalima liesti neseniai gydytų gyvūnų, kol neišdžiūvo užlašavimo vieta;
- gydymo dieną vaikams draudžiama liesti gydytus gyvūnus ir negalima gyvūnams leisti miegoti su savo šeiminiškais, ypač vaikais;
- po naudojimo reikia nedelsiant nusiplauti rankas ir nedelsiant nusiplauti ant odos patekusį vaistą su muilu ir vandeniu;
- būtina vengti sąlyčio su akimis, kadangi vaistas gali vidutin škaip dirginti akis. Vaisto atsitiktinai patekus į akis, reikia lėtai ir kruopščiai plauti vandeniu.

Jei pasireiškia simptomai, reikia kreiptis į gydytoją ir parodyti informacinį lapelį.

Šis vaistas yra labai degus. Saugoti nuo karščio, kibirkščių, atviros liepsnos ar kitų užsidegimo šaltinių.

Vaikingumas ir vaisingumas  
Negalima naudoti vaikingoms katėms ir veisliaromėms katėms.

Laktacija  
Negalima naudoti laktuojančioms katėms.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos  
Pasitarkite su veterinarijos gydytoju, jei katėms vaistą ketinate naudoti kartu su kitais produktais ar vaistais.

### **13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.  
Actyvil negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.  
Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

### **14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA**

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Europos vaistų agentūros tinklalapyje  
<http://www.ema.europa.eu/>.

### **15. KITA INFORMACIJA**

Kartoninė dėžutė, kurioje yra 1, 4 arba 6 paketėliai; kiekviename paketėlyje yra viena vienadozė pipetė.



Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, reikia susisiekti su registruotojo vietiniu atstovu.

**België/Belgique/Belgien:**

VIRBAC BELGIUM NV,  
Esperantolaan 4,  
BE-3001 Leuven,  
Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

**Република България:**

Ергон-Миланова ЕООД,  
Р България, гр.София,  
ж.к.Люлин 10, бл.145,  
ergon-m@mbox.contact.bg

**Česká republika:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
France,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Danmark:**

VIRBAC Danmark A/S,  
Profilvej 1,  
DK-6000 Kolding,  
Tlf: + 45 7552 1244

**Deutschland:**

VIRBAC Tierarzneimittel GmbH  
Rögen 20,  
DE-22843 Bad Oldesloe,  
Tel: + 49 (4531) 805 111

**Eesti:**

OÜ ZOOVETVARU  
Uusaru 5,  
EE-76505 Saue/Harjumaa,  
Tel: + 372 6 709 006

**Ελλάδα:**

VIRBAC HELLAS A.E.,  
13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,  
EL-144 52 Μεταμόρφωση,  
Αθήνα-ΕΛΛΑΔΑ,  
Τηλ: + 30 210 6219520,  
[info@virbac.gr](mailto:info@virbac.gr)

**España:**

**Lietuva:**

OÜ ZOOVETVARU,  
Uusaru 5,  
76505 Saue/Harjumaa,  
Estija,  
Tel: + 372 6 709 006

**Luxembourg/Luxemburg:**

VIRBAC BELGIUM NV,  
Esperantolaan 4,  
BE-3001 Leuven,  
Tél/Tel: + 32 (0) 16 38 72 60

**Magyarország:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Franceország,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Malta:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Franza,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Nederland:**

VIRBAC NEDERLAND BV,  
Hermesweg 15,  
NL-3771 ND Barneveld,  
Tel: + 31 (0) 342 427 127

**Norge:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Frankrike,  
Tlf: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Österreich:**

VIRBAC Österreich GmbH,  
Hildebrandgasse 27,  
A-1180 Wien,  
Tel: + 43 (0) 1 21 834 260

**Polska:**

VIRBAC ESPAÑA S.A.,  
Angel Guimerá 179-181,  
ES-8950 Esplugues de Llobregat,  
[infocliente@virbac.es](mailto:infocliente@virbac.es)

**France:**

VIRBAC France,  
13<sup>ème</sup> rue – L.I.D. – BP 27,  
FR-06517 Carros,  
[service-conso@virbac.fr](mailto:service-conso@virbac.fr)

**Hrvatska:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Francuska,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Ireland:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
France  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Ísland:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Frakkland,  
Sími: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Italia:**

VIRBAC SRL,  
Via Ettore Bugatti, 15,  
IT-20142 Milano,  
Tel: + 39 02 40 92 47 1

**Κύπρος:**

VIRBAC HELI AS A.E.,  
13ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,  
EL-144 52 Μεταμόρφωση,  
Αθήνα, ΕΛΛΑΔΑ,  
Τηλ: + 30 210 6219520,  
[info@virbac.gr](mailto:info@virbac.gr)

**Latvija:**

OŪ ZOOVETVARU,  
Uusaru 5,  
76505 Saue/Harjumaa,

VIRBAC SP. Z O.O.,  
Ul. Pulawska 314,  
PL-02 819 Warszawa,  
Tel.: + 48 22 855 40 46

**Portugal:**

VIRBAC DE PORTUGAL,  
LABORATÓRIOS LDA,  
R.do Centro Empresarial,  
Ed13-Piso 1- Esc.3,  
Quinta da Beloura,  
PT-2710-693 Sintra,  
Tel: + 351 219 245 020

**România:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Franța,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Slovenija:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Francija,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Slovenská republika:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Francúzsko,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Suomi/Finland:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Ranska/Frankrike,  
Puh/Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**Sverige:**

VIRBAC,  
1<sup>ère</sup> avenue 2065 m – L.I.D.,  
FR-06516 Carros,  
Frankrike,  
Tel: + 33 (0) 4 92 08 73 00

**United Kingdom:**

VIRBAC Ltd,  
Suffolk IP30 9 UP – UK,  
Tel: + 44 (0) 1359 243243

Igaunija,  
Tel: + 372 6 709 006

*Vaistinis preparatas neberegistruotas*