

GEBRAUCHSINFORMATION

Mucosa compositum Heel - Injektionslösung für Tiere

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber und Hersteller, der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
D-76532 Baden-Baden
Deutschland

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Mucosa compositum Heel - Injektionslösung für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität

3. WIRKSTOFFE UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 Ampulle zu 5 ml (= 5 g) enthält:

Wirkstoffe:

Mucosa nasalis suis	D8	0,05 g
Mucosa oris suis	D8	0,05 g
Mucosa pulmonis suis	D8	0,05 g
Mucosa oculi suis	D8	0,05 g
Mucosa vesicae felleae suis	D8	0,05 g
Mucosa pylori suis	D8	0,05 g
Mucosa duodeni suis	D8	0,05 g
Mucosa oesophagi suis	D8	0,05 g
Mucosa jejuni suis	D8	0,05 g
Mucosa ilei suis	D8	0,05 g
Mucosa coli suis	D8	0,05 g
Mucosa recti suis	D8	0,05 g
Mucosa ductus choledochi suis	D8	0,05 g
Mucosa vesicae urinariae suis	D8	0,05 g
Ventriculus suis	D8	0,05 g
Pancreas suis	D10	0,05 g
Argentum nitricum	D6	0,05 g
Atropa bella-donna	D10	0,05 g
Oxalis acetosella	D6	0,05 g
Semecarpus anacardium	D6	0,05 g
Phosphorus	D8	0,05 g
Lachesis	D10	0,05 g
Psychotria ipecacuanha	D8	0,05 g
Strychnos nux-vomica	D13	0,05 g
Veratrum album	D4	0,05 g
Pulsatilla pratensis	D6	0,05 g
Kreosotum	D10	0,05 g
Sulfur	D8	0,05 g

Colibacillinum-Nosode	D28	0,05 g
Marsdenia cundurango	D6	0,05 g
Kalium bichromicum	D8	0,05 g
Hydrastis canadensis	D4	0,05 g
Mandragora e radice siccata	D10	0,05 g
Momordica balsamina	D6	0,05 g
Ceanothus americanus	D4	0,05 g
Natrium diethyloxalaceticum	D8	0,05 g

Sonstige Bestandteile:

Natriumchlorid, Wasser für Injektionszwecke

Farblose, klare Injektionslösung.

4. ANWENDUNGSGEBIETE

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

Entzündungen der Schleimhäute, z.B. im Bereich der oberen und unteren Atemwege, im Bereich des Verdauungstraktes, der Harnwege, bei chronischer Darmentzündung, unterstützend bei Parvovirusinfektion, sowie bei Gebärmutterentzündung (Endometritis).

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung.

Bei schweren Formen dieser Erkrankung ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegenüber den Wirkstoffen oder einem der sonstigen Bestandteile.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine bekannt.

Falls Sie Nebenwirkungen bei Ihrem Tier feststellen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERARTEN

Pferd, Rind, Schaf, Ziege, Schwein, Hund, Katze

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Zur subkutanen oder intravenösen Injektion.

Dosierung:

Entsprechend der Tierart und in Abhängigkeit vom Körpergewicht beträgt die Einzeldosis pro Tag:

Pferd, Rind, Schwein: 5 ml

Ferkel:	2-3 ml
Schaf, Ziege:	2 ml
Großer Hund (über 25 kg):	3-4 ml
Mittlerer Hund (15-25 kg):	2 ml
Kleiner Hund (bis zu 15 kg), Katze:	1-2 ml
Welpen:	0,5-1 ml

Bei akuten Beschwerden kann die angegebene Dosis nach 24 Stunden wiederholt werden. Bei Neigung zu Rückfällen oder chronischen Erkrankungen ist die Einzeldosis jeweils im Abstand von 4 Tagen zu verabreichen.

Die Anwendungsdauer richtet sich nach dem vorliegenden Krankheitsbild und wird vom Tierarzt bestimmt.

Anleitung zum Öffnen einer Ampulle



Ampulle vorsichtig öffnen! Bitte befolgen Sie die Anweisungen.

Ein Aufsägen der Glasampulle ist nicht erforderlich. Halten Sie die Ampulle mit dem Kopf schräg nach oben und lassen Sie die sich darin befindliche Lösung durch Klopfen oder Schütteln nach unten fließen. Brechen Sie dann den Ampullenkopf ab, indem Sie auf den Farbpunkt Druck ausüben. Angebrochene Ampullen sind zu verwerfen.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Eine Injektion dieses Arzneimittels sollte nur von Tierärzten oder anderen Personen durchgeführt werden, die die jeweilige Injektionstechnik sicher beherrschen.

10. WARTEZEIT

Pferd, Rind, Schwein, Schaf, Ziege: Essbare Gewebe: 0 Tage
Pferd, Rind, Schaf, Ziege: Milch: 0 Tage

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Die Ampullen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf dem Karton angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden.

Die Ampullen sind nach Anbruch sofort aufzubrauchen oder zu entsorgen.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung bei Tieren

Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Tierarzt kontrolliert werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.
Bei anhaltenden oder sich verschlimmernden Beschwerden sollte ein Tierarzt befragt werden..

Trächtigkeit und Laktation

Zur Verträglichkeit des Tierarzneimittels bei trächtigen und laktierenden Tieren liegen keine Untersuchungsergebnisse vor. Während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt anwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden.

Wenn dieses Tierarzneimittel gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.
Fragen Sie Ihren Tierarzt, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

Januar 2020

15. WEITERE ANGABEN

Packungsgrößen: 5 oder 50 Ampullen mit 5 ml Lösung

Z. Nr.: 8-30110