

ЛИСТОВКА

1. Наименование на ветеринарния лекарствен продукт

БРЕЙК ПРО шампоан / BREAK PRO shampoo
Лечебен шампоан за кожа за кучета и котки

2. Състав

В 100 ml се съдържат:

Активно вещество:

Пророхур 1.00 g

Помощни вещества:

Sodium alkyl ethoxy sulfate

Cocamidopropyl betaine

Sodium chloride

Purified water

3. Видове животни, за които е предназначен ВЛП

Кучета и котки.

4. Показания за употреба

Лечение при инвазии с външни паразити.

5. Противопоказания

Да не се използва върху увредена кожа.

Да не се използва при болни животни и животни в оздравителен период.

Да не се използва при свръхчувствителност към активното вещество или към някои от помощните вещества.

6. Специални предупреждения

Специални предпазни мерки за безопасна употреба при видовете животни, за които е предназначен ВЛП:

Да се избягва директен контакт с очите, носа и устата на животните. При случаен контакт с очите, носа или устата, изплакнете обилно с умерена струя вода.

За оптимален контрол на опаразитяванията с бълхи и въшки в дом с много животни, всички котки и кучета трябва да бъдат третирани едновременно с подходящ ветеринарен лекарствен продукт. Бълхите от домашните любимци често инвазират кошницата, леглото или обичайните места за почивка на животните, като килими и мека мебел, които трябва да бъдат, в случай на масивно опаразитяване и в началото на прилагането на мерките за контрол, третирани с подходящ инсектицид и редовно почиствани с прахосмукачка.

Специални предпазни мерки, които трябва да вземе лицето, прилагащо ветеринарния лекарствен продукт на животните:

Хора с установена свръхчувствителност към пиретроин трябва да избягват контакт с ветеринарния лекарствен продукт.

Индивидуално предпазно оборудване, състоящо се от гумени ръкавици и защитни очила, трябва да се носят, когато се работи с ветеринарния лекарствен продукт.

Да се пази от попадане в очите, устата или носа. При случаен контакт с ветеринарния лекарствен продукт, контаминираното място да се измие обилно с умерена струя вода.

След употреба старателно да се измият с вода и сапун всички части на тялото, които са били в пряк контакт с продукта.

Антидот: Атропин сулфат.

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

Предозиране:

Ветеринарният лекарствен продукт е добре поносим в препоръчаните дози и не води до токсичен ефект. Приложен локално в дози надвишаващи препоръчаните, за период от 10 дни, ветеринарния лекарствен продукт се понася много добре от кучета и котки. Терапевтичната ширина на ветеринарния лекарствен продукт при кучета е доста голяма и дози, превишаващи до 3 пъти препоръчаната не биха довели до неблагоприятни реакции, докато котките са по-чувствителни към карбаматите.

При поглъщане на продукта във високи концентрации е възможна проявата на признаци на карбаматно отравяне, характерни за холинестераза-инхибиращите карбаматни естери - тремор, мускулен спазъм, лакримация, саливация и слъзна секреция.

Антидот: Атропин сулфат.

7. Неблагоприятни реакции

Кучета и котки:

Неопределена честота (не може да се определи от наличните данни):	Сърбеж и зачервяване ¹
--	-----------------------------------

¹ При свръхчувствителни животни е възможна проявата на признаци, като сърбеж и зачервяване.

Съобщаването на неблагоприятни реакции е важно. Това позволява непрекъснат мониторинг на безопасността на продукта. Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарния лекарствен продукт не действа, свържете се първо с Вашия ветеринарен лекар. Можете също да съобщавате неблагоприятни реакции на притежателя на разрешението за търговия, като използвате данните за контакт в края на тази листовка или чрез Вашата национална система за съобщаване: <https://kvmp.bfsa.bg/phv>.

8. Дозировка за всеки вид животно, начини и метод на приложение

За прилагане върху кожата.

Количеството ветеринарен лекарствен продукт, което трябва да се приложи, е в зависимост от вида и породата на животното – дребни, средни и едри породи кучета с различна по големина, плътност и интензивност космена покривка. Същото се отнася до котките, при тях не съществуват големи вариации вътре в породата и между породите.

При котките ветеринарния лекарствен продукт се прилага в доза 1 – 2 ml/kg телесна маса.

При късокосместите породи кучета се прилага 1 ml/kg т.м., но не повече от 20 ml. При дългокосместите породи се прилага 1-2 ml/kg т.м, но не повече от 20 ml.

9. Съвети за правилното прилагане на продукта

С цел осигуряване на безопасност и ефикасност при употребата на продукта е необходимо стопанина сам да прецени, какво количество от продукта да приложи.

Кучето или котката, се намокря обилно с вода с температура, приятна за животното, след което необходимото количество шампоан се нанася по тялото, като малко по-обилно се нанася под мишниците, между задните крайници, по гърба в областите на тила, плешките и опашката. Втрива се внимателно до получаване на обилна пяна. С получената пяна се прави дълбок масаж в продължение на 3-5 минути, след което животното се изплаква обилно с вода и се подсушава с кърпа. По време на къпането да се внимава в очите и ушите на животните да не попадат вода и пяна от продукта.

10. Карентни срокове

Не е приложимо.

11. Специални условия за съхранение

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се съхранява в оригиналната опаковка.

Да се съхранява на сухо място.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Срок на годност след първото отваряне на първичната опаковка: 2 месеца.

Да не се използва този ветеринарен лекарствен продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета.

12. Специални предпазни мерки при унищожаване

Ветеринарните лекарствени продукти не трябва да бъдат изхвърляни чрез отпадни води или битови отпадъци.

Ветеринарният лекарствен продукт не трябва да бъде изхвърлян във водни басейни, тъй като ргорохиг може да бъдат опасен за риби и други водни организми. На скоро третиран животни не трябва да се позволява да се къпят в повърхностни води.

Използвайте програми за връщане при унищожаването на неизползвани ветеринарни лекарствени продукти или остатъци от тях в съответствие с изискванията на местното законодателство и с всички приложими национални системи за събиране. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар как да унищожите ненужни ветеринарни лекарствени продукти.

13. Класификация на ветеринарните лекарствени продукти

Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. Номера на разрешението за търговия и размери опаковки

0022-1620

Пластмасови флакони от 100 ml, 200 ml, 250 ml и 500 ml.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

15. Дата на последната редакция на текста

05/2024

Подробна информация за този ветеринарен лекарствен продукт може да намерите в базата данни на Съюза относно продуктите (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Данни за връзка

Притежател на разрешението за търговия и производител, отговарящ за освобождаването на партиди и данни за връзка за съобщаване на предполагаеми неблагоприятни реакции:

“Фарма Вет” ООД
гр. Шумен, ул. “Отец Паисий” № 40
Република България
тел./факс: 054/801-215
E-mail: farma_vet@abv.bg

X

Д-Р ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ
ЗАМЕСТИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР