

NAVODILO ZA UPORABO

SULFADIMIDIN Genera 2,5 g tablete

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER PROIZVAJALEC ZDRAVILA, ODGOVOREN ZA SPROŠČANJE SERIJ, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Proizvajalec, odgovoren za sproščanje serij:

GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvaška

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

SULFADIMIDIN Genera 2,5 g tablete

sulfadimidin

3. NAVEDBA UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

1 tableta vsebuje:

Učinkovina:

sulfadimidin 2,5 g

Pomožne snovi: kalcijev karbonat, koruzni škrob, želatina, smukec, magnezijev stearat.

Bela do rumenkasto bela okrogla tableta s križno razdelilno zarezo na eni strani.

Tablete lahko razpolovimo ali razdelimo na četrtine.

4. INDIKACIJE

Pljučnica, enteritis, salmoneloza, septikemija pri mladičih, difterija pri teletih in smolika.

5. KONTRAINDIKACIJE

Preobčutljivost na sulfonamide.

Hujše okvare ledvic in jetrnega parenhima. Okvare krvotvornih organov.

Bolezni, pri katerih živali manj pijejo in čezmerno zgubljajo tekočino.

6. NEŽELENI UČINKI

Po peroralnem dajanju zelo velikih odmerkov se lahko poruši ravnovesje mikroflore v črevesju.

Pri prežvekovalcih se lahko pojavijo motnje v prebavi celuloze.

Pri teletih, ki dobivajo sulfonamide z mlečnim nadomestkom, se lahko pojavi driska.

Stranski učinki pri dajanju priporočenih odmerkov so redki.

Če opazite kakršne koli stranske učinke, tudi tiste, ki niso navedeni v tem navodilu za uporabo ali mislite, da zdravilo ni delovalo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, ovce, koze, konji, prašiči in psi.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Zdravilo SULFADIMIDIN Genera 2,5 g tablete dajemo peroralno cele, razdeljene ali zdrobljene ter pomešane s hrano, 5 dni.

Začetni oziroma udarni odmerek znaša za vse živali 200 mg sulfadimidina na 1 kg telesne mase dnevno, oziroma 2 tableti na 25 kg telesne mase.

Vzdrževalni odmerek je 100 mg sulfadimidina na 1 kg telesne mase dnevno, oziroma 1 tableta na 25 kg telesne mase.

Psom razdelimo dnevni vzdrževalni odmerek na dva obroka, se pravi, da zdravilo SULFADIMIDIN Genera 2,5 g tablete dajemo vsakih 12 ur. Na primer, psu s telesno maso 25 kg damo 1/2 tablete zjutraj in 1/2 tablete zvečer.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Glejte poglavje 8. Odmerki za posamezne živalske vrste ter pot(i) in način uporabe zdravila.

10. KARENCA

Ovce: meso in organi: 8 dni

Govedo in koze: meso in organi: 10 dni

Teleta in prašiči: meso in organi: 12 dni

Krave in koze: mleko: 5 dni

Ovce: mleko: 3 dni

Ni dovoljena uporaba pri konjih, ki so namenjeni za prehrano ljudi.

Psi: ni smiselno.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zaščitite pred svetlobo.

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo je označen na ovojnini (5 let).

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po EXP.

12. POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako ciljno živalsko vrsto:

Tablete niso primerne za zdravljenje majhnih psov.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Živali med zdravljenjem s sulfonamidi ne smejo biti žejne, kar pomeni, da morajo imeti prost dostop do vode za pitje. Posamezne dehidrirane živali moramo pred uvedbo zdravljenja rehidrirati.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Po uporabi si je treba umiti roke.

Brejost in laktacija:

Lahko se uporablja v obdobju brejosti in laktacije.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Antacidi zmanjšajo absorpcijo sulfonamidov iz želodca in črevesja.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

V praksi ni potrebe za preveliko odmerjanje.

Po peroralnem dajanju zelo velikih odmerkov se lahko poruši ravnovesje mikroflore v črevesju.

Inkompatibilnosti:

Glejte poglavje »Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij«.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi zahtevami.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEVE NAVODIL ZA UPORABO

7.12.2018

15. DRUGE INFORMACIJE

Delovanje

Sulfonamidi delujejo bakteriostatično na osnovi kompetitivnega zaviranja vgradnje 4-aminobenzojske kisline v molekulo folne kisline, ki v povzročiteljevem protoplastu sodeluje pri sintezi purinskih in pirimidinskih baz. Sulfadimidin deluje na grampozitivne in na gramnegativne mikroorganizme, posamezne rikecije in protozoje (kokcidije, toksoplazmoze). Sulfonamidi delujejo bakteriostatično, ne pa tudi baktericidno, zato je treba v organizmu dovolj dolgo ohranjati učinkovito koncentracijo zdravila- 5 dni. Sulfadimidin je sulfonamid s kratkim ali srednje kratkim delovanjem. Za večino živali zadostuje dajanje sulfadimidina enkrat na 24 ur.

Način izdaje zdravila

Na veterinarski recept.

Oprema

Škatla z 18 tabletami po 3,8 g.