

BIJSLUITER:

SEDAN 35 mg/ml gel voor oraal gebruik voor paarden en honden

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLEND

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:
Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23 Ivanovice na Hané, Tsjechische Republiek

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

SEDAN 35 mg/ml gel voor oraal gebruik voor paarden en honden
Acepromazine

3. GEHALTE AAN WERKZAME STOF(FEN) EN OVERIGE BESTANDDELEN

Per ml:

Werkzame stof:

Acepromazine 35,0 mg (overeenkomend met 47,5 mg acepromazinemaleaat)

Hulpstoffen:

Methylparahydroxybenzoesaat (E 218) 0,65 mg

Propylparahydroxybenzoesaat 0,35 mg

Transparante, oranjegele gel voor oraal gebruik.

4. INDICATIE(S)

Bij paarden en honden
Premedicatie voor sedatie en anesthesie.

5. CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij:

- hypotensie, posttraumatische shock of hypovolemie.
- dieren in een staat van ernstige emotionele opwindings.
- dieren die lijden aan onderkoeling.
- dieren met hematologische aandoeningen/coagulopathieën of anemie.
- dieren met hart- en/of longfalen.
- dieren met epilepsie.
- pasgeboren dieren.
- honden jonger dan 3 maanden.
- overgevoeligheid voor de werkzame stof of één van de hulpstoffen.

6. BIJWERKINGEN

Paarden:

Aangezien acepromazine de tonus van het sympathische zenuwstelsel verlaagt, kan na toediening een kortstondige bloeddruk daling optreden.

Remming van temperatuurregeling.

De volgende omkeerbare veranderingen zijn mogelijk in het hemogram:

Kortstondige afname van het aantal erytrocyten en hemoglobineconcentratie, evenals van het aantal trombocyten en leukocyten.

Omdat acepromazine de prolactinesecretie kan verhogen, kan de toediening van acepromazine leiden tot vruchtbaarheidsstoornissen.

Prolaps van de penis kan optreden als gevolg van de ontspanning van de spieren van het penisintrekkingsmechanisme. Het terugtrekken van de penis moet binnen twee tot drie uur zichtbaar zijn. Indien dit niet gebeurt, wordt geadviseerd contact op te nemen met een dierenarts. Een gebrekkige intrekking is met name zorgelijk bij dekhengsten. Toediening van acepromazine heeft parafimose veroorzaakt (de voorhuid keert niet terug naar de normale positie), soms in een vervolg op priapisme (aanhoudende erectie).

Er kunnen tegenstrijdige klinische tekenen van agressiviteit en gegeneraliseerde CZS-stimulatie optreden.

Verzakking van het knipvlies (derde ooglid) is ook genoemd als mogelijke bijwerking bij paarden.

Honden:

Hypotensie, tachycardie, verhoging van de ademhalingsfrequentie, aritmie, miosis, tranenvloed en ataxie.

Er kunnen tegenstrijdige klinische tekenen van agressiviteit en gegeneraliseerde CZS-stimulatie optreden.

Verzakking van het knipvlies (derde ooglid).

De frequentie van bijwerkingen wordt als volgt gedefinieerd:

- Zeer vaak (meer dan 1 op de 10 behandelde dieren vertonen bijwerking(en))
- Vaak (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 100 behandelde dieren)
- Soms (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 1.000 behandelde dieren)
- Zelden (meer dan 1 maar minder dan 10 van de 10.000 behandelde dieren)
- Zeer zelden (minder dan 1 van de 10.000 behandelde dieren, inclusief geïsoleerde rapporten).

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiters worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Als alternatief kunt u dit rapporteren via uw nationaal meldsysteem {details van het nationaal meldsysteem}.

7. DOELDIERSOORTEN

Paarden (niet bestemd voor consumptie), honden.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

Wijze van gebruik: Oraal gebruik.

Om de meest nauwkeurige dosering te garanderen, moet de keuze van de doseerspuit worden aangepast aan het lichaamsgewicht van het dier.

Vorgevulde doseerspuit voor orale toediening van 10 ml

Dosering:

PAARD:

Gewicht van paard	175 kg	350 kg	525 kg	700 kg
De hoeveelheid van het diergeneesmiddel				
Voor milde sedatie, (0,1-0,2 mg acepromazine/kg)	0,5-1,0 ml	1,0-2,0 ml	1,5-3,0 ml	2,0-4,0 ml

lichaamsgewicht)				
Voor gemiddelde sedatie, (0,3-0,4 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht)	1,5-2,0 ml	3,0-4,0 ml	4,5-6,0 ml	6,0-8,0 ml

Voor premedicatie gelden dezelfde doseringen als voor sedatie. Na toediening van acepromazine is de hoeveelheid anestheticum die nodig is om anesthesie te induceren aanzienlijk verminderd.

HOND:

Gewicht van hond De hoeveelheid van het diergeneesmiddel	17,5 kg	35 kg	52,5 kg	70 kg
Voor milde sedatie (1,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht)	0,5 ml	1,0 ml	1,5 ml	2,0 ml
Voor gemiddelde sedatie (2,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht)	1,0 ml	2,0 ml	3,0 ml	4,0 ml
Voor premedicatie bij verdooving (3,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht)	1,5 ml	3,0 ml	4,5 ml	6,0 ml

De dosis wordt bepaald door de ring op de juiste zuigermarkering te plaatsen. Verplaats de gegroefde doseerring op de zuiger zodat de onderkant van de ring is uitgelijnd met de markering voor de gewenste dosis. De dosis gel kan worden aangepast op 0,5 ml.

Vorgevulde doseerspuit voor orale toediening van 1 ml

HOND:

Gewicht van hond De hoeveelheid van het diergeneesmiddel	5 kg	10 kg	15 kg	17,5 kg	20 kg	25 kg	30 kg	35 kg
Voor milde sedatie (1,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht)	0,15 ml	0,30 ml	0,45 ml	0,50 ml	0,60 ml	0,75 ml	0,90 ml	1,0 ml
Voor gemiddelde sedatie (2,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht)	0,3 ml	0,6 ml	0,9 ml	1,0 ml	-	-	-	-

Voor premedicatie bij verdoving (3,0 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht)	0,45 ml	0,9 ml	-	-	-	-	-	-
--	---------	--------	---	---	---	---	---	---

PAARD:

Gewicht van paard De hoeveelheid van het diergeneesmiddel	100 kg	125 kg	150 kg	175 kg
Voor milde sedatie (0,1-0,2 mg acepromazine/kg lichaamsgewicht)	0,30-0,60 ml	0,35-0,70 ml	0,40-0,85 ml	0,50-1,00 ml

Doseerspuit met 1 ml gel maakt dosering mogelijk, met name voor kleine hondenrassen. De gel wordt afgevuld in een afsluitbare doseerspuit van 1 ml, en de dosis gel kan worden aangepast op 0,05 ml.

De bovenstaande doseringsinformatie is bedoeld als richtlijn en moet worden aangepast aan elke patiënt, rekening houdend met de verschillende factoren (bijv. temperament, ras, nervositeit, enz.) die de gevoeligheid voor sedativa kunnen beïnvloeden.

Om een nauwkeurige dosering te garanderen, dient het lichaamsgewicht van het te behandelen dier voorafgaand aan de dosering te worden bepaald.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Verwijder de dop van de doseerspuit, steek deze in de bek van het dier en breng de gel aan op de wangzak van het paard of op de tongwortel van de hond. Til na het aanbrengen de kop van het dier onmiddellijk enkele seconden op en controleer of het dier de dosis heeft doorgeslikt.

10. WACHTTIJD(EN)

Paarden: Niet gebruiken bij paarden waarvan het vlees, slachtafval en melk bestemd zijn voor menselijke consumptie.

De behandeling moet worden vastgelegd in het paspoort van het paard.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Houd de voorgevulde doseerspuit voor orale toediening zorgvuldig gesloten.

Bescherm tegen bevriezing.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de verpakking. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:

Het effect van acepromazine na orale toediening treedt op binnen 30-60 minuten bij grote dieren en binnen 15-25 minuten bij kleine dieren. De werkingsduur is gemiddeld 4 uur, afhankelijk van de mate van de sedatie en de individuele reactie van het dier.

Het verhogen van de dosering boven de aanbevolen dosering resulteert in verlengde werking en bijwerkingen, maar geen diepere sedatie.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

Dit diergeneesmiddel moet met voorzichtigheid en met een verlaagde dosering worden gebruikt in het geval van leverziekte of bij verzwakte dieren.

Acepromazine heeft verwaarloosbare analgetische effecten. Pijnlijke activiteiten moeten worden vermeden bij het hanteren van verdoofde dieren, tenzij ze zijn behandeld met geschikte pijnstillers.

Na toediening van het diergeneesmiddel dienen de dieren op een rustige plaats te worden gehouden en dienen sensorische prikkels zoveel mogelijk te worden vermeden.

Paarden:

Tijdens sedatie zijn paarden gevoelig voor algemene auditieve en visuele prikkels, waardoor luidruchtige en snelle bewegingen ontwaking uit de sedatietoestand kunnen veroorzaken. Na toediening van het diergeneesmiddel mogen paarden 36 uur niet worden gebruikt om te werken.

Bij hengsten is het laagste doseringsbereik geïndiceerd om het risico op prolaps van de penis te minimaliseren (zie ook rubriek 4.6).

Gebruik van het diergeneesmiddel bij paarden met een lichaamsgewicht van minder dan 100 kg moet gebaseerd zijn op een zorgvuldige afweging van de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Wedstrijd- en renpaarden moeten worden behandeld volgens de geldende plaatselijke voorschriften. Er moeten speciale voorzorgsmaatregelen worden genomen voor deze paarden om de naleving van de wedstrijdregels te verzekeren. Bij twijfel is het raadzaam om de urine te analyseren. Metabolieten kunnen worden gedetecteerd als verboden stoffen.

Honden:

Bij honden met de ABCB1-1Δ-mutatie (ook wel MDR1 genoemd), heeft acepromazine de neiging om een diepere en langdurigere sedatie te veroorzaken. Bij deze honden moet de dosis met 25%-50% worden verlaagd. Bij sommige honden, vooral boxers en andere kortsnuitige rassen, kan spontaan flauwvallen of syncope optreden, daarom is het raadzaam om een lage dosis toe te passen.

Er is opgemerkt dat grote hondenrassen bijzonder gevoelig zijn voor acepromazine, en bij deze rassen moet de laagst mogelijke dosis worden gebruikt.

Acepromazine moet met voorzichtigheid worden gebruikt als middel agressieve honden in bedwang te houden, omdat het dier hierdoor vatbaarder kan worden voor schrikken en eerder kan reageren op geluiden of andere sensorische input.

Gebruik van dit diergeneesmiddel bij honden met een lichaamsgewicht van minder dan 17,5 kg moet gebaseerd zijn op een zorgvuldige afweging van de baten/risicobeoordeling door de behandelend dierenarts.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:

Acepromazine kan sedatie veroorzaken.

Zorg ervoor dat u het niet per ongeluk inslikt. Om onbedoelde inname door een kind te voorkomen, de dop onmiddellijk na gebruik terugplaatsen en de geopende doseerspuit in de gesloten originele buitenverpakking bewaren wanneer deze niet in gebruik is. Voor een goede sluiting moet u bij een verpakking van 10 ml een “klik” horen. Bij een verpakking van 1 ml dient u de dop er goed op te schroeven. Bewaar de verpakking altijd buiten het zicht en bereik van kinderen. In geval van accidentele ingestie dient onmiddellijk een arts te worden geraadpleegd en de bijsluiter of het etiket te worden getoond, maar NIET RIJDEN aangezien sedatie en veranderingen in de bloeddruk kunnen optreden.

Dit diergeneesmiddel kan allergische reacties veroorzaken en kan licht irriterend zijn voor ogen en huid. Personen met een bekende overgevoeligheid voor acepromazine of andere fenothiazinen of voor

één van de hulpstoffen moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden. Personen met een gevoelige huid of die veelvuldig in contact komen met het diergeneesmiddel wordt aangeraden ondoordringbare handschoenen te dragen. Vermijd accidenteel contact met ogen en slijmvliezen. In geval van accidenteel contact met de ogen of de slijmvliezen, het aangetaste gebied gedurende 15 minuten met stromend water spoelen. Bij aanhoudende irritatie dient u een arts te raadplegen en de bijsluiter of het etiket aan een arts te tonen.

Na gebruik handen en blootgestelde huid grondig wassen.

Dracht en lactatie:

De veiligheid van dit diergeneesmiddel tijdens dracht en lactatie is niet onderzocht bij de doeldiersoorten. Uitsluitend gebruiken volgens de baten-risicobeoordeling door de behandelend dierenarts. Zie ook rubriek 4.6 met betrekking tot vruchtbaarheidsstoornissen bij merries.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:

Acepromazine versterkt de werking van centraal onderdrukkende geneesmiddelen.

Gelijktijdige toediening met organische esters van fosforzuur (antiparasitica zoals chloorfenvinfos, dichloorfos, enz.) of procaïnehydrochloride (een lokaal anestheticum) verhoogt de toxiciteit en moet daarom worden vermeden.

Acepromazine vermindert de sympathische tonus, daarom mag het niet gelijktijdig worden toegediend met bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

Antacida kunnen na orale toediening een afname van de gastro-intestinale absorptie van acepromazine veroorzaken.

Opiaten en adrenaline kunnen de hypotensieve effecten van acepromazine versterken.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Overdosering leidt tot een eerder optreden van de sedatieve symptomen en een langdurig effect. Toxische effecten zijn ataxie, hypotensie, hypothermie en (extrapiramidale) effecten op het centrale zenuwstelsel.

Noradrenaline, maar geen adrenaline, kan worden gebruikt om de cardiovasculaire effecten tegen te gaan.

Onverenigbaarheden:

Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEEL AFVALMATERIAAL

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

September 2022

15. OVERIGE INFORMATIE

Verpakkingsgrootten:

Kartonnen doos met 1 voorgevulde doseerspuit voor orale toediening van 10 ml.

Kartonnen doos met 1 voorgevulde doseerspuit voor orale toediening van 1 ml.

Het is mogelijk dat niet alle verpakkingsgrootte in de handel worden gebracht.

BE-V660590 (PP doseerspuit)

BE-V660591 (HDPE doseerspuit)

Op diergeneeskundig voorschrift