

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 5 viales de liofilizado + 5 viales de disolvente

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

PG 600 MONODOSIS (200 UI/400 UI) liofilizado y disolvente para solución inyectable

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada vial de liofilizado contiene:

Gonadotropina coriónica (HCG) .....200 UI  
Gonadotropina sérica equina (PMSG).....400 UI

Cada ml de solución reconstituida contiene:

Gonadotropina coriónica (HCG). ....40 UI  
Gonadotropina sérica equina (PMSG).....80 UI

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

5 viales con 1 dosis de liofilizado + 5 viales con 5 ml de disolvente

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino (cerdas adultas y cerdas nulíparas).

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía de administración: subcutánea o intramuscular, en la base de la oreja.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:  
Carne: Cero días.

### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.  
Una vez reconstituido, utilizar antes de 24 horas...

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| <b>9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN</b> |
|---------------------------------------------------|

Conservar en nevera.  
Conservar los viales en el embalaje exterior con objeto de protegerlos de la luz.  
Tras la reconstitución, conservar en nevera.

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”</b> |
|------------------------------------------------------------|

Lea el prospecto antes de usar.

|                                         |
|-----------------------------------------|
| <b>11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”</b> |
|-----------------------------------------|

Uso veterinario.

|                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN</b> |
|----------------------------------------------------------------------|

Merck Sharp & Dohme Animal Health, S.L.

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| <b>14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN</b> |
|-----------------------------------------------------------|

2843 ESP

|                           |
|---------------------------|
| <b>15. NÚMERO DE LOTE</b> |
|---------------------------|

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

**Etiqueta: vial de liofilizado**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

PG 600 MONODOSIS (200 UI/400 UI) liofilizado y disolvente para solución inyectable

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Gonadotropina coriónica (HCG) .....200 UI

Gonadotropina sérica equina (PMSG).....400 UI

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

Una vez reconstituido, utilizar antes de 24 horas. .

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

**Etiqueta: vial de disolvente**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Disolvente para PG 600 MONODOSIS (200 UI/400 UI) liofilizado y disolvente para solución inyectable

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto: uso inmediato.

Una vez reconstituido, utilizar antes de 24 horas.