

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

KENNZEICHNUNG

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSSEN

Etikett für 10-ml- oder 20-ml-Durchstechflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Veterelin

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Buserelin0,004 mg/ml
(entspricht 0,0042 mg Buserelinacetat)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/ JJJJ}
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton für eine 10 ml Durchstechflasche
Karton für eine 20 ml Durchstechflasche
Karton für 5 x 10 ml Durchstechflaschen

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Veterelin 0,004 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Wirkstoff:

Buserelin0,004 mg/ml
(entspricht 0,0042 mg Buserelinacetat)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml
20 ml
5 x 10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (Kuh), Pferd (Stute), Schwein (Sau und Jungsau) und Kaninchen
(weiblich, zur Zucht).

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Rind, Pferd und Kaninchen: Vorzugsweise intramuskuläre Anwendung, aber eine intravenöse oder subkutane Anwendung ist auch möglich.

Schwein: Vorzugsweise intramuskuläre Anwendung, aber eine intravenöse Anwendung ist auch möglich.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. (MM/ JJJJ)

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 8 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25°C lagern.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS CALIER S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

AT: 8-00975

BE: BE-V395577

DE: 401465.00.00

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}