

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ubroseal blue Dry Cow 2,6 g, intramaminė suspensija galvijams

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename 4 g intramaminiam švirkšte yra:

Veiklioji medžiaga:

sunkiojo bismuto subnitrato

2,6 g;

pagalbinės medžiagos:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis	Kiekybinė sudėtis, jei ta informacija būtina siekiant tinkamai naudoti veterinarinį vaistą
Skystasis parafinas	
Aliuminio distearatas / tristearatas	
Koloidinis silicio dioksidas, bevandenis	
Indigokarmino aliuminio kraplakas E132	0,02 g

Mėlynos spalvos intramaminė suspensija.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu).

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Apsaugoti nuo naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu.

Karvėms, kurios tikėtina neserga subklinikiniu mastitu, veterinarinį vaistą galima naudoti užtrūkusių karvių priežiūrai ir mastito kontrolei.

Karvių, kurios bus gydomos šiuo veterinariniu vaistu, atranka turi būti vykdoma remiantis veterinariniu klinikiniu vertinimu. Atrankos kriterijai gali būti paremti pavienių karvių sergamumo mastitu ir ląstelių skaičiaus istorija arba pripažintais subklinikinio mastito tyrimais ar bakteriologinių mėginių tyrimais.

3.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti karvėms laktacijos metu. Žr. 3.7 p. Karvėms, kurioms užtrūkinimo metu nustatytas subklinikinis mastitas, veterinarinio vaisto vieno naudoti negalima. Negalima naudoti karvėms, kurioms užtrūkinimo metu nustatytas klinikinis mastitas. Negalima naudoti esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

3.4. Specialieji įspėjimai

Nėra.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims

Pagal gerą klinikinę praktiką reikia reguliariai stebėti užtrūkusias karves, ar nėra klinikinio mastito požymių. Jei veterinariniu vaistu užkimštame ketvirtyje išsivysto klinikinis mastitas, prieš pradedant tinkamą gydymą, paveiktą ketvirtį reikia išmelžti rankomis. Užteršimo pavojui sumažinti švirkšto negalima merkti į vandenį. Švirkštą naudoti tik vieną kartą. Naudojant veterinarinį vaistą, svarbu griežtai laikytis aseptikos reikalavimų, kadangi šis veterinarinis vaistas neturi antimikrobinių savybių. Po šio veterinarinio vaisto naudojimo negalima naudoti jokio kito intramaminio veterinarinio vaisto. Karvėms, kurios gali sirgti subklinikiniu mastitu, ši veterinarinį vaistą galima naudoti prieš tai pažeistam tešmens ketvirčiui gydyti naudojant užtrūkusioms karvėms tinkamus antibiotikus.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems veterinarinį vaistą gyvūnams

Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.

Kartu su intramaminio veterinariniu vaistu tiekiamose dezinfekcinėse servetėlėse yra izopropilo alkoholio. Jei žinoma ar įtariama, kad dėl izopropilo alkoholio pasireikš odos sudirginimas, reikia užsimauti apsaugines pirštines. Reikia vengti kontakto su akimis, nes izopropilo alkoholis gali sukelti akių sudirginimą.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujamos reakcijos

Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu):

Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	Ūminis mastitas ¹
---	------------------------------

¹visų pirma dėl netinkamos švirkštimo technikos ir higienos stokos. Apie aseptikos reikalavimų laikymosi svarbą žr. 3.5 ir 3.9 skyriuose.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba jo vietiniam atstovui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą.

Atitinkamus kontaktinius duomenis žiūrėkite pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumas

Galima naudoti vaikingumo metu. Apsiveršėdavus veterinarinio vaisto kamštį gali praryti veršelis. Veterinarinio vaisto nurijimas veršeliui yra saugus ir nesukelia jokio nepalankaus poveikio.

Laktacija

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti laktacijos metu. Atsitiktinai panaudojus karvei laktacijos metu, galima pastebėti nedidelį (iki 2 kartų) laikiną somatinių ląstelių skaičiaus padidėjimą. Tokiu atveju veterinarinio vaisto kamštį reikia išmelžti rankomis, jokių papildomų atsargumo priemonių taikyti nereikia.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudoti tik į tešmenį.

Vieno švirkšto su veterinariniu vaistu turinį sušvirkšti į kiekvieną tešmens ketvirtį iš karto po paskutinio laktacijos periodo melžimo (užtrūkinimo metu). Po veterinarinio vaisto sušvirkštimo spenio ar tešmens masažuoti negalima.

Norint sumažinti mastito atsiradimo po veterinarinio vaisto sušvirkštimo riziką, švirkšti reikia apdairiai, kad į spenį nepatektų patogeninių mikroorganizmų.

Svarbu kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti spenį chirurginiu spiritu arba alkoholiu impregnuotomis dezinfekcinėmis servetėlėmis. Speniai turi būti valomi, kol ant dezinfekcinių servetelių nesimatys nešvarumų. Prieš sušvirkščiant veterinarinį vaistą, reikia palaukti, kol speniai apdžius. Sušvirkšti reikia laikantis aseptikos reikalavimų ir stengtis neužteršti švirkšto galiuko. Po švirkštimo rekomenduojama naudoti tinkamą spenių mirkalą arba purškalą.

Esant žemai temperatūrai, veterinarinį vaistą galima pašildyti šiltoje aplinkoje iki kambario temperatūros, kad būtų lengviau sušvirkšti.

3.10. Perdozavimo simptomai (pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Karvėms skyrus dvigubai didesnę nei rekomenduojama veterinarinio vaisto dozę, jokio nepalankaus poveikio nepasireiškė.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

Skerdienai ir subproduktams – 0 parų.

Pienui – 0 val.

4. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas:

QG52X.

4.2. Farmakodinamika

Sušvirkštus veterinarinį vaistą į kiekvieną tešmens ketvirtį, sukuriamas fizinis barjeras, saugantis

nuo bakterijų patekimo, todėl sumažėja naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu dažnumas.

4.3. Farmakokinetika

Bismuto subnitratas neabsorbuojamas iš pieno liaukų, tačiau veikia kaip kamštis spenyje, kol nepašalinamas fiziškai (įrodyta su karvėmis, kurių užtrūkimo laikotarpis truko iki 100 dienų).

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Netaikoma.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

4 g polietileninis intramaminis švirkštas su stūmokliu ir polietileniniu dviejų dalių dangteliu.

Kartoninė dėžutė su 20 švirkštų ir 20 dezinfekcinių servetėlių.
Polietileninis kibirėlis su 60 švirkštų ir 60 dezinfekcinių servetėlių.
Polietileninis kibirėlis su 120 švirkštų ir 120 dezinfekcinių servetėlių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.
Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Univet Ltd

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/17/2435/001-003

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2017-12-20

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2023-11-27

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS

ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

A. ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**Kartoninė dėžutė arba polietileninis kibirėlis****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Ubroseal blue Dry Cow 2,6 g, intramaminė suspensija

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

Kiekviename 4 g intramaminiam švirkšte yra 2,6 g sunkiojo bismuto subnitrato.

3. PAKUOTĖS DYDIS

20 x 4 g
60 x 4 g
120 x 4 g

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu).

5. INDIKACIJA (-OS)**6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**

Naudoti tik į tešmenį.

7. IŠLAUKA**Išlauka:**

skerdienai ir subproduktams – 0 parų,
pienui – 0 val.

8. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Registruotojas:

{„Univet“ įmonės logotipas}

Vietinis atstovas:

{„Boehringer Ingelheim“ įmonės logotipas}

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/17/2435/001

LT/2/17/2435/002

LT/2/17/2435/003

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

Užpildytas mažo tankio polietileno švirkštas su lygiu, smailėjančiu hermetiškai užsandarintu antgaliu.

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ubroseal blue Dry Cow

2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJA

Bismuto subnitratas, sunkusis 2,6 g/4 g

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp. {mėnuo/metai}

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

Ubroseal blue Dry Cow 2,6 g, intramaminė suspensija galvijams

2. Sudėtis

Kiekviename 4 g intramaminiam švirkšte yra:

veiklioji medžiaga:

sunkiojo bismuto subnitrato 2,6 g;

pagalbinė medžiaga

Indigokarmino aliuminio kraplakas E132 0,02 g

Mėlynos spalvos intramaminė suspensija.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Galvijai (pieninės karvės užtrūkinimo metu).

4. Naudojimo indikacijos

Veterinarinis vaistas yra skirtas apsaugoti nuo naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu.

Karvėms, kurios tikėtina neserga subklinikiu mastitu, veterinarinį vaistą galima naudoti užtrūkusių karvių priežiūrai ir mastito kontrolei. Karvių, kurios bus gydomos šiuo veterinariniu vaistu, atranka turi būti vykdoma remiantis veterinariniu klinikiu vertinimu. Atrankos kriterijai gali būti paremti pavienių karvių sergamumo mastitu ir ląstelių skaičiaus istorija arba pripažintais subklinikinio mastito tyrimais ar bakteriologinių mėginių tyrimais.

5. Kontraindikacijos

Negalima naudoti karvėms laktacijos metu.

Karvėms, kurioms užtrūkinimo metu nustatytas subklinikinis mastitas, veterinarinio vaisto vieno naudoti negalima.

Negalima naudoti karvėms, kurioms užtrūkinimo metu nustatytas klinikinis mastitas.

Negalima naudoti esant žinomam padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

6. Specialieji įspėjimai

Nėra.

Specialiosios atsargumo priemonės, siekiant užtikrinti saugų naudojimą paskirties rūšių gyvūnams

Pagal gerą klinikinę praktiką reikia reguliariai stebėti užtrūkusias karves, ar nėra klinikinio mastito požymių. Jei veterinariniu vaistu užkimštame ketvirtyje išsivysto klinikinis mastitas, prieš pradėdant tinkamą gydymą, paveiktą ketvirtį reikia išmelžti rankomis. Užteršimo pavojui

sumažinti švirkšto negalima merkti į vandenį. Švirkštą naudoti tik vieną kartą. Naudojant veterinarinį vaistą, svarbu griežtai laikytis aseptikos reikalavimų, kadangi šis veterinarinis vaistas neturi antimikrobinių savybių. Po šio veterinarinio vaisto naudojimo negalima naudoti jokio kito intramaminio veterinarinio vaisto. Karvėms, kurios gali sirgti subklinikinio mastitu, ši veterinarinį vaistą galima naudoti prieš tai pažeistam tešmens ketvirčiui gydyti naudojant užtrūkusioms karvėms tinkamus antibiotikus.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems veterinarinį vaistą gyvūnams

Po naudojimo reikia nusiplauti rankas.

Kartu su intramaminio veterinarinio vaistu tiekiamose dezinfekcinės servetėlėse yra izopropilo alkoholio. Jei žinoma ar įtariama, kad dėl izopropilo alkoholio pasireikš odos sudirginimas, reikia užsimauti apsaugines pirštines. Reikia vengti kontakto su akimis, nes izopropilo alkoholis gali sukelti akių sudirginimą.

Vaikingumas ir laktacija

Galima naudoti vaikingumo metu. Apsiveršiačius veterinarinio vaisto kamštį gali praryti veršelis. Veterinarinio vaisto nurijimas veršeliui yra saugus ir nesukelia jokio nepalankaus poveikio. Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti laktacijos metu. Atsitiktinai panaudojus karvei laktacijos metu, galima pastebėti nedidelį (iki 2 kartų) laikiną somatinių ląstelių skaičiaus padidėjimą. Tokiu atveju veterinarinio vaisto kamštį reikia išmelžti rankomis, jokių papildomų atsargumo priemonių taikyti nereikia.

Perdozavimas

Karvėms skyrus dvigubai didesnę nei rekomenduojama veterinarinio vaisto dozę, jokio nepalankaus poveikio nepasireiškė.

Pagrindiniai nesuderinamumai

Netaikoma.

7. Nepageidaujamos reakcijos

Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	Ūminis mastitas ¹
---	------------------------------

¹visų pirma dėl netinkamos švirkštimo technikos ir higienos stokos. Apie aseptikos reikalavimų laikymosi svarbą žr. skyriuose „Specialieji įspėjimai“ ir „Nuorodos dėl tinkamo naudojimo“..

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamas reakcijas. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad veterinarinis vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokias nepageidaujamas reakcijas taip pat galite pranešti registruotojui arba vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą: www.vmv.lt

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Naudoti tik į tešmenį.

Vieno švirkšto su veterinariniu vaistu turinį sušvirkšti į kiekvieną tešmens ketvirtį iš karto po paskutinio laktacijos periodo melžimo (užtrūkinimo metu). Po veterinarinio vaisto sušvirkštimo spenio ar tešmens masažuoti negalima.

Norint sumažinti mastito atsiradimo po veterinarinio vaisto sušvirkštimo riziką, švirkšti reikia apdairiai, kad į spenį nepatektų patogeninių mikroorganizmų.

Svarbu kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti spenį chirurginiu spiritu arba alkoholiu impregnuotomis dezinfekcinėmis servetėlėmis. Speniai turi būti valomi, kol ant dezinfekcinių servetėlių nesimatys nešvarumų. Prieš sušvirkščiant veterinarinį vaistą, reikia palaukti, kol speniai apdžius. Sušvirkšti reikia laikantis aseptikos reikalavimų ir stengtis neužteršti švirkšto galiuko. Po švirkštimo rekomenduojama naudoti tinkamą spenių mirkalą arba purškalą.

Esant žemai temperatūrai, veterinarinį vaistą galima pašildyti šiltoje aplinkoje iki kambario temperatūros, kad būtų lengviau sušvirkšti.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Nuoroda gyvūnų laikytojams:

svarbu prieš naudojant šį veterinarinį vaistą perskaityti nurodymus. Itin svarbu naudojant veterinarinį vaistą užtikrinti švarą, kad sumažėtų galimai mirtino mastito po sušvirkštimo pavojus. Visi patarimai dėl spenių valymo prieš švirkščiant veterinarinį vaistą yra nurodyti naudojimo rekomendacijose ir jų reikia laikytis.

Naudojimas:

Reikia būti atsargiems, kad į spenį nepatektų patogeninių mikroorganizmų. Šiam veterinariniam vaistui sušvirkšti svarbu griežtai laikytis aseptikos reikalavimų, kadangi šis veterinarinis vaistas neturi antimikrobinių savybių. Nesilaikant šių rekomendacijų, gali pasireikšti sunkus mastitas po sušvirkštimo arba netgi ištikti mirtis.

1. Prieš sušvirkščiant veterinarinį vaistą, visus spenius reikia kruopščiai nuvalyti ir dezinfekuoti. Kiekvienam gyvuliui gydyti turi būti skirta pakankamai laiko, tai neturi būti derinama su kita gyvulininkystės veikla.
2. Gyvuliai turi būti tinkamai suvaržyti higieniškomis sąlygomis. Švirkštai turi būti švarūs, NEGALIMA jų merkti į vandenį.
3. Kiekvienai karvei gydyti naudoti atskirą švarių vienkartinį pirštinių porą.
4. Pradėti reikia nuo vizualiai švaraus ir sauso spenio ir tešmens. Jei speniai akivaizdžiai nešvarūs, nešvarumus nuo jų nuvalyti reikia tik drėgnomis vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis ir kruopščiai nusausti. Spenius dezinfekuoti greitai veikiančiu spenių mirkymui skirtu dezinfekciniu tirpalu, palaukti 30 sekundžių, tada kiekvieną spenį visiškai nusausti atskiromis vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis. Išmelžti likusį pieną į melžimo puodelį ir išmesti.
5. Kruopščiai dezinfekuoti visą spenio paviršių spiritu / alkoholiu įmirkytais vienkartiniais tamponais. Tyrimais nustatyta, kad efektyviausia priemonė speniams valyti yra pačių pasigaminti tamponai iš švarios, sausos vatos, suvilgytos chirurginiu spiritu (ar tapačia medžiaga). Jei jų neturima, tada galima naudoti pridedamas sterilias servetėles. Pirmiausia reikia nuvalyti toliausiai nuo savęs esančius spenius, kad nebūtų užteršti nuvalyti.
6. Švelniai nuvalyti kiekvieną spenį nauju atskiru, vienkartinio spiritu / alkoholiu įmirkytu tamponu, kol spenio galas ir tamponas bus akivaizdžiai švarūs.
7. Neprieliečiant antgalio, reikia nuimti dangtelį nuo intramaminio švirkšto. Sušvirkšti švirkšto turinį į spenį, saugant spenio galą nuo užteršimo. Į spenius reikia švirkšti priešinga valymui seka, t. y. pirmiausia gydyti arčiausiai savęs esančius ketvirčius. Veterinarinio vaisto į tešmenį masažuoti negalima.
8. Sušvirkštus naudoti po melžimo naudoti skirtą spenių dezinfekavimo priemonę ir gydytas karves uždaryti į aptvarą, kur jos turėtų pastovėti bent 30 min., kad spenio kanalas užsidarys.

10. Išlauka

Skerdienai ir subproduktams – 0 parų.
Pienui – 0 val.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Negalima laikyti aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant dėžutės ir švirkšto etiketėje po Exp. Veterinarinis vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalinės surinkimo sistemos.

Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/17/2435/001-003

4 g polietileninis intramaminis švirkštas su stūmokliu ir polietileniniu dviejų dalių dangteliu.

Kartoninė dėžutė su 20 švirkštų ir 20 dezinfekcinių servetėlių.

Polietileninis kibirėlis su 60 švirkštų ir 60 dezinfekcinių servetėlių.

Polietileninis kibirėlis su 120 švirkštų ir 120 dezinfekcinių servetėlių.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2023-11-27

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Univet Ltd
Tullyvin
Cootehill
Co. Cavan
Airija

Vietiniai atstovai ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamą nepageidaujamą reakciją:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena
AHRCVAnimalHealthPV.AT@boehringer-ingelheim.com

17. Kita informacija

Sušvirkštus veterinarinį vaistą į kiekvieną tešmens ketvirtį, sukuriamas fizinis barjeras, saugantis nuo bakterijų patekimo, todėl sumažėja naujų intramaminių infekcijų užtrūkimo laikotarpiu dažnumas.

Didžioji dalis hermetiko pasišalina per pirmąjį melžimą, tačiau nedideli jo kiekiai gali būti kelias dienas matomi kaip dėmės ant filtro. Veterinarinį vaistą nuo mastito galima atskirti pagal tekstūrą ir spalvą. Karvėms skyrus dvigubai didesnę nei rekomenduojama veterinarinio vaisto dozę, jokie nepalankaus poveikio nepasireiškė. Esant žemai temperatūrai, veterinarinį vaistą galima pašildyti šiltoje aplinkoje iki kambario temperatūros, kad būtų lengviau sušvirkšti.

Po veršiavimosi rekomenduojama atlikti toliau nurodytus veiksmingus veterinarinio vaisto pašalinimo veiksmus, kad kuo mažiau veterinarinio vaisto likučių patektų į melžimo aparatą. Melžimo aparato negalima naudoti veterinariniam vaistui iš spenių pašalinti.

1. Prieš pirmąjį melžimą spenį reikia užspausti ties pagrindu ir ketvirtį reikia išspausti 10–12 kartų.
2. Reikia nuvalyti priešpienį ir patikrinti pirmųjų kelių melžimų metu, ar nelikę likučių.
3. Po kiekvieno melžimo reikia patikrinti mastito filtrus ir melžimo kojine, ar nėra likučių.