

## **B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ**

**ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:  
HIPRAVIAR – CLON**

Εμβόλιο μειωμένης λοιμογόνου δύναμης σε λυοφιλοποιημένη μορφή

**1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παρασκευαστής υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων:  
LABORATORIOS HIPRA S.A.

Avda. la Selva 135

Amer (Girona)

ΙΣΠΑΝΙΑ

**2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

HIPRAVIAR – CLON

**3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ**

Σύνθεση ανά δόση (0,03 ml ) του εμβολίου :

**Δραστικό συστατικό:**

Ιός της νόσου του Newcastle, κλώνος CL/79 . . . . .  $\geq 10^{6,5}$  EID<sub>50</sub>

**4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Πρόληψη της νόσου του Newcastle (ψευδοπανόλους)

**5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Καμία.

**6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Δεν έχουν παρατηρηθεί.

Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ακόμα και αν δεν αναφέρεται στο εσώκλειστο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης ή αμφιβάλετε για την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.

## **7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Πτηνά.

## **8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Οφθαλμορρινική ενστάλαξη:

Όταν το λυοφιλοποιημένο υλικό διαλυθεί με τον συνοδευτικό διαλύτη (απεσταγμένο νερό 38 mL), χορηγείστε μία σταγόνα (περίπου 0,038 mL) ανά πτηνό στα μάτια ή στους ρώθωνες χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο δοσιμετρικό ενσταλάκτη.

Χορήγηση από το στόμα:

Διαλύστε το λυοφιλοποιημένο υλικό με τον εσώκλειστο διαλύτη μέχρι το μισό του φιαλιδίου, ανακινείστε και ρίξτε το σε φρέσκο πόσιμο νερό για κατανάλωση από ½ μέχρι 1 ώρα το περισσότερο.

| Ηλικία πτηνών   | Ποσότητα νερού για 1000 πτηνά |
|-----------------|-------------------------------|
| 1-3 εβδομάδες   | 5-10 λίτρα                    |
| 4-9 εβδομάδες   | 12-23 λίτρα                   |
| 10-16 εβδομάδες | 27-37 λίτρα                   |

Χορήγηση με εκνέφωση (ψεκασμός): Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο διάλυμα και εξοπλισμό για κάθε εμβολιασμό.

## **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

- Ελέγχετε την ημερομηνία λήξεως.
- Να αναμιγνύεται το λυοφιλοποιημένο υλικό με τον διαλύτη.
- Να το χρησιμοποιείται μόνο με αποστειρωμένα υλικά.
- Εάν χορηγηθεί από το στόμα, χρησιμοποιήστε μόνον πόσιμο νερό.
- Σιγουρευτείτε ότι τα πτηνά λαμβάνουν τουλάχιστον μία δόση.

## **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: Μηδέν ημέρες.

## **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

Να φυλάσσεται και να μεταφέρεται σε ψυγείο (2 °C – 8 °C)

Να φυλάσσεται προστατευμένο από το φως.

## **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Ειδική προειδοποίηση(εις) για κάθε είδος ζώου:

Να εμβολιάζονται μόνο υγιή ζώα.

**13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ**

Τα φάρμακα δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω των λυμάτων ή των οικιακών αποβλήτων. Συμβουλευθείτε τον κτηνίατρό σας τον φαρμακοποιό σας για τον τρόπο απόρριψης των χρησιμοποιηθέντων φαρμάκων. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος.

**14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

<DD/MM/YYYY>

**15. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Συσκευασίες:

Κουτί με 5 φιαλίδια των 1000 δόσεων

Κουτί με 10 Φιαλίδια των 2500 δόσεων.

Κουτί με 10 Φιαλίδια των 5000 δόσεων.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:

HIPRA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

Τηλ: 210 4978660