

NAVODILO ZA UPORABO

LAKSANS 500 g peroralni prašek

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROŠČANJE SERIJ V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom:

GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

Izdelovalec, odgovoren za sproščanje serij:

GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Hrvaška

2. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LAKSANS 500 g peroralni prašek
magnezijev sulfat heptahidrat

3. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SESTAVIN

1 vrečka peroralnega praška vsebuje:

Zdravilna učinkovina:

magnezijev sulfat heptahidrat 500 g

Pomožne snovi:

Jih ni.

Laksans je bel kristalni prašek ali bleščeči brezbarvni kristali.

4. INDIKACIJE

Zaprte, zastrupitev z rastlinskimi ali kemičnimi strupi, prenažrtost, pomožno zdravljenje pred dajanjem nekaterih antihelmintikov in po njem.

5. KONTRAINDIKACIJE

Laksans ne smemo dajati dehidriranim živalim in tistim, ki imajo ileus, perforacijo črevesja, toksični kolitis, megakolon ali so v šoku.

Solna odvajalna sredstva so kontraindicirana za dolgotrajno ali kronično uporabo.

6. NEŽELENI UČINKI

Včasih se lahko pojavijo blage količne bolečine, izguba tekočine in elektrolitov.

Če opazite neželene učinke tega zdravila, takoj obvestite pristojni organ za farmakovigilanco in imetnika dovoljenja za promet.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v teh navodilih za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konj, govedo, ovce, koze, prašiči.

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKÉ VRSTE TER POTI IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Laksans dajemo peroralno, raztopljen v mlačni vodi, mleku ali sluzi lanenega semena.

Konj, govedo

- Najpogosteje dajemo odmerek 500 g na žival, in sicer: konju po nosnoželodčni sondi, govedu pa s steklenico.

- Če je motorika črevesja pospešena ali upočasnjena (zaradi pokvarjene hrane, prenažrtosti idr.), damo konju od 250 do 500 g praška s sondo, govedu pa s steklenico od 500 do 1000 g praška, raztopljenega v 2 do 4 l vode ali sluzi; žrebetu in teletu od 3 do 5 velikih žlic praška, raztopljenega v 0,5 l vode ali mleka.

Ovca, koza

Od 2 do 5 velikih žlic praška, raztopljenega v 0,25 do 1 l vode.

Prašič

Od 1 do 5 velikih žlic praška, mlajšim prašičem ga damo v mleku ali primerni hrani, odraslim pa v 0,25 do 1 l mlačne vode ali redke sluzi.

Uravnavanje prebave

Pomešano s krmo: konju od 1 do 2, govedu od 2 do 3, ovci in kozi od 1/4 do 1 in prašiču od 1/2 do 2 veliki žlici praška.

9. NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Glejte poglavje 8.

10. KARENCA

Meso in organi: nič dni.

Mleko: nič dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Shranjujte na suhem mestu.

Neporabljeno vsebino, ki ostane v vrečki po prvem odmerjanju, je treba zavreči.

Rok uporabnosti zdravila v pakiranju za prodajo je označen na ovojnini (5 let).

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini po EXP.

12. POSEBNA OPOZORILA

Posebna opozorila za vsako živalsko vrsto:

Jih ni.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih:

Osmozna odvajala je treba previdno uporabljati pri živalih z okrnjenim ledvičnim delovanjem, okvarami srca in neravnovesjem elektrolitov.

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

Samo za živali.

Po uporabi si je treba umiti roke.

V primeru inhalacije zdravila pojdite na svež zrak in počivajte.

Če pride zdravilo v stik z očmi ga nekaj minut spirajte z vodo (če je mogoče, odstranite kontaktne leče) in v primeru draženja obiščite zdravnika.

V primeru zaužitja sperite usta z vodo in za tem popijte veliko vode.

Brežost:

Ni podatkov o reproduktivni toksičnosti in mutagenosti.

Laktacija:

Uporaba zdravila pri molznicah lahko povzroči zmanjšanje količine mleka.

Medsebojno delovanje z drugimi zdravili in druge oblike interakcij:

Če dajemo Laksans sočasno s tetraciklini, zmanjšuje njihovo resorpcijo.

Preveliko odmerjanje (simptomi, nujni ukrepi, protistrupi):

Če se pojavijo znaki hipermagnezije, se daje furosemid za povečano izločanje presežka magnezija preko ledvic. Priporoča se dajanje kalcija za nevtralizacijo učinkov magnezija na centralni živčni sistem.

Inkompatibilnosti:

Niso znane.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Glede odstranjevanja zdravil, ki jih ne uporabljate več, se posvetujte z veterinarjem. Zdravilo odstranite na okolju prijazen način.

14. DATUM ZADNJE ODOBRITEV NAVODILA ZA UPORABO

26.1.2016

15. DRUGE INFORMACIJE

Delovanje

Koncentrirana raztopina magnezijevega sulfata (grenka sol), dana peroralno v velikih količinah, spremeni osmotske lastnosti v prebavilih, preprečuje resorpcijo iz črevesja, okrepi sekrecijo, refleksno spodbuja peristaltiko in tako pospešuje praznjenje črevesja. Pri zapeki zmehča vsebino črevesja tako, da vpija tekočino in omogoči refleksno praznitev črevesja. Laksativni učinek magnezijevega sulfata nastopi pri psih in mačkah v 2 do 3 urah, pri konjih v 3 do 12 urah in pri prežvekovalcih v 12 do 18 urah po dajanju. Magnezijev sulfat v majhnih odmerkih pospešuje želodčno in črevesno sekrecijo in deluje tudi kot stomatik.

Način izdaje zdravila

Brez recepta.

Oprema

Laksans peroralni prašek je pakiran v vrečke po 500 g.

Vsaka vrečka je v posamezni kartonski škatli.

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla: 500 g

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LAKSANS 500 g peroralni prašek
magnezijev sulfat heptahidrat

2. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI

1 vrečka peroralnega praška vsebuje:
Zdravilna učinkovina:
magnezijev sulfat heptahidrat 500 g

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralni prašek

4. VELIKOST PAKIRANJA

500g

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konj, govedo, ovce, koze, prašiči.

6. INDIKACIJE

/

7. NAČIN IN POTI UPORABE

Peroralna uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: nič dni.
Mleko: nič dni.

9. POSEBNO OPOZORILO, ČE JE POTREBNO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
Neporabljeno vsebino, ki ostane v vrečki po prvem odmerjanju, je treba zavreči.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Shranjujte na suhem mestu.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
--

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Brez Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Imetnik dovoljenja za promet: GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

NP/V/0184/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE
--

Lot: {Številka serije}

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Vrečka: 500 g

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LAKSANS 500 g peroralni prašek
magnezijev sulfat heptahidrat

2. NAVEDBA ZDRAVILNIH UČINKOVIN IN DRUGIH SNOVI

1 vrečka peroralnega praška vsebuje:
Zdravilna učinkovina:
magnezijev sulfat heptahidrat 500 g

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Peroralni prašek

4. VELIKOST PAKIRANJA

500g

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Konj, govedo, ovce, koze, prašiči.

6. INDIKACIJE

/

7. NAČIN IN POTI UPORABE

Peroralna uporaba.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: nič dni.
Mleko: nič dni.

9. POSEBNO OPOZORILO, ČE JE POTREBNO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
Neporabljeno vsebino, ki ostane v vrečki po prvem odmerjanju, je treba zavreči.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25 °C.
Shranjujte na suhem mestu.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO
--

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Brez Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM
--

Imetnik dovoljenja za promet: GENERA SI d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, Slovenija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

NP/V/0184/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE
--

Lot: {Številka serije}