

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG**

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****BAYCOX****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Baycox 2,5%**, 25 mg/ml Lösung zum Einnehmen

(Toltrazuril)

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml = 25 mg Toltrazuril

**3. DARREICHUNGSFORM**

Arzneimittel gegen Kokzidiose für den oralen Gebrauch in Trinkwasser.

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml

*oder*

1000 ml

*oder*

5000 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

für Huhn und Pute

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Arzneimittel gegen Kokzidiose für den oralen Gebrauch in Trinkwasser.

Dosierung: siehe Packungsbeilage.

<b>Doseertabel - Tableau des dosages - Dosierungstabelle</b>	
<b>L.G.-P.C.-K.G. 1000 dieren- animaux-Tiere</b>	<b>Baycox 1000 dieren- animaux-Tiere (ml per dag/par jour/pro Tag)</b>
140	39
170	48
190	53
220	62
250	70
280	78
310	87
340	95
380	106
420	118
460	129
500	140
540	151
590	165
640	179
690	193
740	207
780	218
850	238
910	255
950	266
1000	280
1100	308
1200	336
1300	364
1400	392
1500	420
1600	448
1700	476
1800	504
1900	532
2000	560
3000	840
4000	1120
5000	1400
6000	1680
7000	1960

## 8. WARTEZEIT(EN)

Huhn: 14 Tage.

Pute: 16 Tage.

Eier: Nicht bei Geflügel anwenden, die Eier für den menschlichen Verzehr erzeugen oder künftig erzeugen sollen. Nicht anwenden innerhalb von 6 Wochen vor Beginn der Legeperiode.

## 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

## 10. VERFALLDATUM

EXP:

## 11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Keine.

## 12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN,, SOWEIT ERFORDERLICH

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere Verschreibungspflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS " ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**

Bayer Animal Health GmbH  
51368 Leverkusen  
Deutschland

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V142694

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot:

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG****BAYCOX****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****Baycox 2,5%, 25 mg/ml Lösung zum Einnehmen**

(Toltrazuril)

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml = 25 mg Toltrazuril

**3. DARREICHUNGSFORM**

Arzneimittel gegen Kokzidiose für den oralen Gebrauch in Trinkwasser.

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml

*oder*

1000 ml

*oder*

5000 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

für Huhn und Pute

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)****7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Arzneimittel gegen Kokzidiose für den oralen Gebrauch in Trinkwasser.

Dosierung: siehe Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Huhn: 14 Tage.

Pute: 16 Tage.

Eier: Nicht bei Geflügel anwenden, die Eier für den menschlichen Verzehr erzeugen oder künftig erzeugen sollen. Nicht anwenden innerhalb von 6 Wochen vor Beginn der Legeperiode.

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

EXP:

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Keine.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOWEIT ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**Für Tiere  
Verschreibungspflichtig**14. KINDERWARNHINWEIS ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDERN AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS**Bayer Animal Health GmbH  
51368 Leverkusen  
Deutschland**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V142694

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot: