

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę o pojemności 100 ml

Pudełko tekturowe zawierające 1 fiolkę o pojemności 250 ml

Pudełko tekturowe zawierające 6 fiolek o pojemności 100 ml

Pudełko tekturowe zawierające 6 fiolek o pojemności 250 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Florfenis 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Florfenikol.....300 mg/ml

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

100 ml

250 ml

6 x 100 ml

6 x 250 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owce i świnie

5. WSKAZANIA LECZNICZE**6. DROGI PODANIA**

Do podania domięśniowego i podskórnego u bydła.

Do podania domięśniowego u owiec i świń.

7. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne

Bydło: Podanie i.m. (20 mg/kg masy ciała, dwa razy): 30 dni.

Podanie s.c. (40 mg/kg masy ciała, jeden raz): 44 dni.

Owce: 39 dni.

Świnie: 18 dni.

Mleko

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Nie stosować u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do:

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

Laboratorios Syva S.A.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

Nr pozwolenia: 3079/21

15. NUMER SERII

Lot

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Fiolka o pojemności 100 ml

Fiolka o pojemności 250 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Florfenis 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Florfenikol.....300 mg/ml

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło, owce i świnie

4. DROGI PODANIA

Do podania domięśniowego i podskórnego u bydła.

Do podania domięśniowego u owiec i świń.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okres karencji:

Tkanki jadalne

Bydło: Podanie i.m. (20 mg/kg masy ciała, dwa razy): 30 dni.

Podanie s.c. (40 mg/kg masy ciała, jeden raz): 44 dni.

Owce: 39 dni.

Świnie: 18 dni.

Mleko

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować u samic ciężarnych produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi.

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do:

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 28 dni.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać fiolkę w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Laboratorios Syva S.A.

9. NUMER SERII

Lot