

MÄRKNING**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN****KARTONG 50 ml, 100 ml eller 250 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN**

Wellicox 50 mg/ml, injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 50 mg flunixin, motsvarande 83 mg flunixinmeglumin

3. FÖRPACKNINGSTORLEK50 ml
100 ml
250 ml**4. DJURSLAG**

Nötkreatur, häst, svin.

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**Nötkreatur/svin: Intramuskulär användning
Nötkreatur/häst: Intravenös användning**7. KARENSTIDER**

Karenstider:

Nötkreatur:

Kött och slaktbiprodukter: 4 dygn (i.v. användning) / 31 dygn (i.m. användning).

Mjölk: 24 timmar (i.v. användning) / 36 timmar (i.m. användning).

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 24 dygn (i.m. användning).

Häst:

Kött och slaktbiprodukter: 5 dygn (i.v. användning).

Mjölk: Ej godkänt för användning till ston som producerar mjölk för humankonsumtion.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnandet av innerförpackningen.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING



14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr. 47614

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Etikett 50 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Wellicox



2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

Flunixin 50 mg/ml

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 28 dagar, senast ____/____/____.

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**Etikett 100 ml, 250 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Wellicox 50 mg/ml, injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

1 ml innehåller 50 mg flunixin, motsvarande 83 mg flunixinmeglumin

3. DJURSLAG

Nötkreatur, häst, svin.

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Nötkreatur/svin: i.m.

Nötkreatur/häst: i.v.

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstid:

Nötkreatur:

Kött och slaktbiprodukter: 4 dygn (i.v. användning) / 31 dygn (i.m. användning).

Mjolk: 24 timmar (i.v. användning) / 36 timmar (i.m. användning)

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 24 dygn (i.m. användning).

Häst:

Kött och slaktbiprodukter: 5 dygn (i.v. användning).

Mjolk: Ej godkänt för användning till ston som producerar mjolk för humankonsumtion.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 28 dagar, senast: __/__/__

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C efter första öppnandet av innerförpackningen.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING



9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}