

## ЕТИКЕТ

### ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Опаковка с 10 шприца

### 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

**Масти Вейксим**

Интрамамарна суспензия за приложение при крави

### 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ

10 g съдържат:

**Активни субстанции:**

$\alpha$ -Токоферол ацетат	120.00 mg
Ретинол палмитат	отговаря на 100.000 ME
Химотрипсин	2 400 FIP-E
Трипсин	240 FIP-E
Папаин	6 FIP-E

### 3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Интрамамарна суспензия

### 4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

10 x 10 g

### 5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Крави

### 6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

### 7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочети листовката.

### 8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

**Карентни срокове:**

Говеда:

Месо и вътрешни органи: Нула дни

Мляко: 1 ден

**9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО**

Преди употреба прочети листовката.

**10. СРОК НА ГОДНОСТ**

Годен до: {месец/година}

**11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ**

Да се съхранява в хладилник (2 °С – 8 °С).

**12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

Унищожаване: прочети листовката.

**13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО**

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

**14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

**15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА**

Veyx-Pharma GmbH  
34639 Schwarzenborn  
Söhreweg 6  
GERMANY

**16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП**

0022-1829

**17. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Партида: {номер}

**МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ  
МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА**

Шприц с 10 g суспензия

**1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

**Масти Вейксим**

Интраамарна суспензия за приложение при крави

**2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ**

10 g съдържат:

**Активни субстанции:**

α-Токоферол ацетат	120.00 mg
Ретинол палмитат	отговаря на 100.000 ME
Химотрипсин	2 400 FIP-E
Трипсин	240 FIP-E
Папаин	6 FIP-E

**3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ**

10 g

**4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

За интраамарно приложение

**5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

**Карентни срокове:**

Говеда:

Месо и вътрешни органи: Нула дни

Мляко: 1 ден

**6. ПАРТИДЕН НОМЕР**

Партида: {номер}

**7. СРОК НА ГОДНОСТ**

Годен до: {месец/година}

**8. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”**

Само за ветеринарномедицинска употреба

**Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ**  
*ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*

## ЛИСТОВКА:

### Масти Вейксим

Интраамарна суспензия за приложение при крави

#### **1. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ**

Притежател на лиценза за употреба и производител, отговорен за освобождаване на партидата:

Veyx-Pharma GmbH  
34639 Schwarzenborn  
Söhreweg 6  
GERMANY

#### **2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ**

**Масти Вейксим**

Интраамарна суспензия за приложение при крави

#### **3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТА(ИТЕ)**

10 g съдържат:

##### **Активни субстанции:**

α-Токоферол ацетат	120.00 mg
Ретинол палмитат	отговаря на 100.000 ME
Химотрипсин	2 400 FIP-E
Трипсин	240 FIP-E
Папаин	6 FIP-E

#### **4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**

Прилага се при неинфекциозни възпаления на вимето. Използва се като помощно лечение при инфекциозни остри, хронични и субклинични мастити към антибиотично лечение по антибиограма.

#### **5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Няма

#### **6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ**

В някои случаи продукти, които съдържат ензими (особено, ако бъдат инжектирани или вкарани във вимето), могат да предизвикат лесно или трудно забележими отоци. Тези отоци са безопасни и трябва да бъдат разглеждани като остра реакция на тъканта. След няколко дни те изчезват без усложнения.

Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар.

#### **7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП**

Крави

#### **8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН(И) НА ПРИЛАГАНЕ**

За интрамамарно приложение.

След пълно издождане на млякото и почистване и дезинфекция на вимето и върховете на папилите се впръсква съдържанието на 1 шприц във всяка засегната четвъртина на вимето.

Използват се 1 до 3 шприца в интервал от 12 часа.

Да се разклаща преди употреба.

#### **9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ**

Няма

#### **10. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ**

Говеда:

Месо и вътрешни органи: Нула дни

Мляко: 1 ден

#### **11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

Да се съхранява в хладилник (2 °C – 8 °C).

#### **12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**

Бременност и лактация:

Може да се прилага по време на бременност и лактация.

#### **13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА**

ВМП не трябва да бъдат изхвърляни чрез битови отпадъци или отпадни води.

Попитайте Вашия ветеринарен лекар или фармацевт какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда.

#### **14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА**

02/2023

**15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ>**

Опаковка с 1 шприц (полиетиленова спринцовка) с 10 g суспензия.  
Опаковка с 10 шприца (полиетиленови спринцовки) с по 10 g суспензия.  
Инжектор за вимето с капачка и запушалка от бял полиетилен.

Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара.

**Република България**  
Вейкс фарма- България  
BG София 1680  
Тел: + 359 2 9586176  
[veyx-bg@bgnet.bg](mailto:veyx-bg@bgnet.bg)

**Д-Р АНТОНИО РАДОЕВ**  
*ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР*