

BIJSLUITER

Poulvac P Canary

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie voor kanaries en vinken

1. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN EN DE FABRIKANT VERANTWOORDELIJK VOOR VRIJGIFTE, INDIEN VERSCHILLENDHouder van de vergunning voor het in de handel brengen:**Zoetis Belgium SA**

Rue Laid Burniat 1

B-1348 Louvain-la-Neuve

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.

Ctra. Camprodon s/n "la Riba"

17813 Vall de Bianya (Girona)

Spanje

2. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Poulvac P Canary

Lyofilisaat en oplosmiddel voor suspensie voor injectie voor kanaries en vinken

3. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

Per dosis:

Werkzaam bestanddeel:Canary Poxvirus, stam KP1 $\geq 10^{4.0}$ EID₅₀*

* Egg Infective Dosis

4. INDICATIE(S)

Voor de actieve immunisatie van gezonde kanaries en vinken (wildzang) tegen kanariepokken (hap- of snapziekte).

5. CONTRA-INDICATIE(S)

Niet gebruiken bij zieke dieren.

6. BIJWERKINGEN

Geen.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiters worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

7. DOELDIERSOORT(EN)

Kanaries en vinken.

8. DOSERING VOOR ELKE DOELDIERSOORT, TOEDIENINGSWEG(EN) EN WIJZE VAN GEBRUIK

Het vaccin dient volgens de WingWebmethode te worden toegediend.

Vanaf medio juni tot medio juli alle aanwezige kanaries éénmaal enten. Latere jongen moeten apart worden geënt, vanaf een leeftijd van 4 weken. Stress vóór en na de enting zoveel mogelijk vermijden. Een zeer zorgvuldige uitvoering van de entmethodiek is een voorwaarde voor een geslaagde enting.

9. AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING

Toebereiding entstof:

Open de beide flacons en zuig al de oplosvloeistof op in het bijgeleverde spuitje; breng dit over in het flesje gevriesdroogd vaccin. Om een goede oplossing te verkrijgen het spuitje een paar maal vullen en weer leegdrukken; daarbij moet schuimvorming worden voorkomen.

Vóór de enting:

De bijgeleverde dubbele naald ter ontvetting eerst door een spiritusvlam halen.

De naalden mogen niet blauw worden of gaan gloeien. Vervolgens afkoelen in koud, gekookt water en afslaan. De groeven in beide naalden moeten nu leeg zijn.

De beide naalden in de vaccinoplossing dopen; vervolgens de naalden afstrijken langs de flaconhals om overtollig vaccin te verwijderen.

Deze procedure moet bij iedere vogel worden herhaald!

De enting:

Houd de vogel vast en spreid één van de vleugels met de onderzijde naar boven.

Blaas de veertjes opzij en steek beide entnaalden dóór het vleugelvlies heen.

Veertjes, spieren of gewrichten mogen daarbij niet worden geraakt.

7 dagen na de vaccinatie ontstaat op de plaats van toediening een entpokje. Weer een week later is de vogel een jaar lang beschermd.

Na het enten moeten restanten vaccin, de flacon en de entnaald door uitkoken worden ontsmet en dan pas worden weggegooid. Handen wassen en desinfecteren. Een aangebroken flacon met vaccin mag nooit voor vogels van een andere liefhebber worden gebruikt omdat anders het veldvirus kan worden overgebracht.

Nood-enting:

Als in een niet-gevaccineerde vlucht de ziekte optreedt, kunnen de nog gezond uitziende vogels alsnog worden geënt. Voor vogels die nog geen tekenen van de ziekte vertonen maar al wel zijn besmet, komt de enting echter te laat.

De enting ieder jaar bij alle vogels herhalen, op het moment dat de jongste dieren 4 weken oud zijn, maar uiterlijk medio juli.

Na de 1^e vaccinatie van jonge vogels ontstaat op de plaats van toediening een entpokje ter grootte van een rijstkorrel, het bewijs van een geslaagde enting. Het opkomen van het pokje moet dan ook beslist worden gecontroleerd. Ontbreekt het entpokje bij jonge vogels, dan deze apart zetten en opnieuw enten. Bij herhalingsentingen is het entpokje veel kleiner.

10. WACHTTIJD

Niet van toepassing.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Bewaren in een koelkast (2°C - 8°C). Beschermen tegen licht.

Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP.

Houdbaarheid na reconstitutie volgens instructies: 2 uur.

12. SPECIALE WAARSCHUWING(EN)

Speciale waarschuwingen voor elke diersoort:

Ongevaccineerde vogels mogen nooit bij gevaccineerde vogels worden geplaatst, evenmin als het omgekeerde. Gevaccineerde vogels kunnen namelijk het in de natuur veel voorkomende virulente virus bij zich dragen, zonder tekenen van de ziekte te vertonen.

In elke populatie kan een aantal dieren voorkomen dat geen of een geringe immunologische respons op de vaccinatie vertoont.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:

De eerste week na enting geen badwater verstrekken.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):

Het entpokje zal groter zijn.

13. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET- GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUEELAFVALMATERIAAL

Geneesmiddelen mogen niet verwijderd worden via afvalwater of huishoudelijk afval.

Vraag aan uw dierenarts wat u met overtollige diergeneesmiddelen dient te doen. Deze maatregelen dragen bij aan de bescherming van het milieu.

14. DE DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST IS HERZIEN

Juli 2017

15. OVERIGE INFORMATIE

Verpakking: Glazen type I flacon afgesloten met een rubber stop (chlorobutyl) à 50 doses incl. spuit, entnaald en oplosmiddel.

Op diergeneeskundig voorschrift

BE-V127023