

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/00/1117

**Nobilis CAV P4 liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai vistām**

### **1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI**

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, Nīderlande

### **2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS**

**Nobilis CAV P4** liofilizāts un šķīdinātājs suspensijas injekcijām pagatavošanai vistām

### **3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS**

Viena deva satur:

**Aktīvā viela:**

Dzīvs, novājināts cāļu anēmijas vīruss, celms 26P4:  $\geq 10^{3,0}$  TCID<sub>50</sub>

**Šķīdinātāji:**

Dilavia (intramuskulārai vai subkutānai ievadīšanai) vai Unisolve (intrakutānai ievadīšanai spārna plēvē).

### **4. INDIKĀCIJA(-S)**

Cāļu pasīvai imunizācijai, aktīvi imunizējot vaislas vistas, lai novērstu cāļu anēmijas vīrusa izraisītas klīniskās pazīmes un radītos bojājumus.

Imunitātes iestāšanās vistām: 3-4 nedēļas.

Imunitātes ilgums vistām: 10 nedēļas.

### **5. KONTRINDIKĀCIJAS**

Nav.

### **6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS**

Nav.

Ja novērojat jebkuras blakusparādības, arī tās, kas nav minētas šajā lietošanas instrukcijā, vai arī domājat, ka zāles nav iedarbojušās, lūdzu, informējiet savu veterinārārstu.

### **7. MĒRĶA SUGAS**

Vistas (vaislas vistas no 6 nedēļu vecuma).

## **8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES**

Intramuskulārai, subkutānai vai intrakutānai lietošanai.

Deva: viena vakcīnas deva (0,2 ml) vienam putnam.

*Intramuskulārai vai subkutānai ievadīšanai:*

Izšķīdina vakcīnu šķīdinātājā Dilavia.

Izvēlas šķīdinātāja daudzumu atkarībā no devu skaita flakonā (200 ml uz 1000 devām).

Ievadīt 0,2 ml vakcīnas intramuskulāras vai subkutānas injekcijas veidā.

*Intrakutānai ievadīšanai spārnu plēvē:*

Izšķīdina vakcīnu šķīdinātājā Unisolve.

Izvēlas šķīdinātāja daudzumu atkarībā no devu skaita flakonā (13 ml uz 1000 devām). Pirms katra putna vakcinācijas dubulto adatu iemērkot vakcīnas suspensijā tā, lai abu adatu lūmens būtu pilnībā piepildīts. Ievadīt adatu no apakšas spārna plēvē.

*Vakcinācijas shēma:*

Vienreizēja vakcinācija ar vienu devu katram putnam no 6 nedēļu vecuma, bet ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

## **9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI**

Nav.

## **10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ**

Nulle dienas.

## **11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI**

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.

Derīguma termiņš pēc izšķīdināšanas saskaņā ar lietošanas instrukciju: 4 stundas.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

## **12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI**

Īpaši brīdinājumi katrai dzīvnieku sugai:

Vakcinēt tikai klīniski veselus putnus.

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Nelietot vakcīnu dēšanas periodā. Vakcinēt ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms dēšanas perioda sākuma.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai:

Pēc vakcinācijas mazgāt un dezinficēt rokas un vakcinācijas aprīkojumu.

Dēšanas periods:

Nelietot putniem dēšanas periodā.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Nav pieejama informācija par šīs vakcīnas drošumu un iedarbīgumu, ja to lieto kopā ar citām veterinārajām zālēm. Lēmumu par vakcīnas lietošanu pirms vai pēc citu veterināro zāļu lietošanas pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti):

Pēc desmitkārtīgas pārdozēšanas nevēlamas reakcijas netika novērotas.

Nesaderība:

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm, izņemot šķīdinātāju vai citu komponentu, kas paredzēts lietošanai ar šīm veterinārajām zālēm.

### **13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI**

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumus nedrīkst iznīcināt, izmantojot kanalizāciju vai kopā ar sadzīves atkritumiem.

### **14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA**

09/2020

### **15. CITA INFORMĀCIJA**

Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

Liofilizāts: I tipa hidrolītiskā stikla flakons ar halogēnbutilgumijas aizbāzni un fiksētu alumīnija vāciņu. Iepakojumā 1 flakons ar 500/1000/2500/5000/10000 devām vai 10 flakoni katrs ar 500/1000/2500/5000/10000 devām.

Šķīdinātājs iepakots atsevišķā iepakojumā.

Šķīdinātājs Dilavia: 250 ml II tipa stikla vai PET flakons ar halogēnbutilgumijas aizbāzni un fiksētu alumīnija vāciņu. Šķīdinātāja daudzums: 200 ml.

Šķīdinātājs Unisolve: 20 ml II tipa stikla flakons ar halogēnbutilgumijas aizbāzni un fiksētu alumīnija vāciņu. Šķīdinātāja daudzums: 13 ml. Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.