

## **A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****FALTSCHACHTEL oder KUNSTSTOFF-SCHACHTEL 10 x 1 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Nobivac T Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede Dosis (1 ml) enthält:

Tollwutvirus, inaktiviert, Stamm Pasteur RIV  $\geq 0,95$  AIU\* entsprechend  $\geq 2$  IU**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 x 1 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Pferde, Hunde, Katzen, Frettchen

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären oder subkutanen Injektion.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rind, Pferd: Null Tage

Hund, Katze, Frettchen: Nicht zutreffend

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

Die Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Intervet GesmbH

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z. Nr.: 8-20136

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****KARTON oder SCHACHTEL AUS KUNSTSTOFF 1 x 10 ml, 10 x10 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Nobivac T Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

Jede Dosis (1 ml) enthält:

Tollwutvirus, inaktiviert, Stamm Pasteur RIV  $\geq 0,95$  AIU\* entsprechend  $\geq 2$  IU**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

1 x 10 ml

10 x 10 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rinder, Pferde, Hunde, Katzen, Frettchen

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur intramuskulären oder subkutanen Injektion.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeit:

Rind, Pferd: Null Tage

Hund, Katze, Frettchen: Nicht zutreffend

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern (2 °C – 8 °C).

Die Durchstechflaschen im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS**

Intervet GesmbH

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

Z. Nr.: 8-20136

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**

**Glasflaschen Etikett**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Nobivac T



**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Tollwutvirus, inaktiviert, Stamm Pasteur RIV:  $\geq 2$  IU/ml

1 Dosis

10 Dosen

**3. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**4. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.