

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Boflox 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Marbofloxacino 100 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 x 100 ml

1 x 250 ml

6 x 100 ml

6 x 250 ml

10 x 100 ml

10 x 250 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (cerdas adultas).

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Vía intramuscular (i.m.), subcutánea (s.c.) o intravenosa (i.v.)

Porcino (cerdas adultas): Vía intramuscular (i.m.)

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:

Respiratorio:

- 8 mg/kg en una única inyección (i.m.):

Carne: 3 días.

Leche: 72 horas.

- 2 mg/kg durante 3 ó 5 días (i.v./s.c./i.m.):

Carne: 6 días.
Leche: 36 horas.

Mastitis:

- 2 mg/kg durante 3 días (i.v./i.m./s.c.):
Carne: 6 días.
Leche: 36 horas.

Porcino (cerdas adultas):

Carne: 4 días.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Periodo de validez después de abierto el envase: 28 días.
Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”
--

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Industrial Veterinaria, S.A.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2752 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**ETIQUETA 100 – 250 ml****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Boflox 100 mg/ml solución inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Marbofloxacinó 100 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (cerdas adultas).

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Vía intramuscular (i.m.), subcutánea (s.c.) o intravenosa (i.v.)

Porcino (cerdas adultas): Vía intramuscular (i.m.)

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino:Respiratorio:

- 8 mg/kg en una única inyección (i.m.):
Carne: 3 días.
Leche: 72 horas.
- 2 mg/kg durante 3 ó 5 días (i.v./s.c./i.m.):
Carne: 6 días.
Leche: 36 horas.

Mastitis:

- 2 mg/kg durante 3 días (i.v./i.m./s.c.):
Carne: 6 días.
Leche: 36 horas.

Porcino (cerdas adultas):

Carne: 4 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Periodo de validez después de abierto el envase: 28 días.

Una vez abierto, fecha límite de utilización: ...

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Industrial Veterinaria, S.A.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}