

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Faltschachtel****14. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Recudon 5,0 mg/ml + 0,25 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFFE

| | |
|--------------------------|------------|
| Levomethadonhydrochlorid | 5,0 mg/ml |
| Fenpipamidhydrochlorid | 0,25 mg/ml |

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 ml
10 ml
30 ml
50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd und Hund

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur langsamen intravenösen Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Pferd

Essbare Gewebe: 3 Tage

Milch: Nicht bei Pferden anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Alfasan Nederland B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V661870

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Durchstechflaschen zu 5 ml, 10 ml, 30 ml oder 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Recudon

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Levomethadonhydrochlorid 5,0 mg/ml
Fenpipramidhydrochlorid 0,25 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.