

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/NRP/98/0813

Opticlox eye ointment 167 mg/g acu ziede liellopiem, aitām, zirgiem, suņiem, kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Norbrook Manufacturing Ltd.
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

Norbrook Laboratories Limited
Station Works, Newry
Co. Down, BT35 6JP
Lielbritānija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Opticlox eye ointment 167 mg/g acu ziede liellopiem, aitām, zirgiem, suņiem, kaķiem
Cloxacillin

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Katra 5g šļirce satur:

Aktīvā viela:

Kloksacilīns (kloksacilīna benzatīna veidā) 835 mg.

Viendabīga, sterila ziede oftalmoloģiskai lietošanai.

4. INDIKĀCIJA(-S)

Staphylococcus spp. un *Bacillus* spp. ierosinātu acu infekciju ārstēšanai liellopiem, aitām, zirgiem, suņiem un kaķiem.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav.

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvo vielu vai pret kādu no palīgvielām.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav.

Ja novērojat jebkuras būtiskas blakusparādības vai citu iedarbību, kas nav minēta šajā lietošanas instrukcijā, lūdzu, informējiet par tām savu veterinārārstu.

7. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, aitas, zirgi, suņi, kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Tikai ārīgai lietošanai acīs.

Atvilkt apakšējo acs plakstiņu un apakšējā konjunktīvas maisiņā vienmērīgi iespiest ziedi.

Parasti pietiek ar vienu lietošanas reizi, bet, ja nepieciešams, ārstēšanu var atkārtot pēc 48-72 stundām.

Devas:

Liellopiem, zirgiem: aptuveni 5-10 cm ziedes katrā acī;

Aitām: aptuveni 5 cm ziedes katrā acī;

Suņiem, kaķiem: aptuveni 2 cm ziedes katrā acī.

Gadījumos, ja inficēta ir viena acs, ieteicams ārstēt abas acis, lai novērstu krustenisko infekciju. Lai novērstu infekcijas pārvešanu, ziedi vispirms aplicē veselajā acī. Vienu šļirci izmanto viena dzīvnieka ārstēšanai.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Tikai ārīgai lietošanai acīs.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Liellopiem, aitām un zirgiem: gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Liellopiem, aitām: pienam: nulle stundas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Šļirce jāizmanto tikai vienu reizi. Daļēji izlietotas šļirces ir jāizmet.

Nelietot šīs veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā pēc EXP.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Brīdinājumi lietotājam - jutība pret penicilīniem/cefalosporīniem:

Penicilīni un cefalosporīni pēc injekcijas, ieelpošanas, norīšanas vai saskares ar ādu var izraisīt pastiprinātas jutības reakcijas (alerģiju). Pastiprināta jutība pret penicilīniem var radīt krustenisko reakciju pret cefalosporīniem un otrādi. Pret šīm vielām dažkārt var novērot nopietnas alerģiskas reakcijas.

1. Personām, ar zināmu pastiprinātu jutību pret penicilīniem vajadzētu izvairīties no saskares ar šīm veterinārajām zālēm.
2. Zāles jālieto piesardzīgi, ievērojot visus ieteiktos piesardzības pasākumus.

3. Ja pēc zāļu pielietošanas novērojami tādi simptomi kā ādas izsitumi, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību un uzrādīt lietošanas instrukciju vai iepakojuma marķējumu ārstam. Ja novērojami tādi simptomi kā sejas, lūpu vai acu pietūkums, vai apgrūtināta elpošana, kas ir daudz nopietnāki simptomi, nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Mazgāt rokas pēc šo zāļu lietošanas.

13. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

14. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

05/2019

15. CITA INFORMĀCIJA

Iepakojuma izmēri:

Kartona kaste ar 4 x 5 g šļircēm.

Recepšu veterinārās zāles.