

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla, ki vsebuje vialo po 100 ml ali 500 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

MULTIMIN raztopina za injiciranje za govedo

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

cink: 60 mg (kar ustreza 74,68 mg cinkovega oksida)

mangan: 10 mg (kar ustreza 20,92 mg manganovega karbonata)

baker: 15 mg (kar ustreza 26,09 mg bakrovega karbonata)

selen: 5 mg (kar ustreza 10,95 mg natrijevega selenita)

3. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

500 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Izključno samo za subkutano uporabo. Ne uporabite za intramuskularno dajanje.

Odmerjanje:

Govedo - do 1 leta starosti: 1 ml na 50 kg.

Govedo - od 1 do 2 let starosti: 1 ml na 75 kg.

Govedo - več kot 2 leti starosti: 1 ml na 100 kg.

Največja količina, ki se lahko injicira na enem mestu injiciranja: 7 ml.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 28 dni.

Mleko: Nič ur.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA
--

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh. Uporabite do ...

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Warburton Technology Limited

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

MR/V/0726/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala po 100 ml in 500 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

MULTIMIN raztopina za injiciranje za govedo

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak ml vsebuje:

cink: 60 mg (kar ustreza 74,68 mg cinkovega oksida)

mangan: 10 mg (kar ustreza 20,92 mg manganovega karbonata)

baker: 15 mg (kar ustreza 26,09 mg bakrovega karbonata)

selen: 5 mg (kar ustreza 10,95 mg natrijevega selenita)

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE**4. POTI UPORABE**

Izključno samo za subkutano uporabo. Ne uporabite za intramuskularno dajanje.

Odmerjanje:

Govedo - do 1 leta starosti: 1 ml na 50 kg.

Govedo - od 1 do 2 let starosti: 1 ml na 75 kg.

Govedo - več kot 2 leti starosti: 1 ml na 100 kg.

Največja količina, ki se lahko injicira na enem mestu injiciranja: 7 ml.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 28 dni.

Mleko: Nič ur.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh. Uporabite do ...

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Warburton Technology Limited

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}