

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

{ Schachtel mit 1 Durchstechflasche zu 6, 20, 50, 100 ml und Schachtel mit 10 Durchstechflaschen zu 6 ml. }

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

SYNCROCYL 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Gonadorelin (als Gonaderelinacetat) 50 µg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

6 ml
20 ml
50 ml
100 ml
10 x 6 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind: Kühe und Färsen

5. ANWENDUNGSGBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 0 Tage

Milch: 0 Stunden

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Laboratorios SYVA S.A.

14. ZULASSUNGSNRMMERN

BE-V536240

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

{50 m und 100 ml Durchstechflaschen}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

SYNCROCYL 50 Mikrogramm/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Gonadorelin (als Gonaderelinacetat) 50 µg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rind : Kühe und Färsen

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Essbare Gewebe: 0 Tage.

Milch: 0 Stunden.

6. VERFALLDATUM

Exp {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Laboratorios SYVA S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

{**6 ml und 20 ml** Durchstechflaschen}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

SYNCROCYL

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Gonadorelin (als Gonadorelinacetat) 50 µg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp {MM/JJJJ}>

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis