

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

imidakloprido 100 mg,
permetrino 500 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (E321) 1 mg.

1 pipetėje yra:

Vaisto pavadinimas	Pipetė	Imidaklopridas	Permetrinas	E321
Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims	0,4 ml	40 mg	200 mg	0,4 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims	1,0 ml	100 mg	500 mg	1,0 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims	2,5 ml	250 mg	1250 mg	2,5 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims	4,0 ml	400 mg	2000 mg	4,0 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	6,0 ml	600 mg	3000 mg	6,0 mg

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

Skaidrus gelsvas arba rusvas tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšis (-ys)

Šunys.

Naudoti šuns kūno svorį atitinkančią Advantix užlašinamojo tirpalo pipetę arba jų derinį (žr. 4.9 p.).

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

Blusos žūsta per dieną po gydymo. Vienas gydymas apsaugo nuo užsikrėtimo blusomis keturias savaites.

Vaistas gali būti naudojamas kaip gydymo strategijos dalis blusų sukeltam alerginiam dermatitui (BAD) kontroliuoti tais atvejais, kai liga jau ankščiau buvo diagnozuota veterinarijos gydytojo.

Šunims, užsikrėtusiems plaukagraužiais (*Trichodectes canis*), gydyti.

Vaistas veikia atbaidančiai ir akaricidiškai, todėl apsaugo nuo užsikrėtimo kraujasiurbėmis erkėmis (keturias savaites nuo *Rhipicephalus sanguineus* ir *Ixodes ricinus*, tris savaites nuo *Dermacentor reticulatus*).

Žudančiai ir atbaidančiai veikdamas ligų sukėlėjus pernešančias erkes (vektorius) *Rhipicephalus sanguineus*, vaistas sumažina patogenų *Ehrlichia canis* pernešimo tikimybę ir tuo pačiu sumažina šunų erlichiozės riziką. Rizikos sumažėjimas, prasidedantis nuo 3 dienų po vaisto užlašinimo ir trunkantis iki 4 savaičių, nustatytas tyrimuose.

Ant šuns jau buvusios erkės gali nežūti per 2 dienas po gydymo, o likti prisitvirtinusios ir būti matomos. Siekiant išvengti erkių prisitvirtinimo ir maitinimosi krauju, gydymo metu ant šuns esančias erkes rekomenduojama pašalinti.

Vienas gydymas veikia atbaidančiai (neleidžia maitintis) smėlines muses (*Phlebotomus papatasi* – dvi savaites, *Phlebotomus perniciosus* – tris savaites), nuo uodų (*Aedes aegypti* – dvi savaites, *Culex pipiens* – keturias savaites), piktmites (*Stomoxys calcitrans* – keturias savaites).

Užsikrėtimo *Leishmania infantum* rizikos mažinimas per smėlines muses (*Phlebotomus perniciosus*) iki 3 savaičių. Dėl veterinarinio vaisto efektyvumo prieš vektorių poveikis yra netiesioginis.

4.3. Kontraindikacijos

Nesant duomenų, vaisto negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 1,5 kg (0,4 ml pipečių), 4 kg (1 ml pipečių), 10 kg (2,5 ml pipečių), 25 kg (4 ml pipečių) arba 40 kg (6 ml pipečių).

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti katėms (žr. 4.5 p. „Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės“).

4.4. Specialieji išpėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Naudojant vaistą, viena kita erkė gali prisitvirtinti, uodas ar smėlinė musė gali įgelti.

Dėl šios priežasties šių parazitų pernešamų infekcinių ligų pasireiškimo tikimybė, esant nepalankioms sąlygoms, išlieka.

Rekomenduojama taikyti gydymą mažiausiai 3 dienas prieš numanomą *E. canis* poveikį. Tyrimais su šunimis, užsikrėtusiais *Rhipicephalus sanguineus* erkėmis, kurios buvo užsikrėtusios *E. canis*, nustatytas šunų erlichiozės rizikos sumažėjimas, prasidedantis 3 dienas po vaisto užlašinimo ir trunkantis 4 savaites.

Skubi apsauga nuo smėlinių musių įkandimų nėra dokumentuota. Siekiant sumažinti užsikrėtimo *Leishmania infantum* riziką, perduodamą per smėlines muses *P. perniciosus*, gydyti šunys per pirmąsias 24 valandas po pirminio gydymo turėtų būti laikomi saugioje aplinkoje.

4.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina stengtis, kad pipetės turinys nepatektų į gydomo gyvūno akis ir (ar) burną.

Būtina stengtis, kad vaistas būtų tinkamai naudojamas, kaip nurodyta 4.9 p. Reikia ypatingai saugoti, kad gydyti ar su jais turintys sąlytį gyvūnai nelaižytų užlašinimo vietos.

Negalima naudoti katėms.



Šis vaistas yra ypač nuodingas katėms ir gali būti mirtinas dėl kačių specifinės fiziologijos, nesugebant metabolizuoti tam tikrų junginių. Vienas tokių junginių yra permetrinas. Norint apsaugoti kates nuo vaisto poveikio, gydytą šunį reikia laikyti atskirai nuo katės, kol neišdžius vaisto užlašinimo vieta. Svarbu užtikrinti, kad katės nelaižytų šuns kailio vaisto užlašinimo vietoje. Taip atsitikus, reikia nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Dėl vaisto naudojimo sergantiems ar nusilpusiems šunims reikia pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojančiams vaistą gyvūnams

Būtina vengti, vaisto patekimo ant odos, į akis ar burną.

Naudojimo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nedelsiant plauti muilu ir vandeniu.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas vaisto sudėtinėms dalims, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu.

Labai retais atvejais galintys pasireikšti vyraujantys klinikiniai simptomai yra trumpalaikės juntamosios odos reakcijos, tokios kaip dilgčiojimas, deginimas ar tirpimas. Vaisto atsitiktinai patekus į akis, reikia nedelsiant kruopščiai plauti vandeniu.

Jei odos ar akių sudirginimo simptomai nepraeina, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Negalima praryti. Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Gydyto gyvūno geriau neliesti, ypatingai vaikams, kol neišdžiūvusi vaisto užlašinimo vieta.

Rekomenduojama veterinarinį vaistą naudoti vakare ir neleisti neseniai gydytiems gyvūnams miegoti su šeimininkais, o ypač su vaikais.

Kad pipečių nepasiektų vaikai, iki pat naudojimo jas reikia laikyti originalioje pakuotėje, o sunaudotas nedelsiant išmesti.

Kitos atsargumo priemonės

Veterinarinis vaistas yra pavojingas vandens gyvūnams, todėl 48 val. po naudojimo šunų jokių būdu negalima leisti prie paviršinių vandens telkinių.

Advantix sudėtyje esantis tirpiklis gali dažyti tam tikras medžiagas, pvz., odą, tekstilę, plastiką, apdirbtus paviršius. Prieš galimą šuns kontaktą su tokiomis medžiagomis vaisto užlašinimo vieta turi išdžiūti.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Nedažnai klinikinių tyrimų metu buvo pastebėtas niežėjimas užlašinimo vietoje ir plaukų pasikeitimas (pvz., riebus kailis) ir vėmimas. Retai buvo pranešama apie kitas reakcijas, tokias kaip paraudimą, uždegimą ir plaukų slinkimą užlašinimo vietoje ir viduriavimą.

Labai retais atvejais, pavieniais (farmakologinio budrumo) pranešimais, šunims pasireiškė laikini odos jautrumo požymiai (kasymasis ir trynimasis) ar mieguistumas. Šios reakcijos dažniausiai praeina savaime.

Labai retais atvejais gali pasikeisti šunų elgesys (pasireikšti susijaudinimas, neramumas, inkštimas ar voliojimasis), pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų simptomai (padidėjęs seilėtekis, sumažėjęs apetitas) ir neurologiniai požymiai, tokie kaip nestabilus judėjimas ir trūkčiojimas, šunims, kurie yra jautrūs permetrinui. Šie požymiai paprastai yra trumpalaikiai ir išnyksta savaime.

Jei gydytas gyvūnas nulaižo vaisto užlašinimo vietą, apsinuodijimas yra mažai tikėtinas, bet labai retais atvejais gali pasireikšti. Tokiu atveju galima pastebėti trumpalaikius neurologinius reiškinius, tokius kaip drebulys ir mieguistumas. Taikomas simptominis gydymas. Priešnuodis nežinomas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalanki (-ios) reakcija (-os) pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

4.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nežinoma.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudoti tik ant odos. Lašinti tik ant nepažeistos odos.

Rekomenduojama mažiausia dozė yra 10 mg imidakloprido ir 50 mg permetrino 1 kg kūno svorio.

Advantix užlašinamojo tirpalo dozavimo schema

Šuns svoris	Vaisto pavadinimas	Kiekis (ml)	Imidakloprido dozė (mg/kg)	Permetrino dozė (mg/kg)
≤ 4 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims	0,4	ne mažiau kaip 10	ne mažiau kaip 50
> 4 kg ≤ 10 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims	1,0	10–25	50–125
> 10 kg ≤ 25 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims	2,5	10–25	50–125
> 25 kg ≤ 40 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims	4,0	10–16	50–80

> 40 kg ≤ 60 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	6,0	10–15	50–75
-----------------	--	-----	-------	-------

Šunims, sveriantiems daugiau kaip 60 kg, reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio pipetes.

Norint išvengti pakartotinio užsikrėtimo, rekomenduojama gydyti visus namuose esančius šunis, taip pat atitinkamomis priemonėmis nuo blusų ir jų lervų apdoroti gyvūnus supančią aplinką.


Vaistas išlieka efektyvus net sušlapinus šuns kailį, tačiau dažnai maudant, ypač kai aplinkoje gausu ekto parazitų, gali prireikti papildomų vaisto dozių, bet ne dažniau kaip kartą per savaitę. Vaisto efektyvumui optimizuoti, šunis rekomenduojama maudyti prieš vaisto naudojimą arba po gydymo praėjus ne mažiau kaip 2 savaitėms.

Užsikrėtimo plaukagraužiais atveju, praėjus 30 dienų po gydymo, rekomenduojama veterinarijos gydytojo apžiūra, nes kai kuriems gyvūnams gali prireikti pakartotinio gydymo.

Siekiant apsaugoti šunį visą smėlinių musių sezoną, gydymą atinkamai reikia testuoti visą tą laiką.

Naudojimo metodas

Išimti pipetę iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį dangtelį. Dangtelį apversti ir kitu galu vėl užsukti ant pipetės taip pažeidžiant jos sandarumą.



Šunims iki 10 kg svorio

Ramiai stovinčiam šuniui praskirti plaukus srityje tarp menčių taip, kad pasimatytų oda. Priglausti pipetės galiuką prie odos ir išspausti visą jos turinį tiesiai ant odos.



Šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg

Ramiai stovinčiam šuniui pipetės turinį tolygiai paskirstyti keturiose vietose ant nugaros paviršiaus, srityje nuo pečių iki uodegos pagrindo. Kiekvienoje užlašinimo vietoje praskirti plaukus taip, kad matytųsi oda. Priglaudus pipetės galiuką prie odos, atsargiai išspausti dalį tirpalo ant odos. Negalima užpilti didelio kiekio tirpalo vienoje vietoje, nes tirpalas gali nuvarvėti šuniui per šonus.



4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Naudojus 5 kartus didesnes nei rekomenduojama dozes sveikiems šuniukams ir suaugusiems šunims bei šuniukams, kurių motinos buvo gydytos 3 kartus didesnėmis dozėmis, nepalankių reiškinių nepastebėta.

4.11. Išlauka

Netaikytina.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos išoriniam naudojimui, įskaitant insekticidus.
ATCvet kodas: QP53AC54.

ADVANTIX užlašinamajame tirpale yra dvi veikliosios medžiagos – imidaklopridas ir permetrinas. Vaistas veikia kaip insekticidas, akaricidas ir repelentas.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Imidaklopridas – ektoparazitocidinė medžiaga, priklausanti chloro nikotino junginių grupei, veikianti tiek suaugusias blusas, tiek jų lervas. Be naikinamojo poveikio suaugusioms blusoms, imidaklopridas taip pat naikina gydyto gyvūno aplinkoje esančias blusų lervas. Aplinkoje esančios blusų lervos žūsta po sąlyčio su gydyto gyvūnu. Imidaklopridas pasižymi dideliu afinitetu blusų centrinės nervų sistemos (CNS) posinapsinės srities nikotinerginiams acetilcholino receptoriams. Dėl cholinerginio nervinių impulsų perdavimo slopinimo sukeliamas vabzdžių paralyžius ir žūtis. **Permetrinas** yra I tipo sintetinis piretroidas – insekticidinė ir akaricidinė medžiaga, taip pat veikianti ir atbaidančiai. Piretroidai veikia stuburinių ir nestuburinių gyvūnų įtampos valdomus natrio jonų kanalus. Piretroidai yra vadinamieji „atvirų kanalų blokatoriai“, kurie natrio kanalus veikia slopindami ir aktyvinimą, ir inaktyvinimą, todėl pasireiškia per didelis jaudrumas ir parazitas žūsta. Nustatyta, kad naudojant abiejų medžiagų derinį, imidaklopridas veikia kaip artropodų ganglijų aktyvintojas ir todėl didina permetrino veiksmingumą.

Vaistas veikia atbaidančiai (neleidžia maitintis) erkes, smėlines muses ir uodus, taip neleidžiamas parazitams pasimaitinti krauju ir tokiu būdu sumažindamas šunų vektorinės kilmės ligų (pvz., boreliozės, riketsiozės, ehrlichiozės, leišmaniozės) pernešimo riziką. Tačiau gali būti pavienių įsisiurbusių erkių ar pavienių smėlinių musių ar uodų įkandimų. Dėl šios priežasties, esant nepalankioms sąlygoms, negalima atmesti šių parazitų pernešamų infekcinių ligų pasireiškimo tikimybės. Vaistas veikia atbaidančiai (neleidžia maitintis) smėlines muses, taip užkirsdamas kelią musių sukeltam dermatitui.

Veterinarinis vaistas veikia atbaidančiai (neleidžia maitintis) prieš *Phlebotomus perniciosus* (> 80% iki 3 savaičių), uodus ir erkes. Endeminių vietovių lauko duomenys parodė, kad veterinarinis vaistas iki 3 savaičių netiesiogiai sumažina *Leishmania infantum* perdavimo riziką nuo užkrėstų smėlinių musių (*Phlebotomus perniciosus*), tokiu būdu mažėja šunų leišmaniozės rizika gydomiems šunims.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Vaistas skirtas išoriniam naudojimui ant odos, užlašintas greitai pasiskirsto gyvūno kūno paviršiuje. Abi veikliosios medžiagos išlieka efektyvios ant plaukų ir odos 4 savaites.

Odos tyrimais su žiurkėmis ir šunimis, taip pat perdozavimo ir serumo kinetinėmis tyrimais nustatyta, kad veikliųjų medžiagų sisteminė absorbcija yra menka, laikina ir klinikiniam efektyvumui įtakos neturi.

Savybės aplinkoje

Veterinarinis vaistas negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens gyvūnams. Dėl gydytų šunų žr. 4.5 p.

Permetrinas toksiškas bitėms.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Butilhidroksitoluenas (E321),
N-metilpirolidonas,
trigliceridai,
vidutinės grandinės,
citrinų rūgštis (E330; pH sureguliuoti).

6.2. Pagrindiniai nesuderinamumai

Nežinoma.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalaus aliuminio folijos maišelio:

0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml pipetė – 5 metai, 6 ml pipetė – 3 metai.

Tinkamumo laikas, pažeidus originalų aliuminio folijos maišelį:

0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml pipetė – 24 mėn., 6 ml pipetė – 12 mėn.

Pažeidus originalų folijos maišelį, visas 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml ar 4,0 ml pipetės būtina sunaudoti per 24 mėn., o 6 ml pipetės – per 12 mėn. arba iki tinkamumo laiko, nepažeidus originalaus aliuminio folijos maišelio, pabaigos, jei jis trumpesnis.

Atidarius pirminę pakuotę, veterinarinį vaistą būtina sunaudoti nedelsiant.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Negalima sušaldyti.

Atidarius folijos maišelį, laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Pipetės tūris: 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml, 6,0 ml.

Pipetė: balta polipropileninė pipetė;
baltas polipropileninis dangtelis.

Antrinė pakuotė: polichlorotrifluoroetileno PCTFE-PVC (0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml) arba polichlorotrifluoroetileno PCTFE-PVC ar PVC (6,0 ml) karščiu užlydytos lizdinės plokštelės, aliuminio folijos maišeliai, kartoninės dėžutės.

Pakuotės dydžiai: pakuotės po 1, 2, 3, 4 ir 6 pipetės.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6. Specialiosios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Panaudojus būtina užsukti dangtelį ant pipetės.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Advantix negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

6. REGISTRUOTOJAS

Bayer Animal Health GmbH,
51368 Leverkusen
Vokietija

8. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/04/1608/001-025

9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2004-02-03
Perregistravimo data 2009-02-13

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2021-11-04

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ (1 IR 4 PIPETĖMS)

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas >4 –10 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10 –25 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25 –40 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40 –60 kg svorio šunims
Imidaclopridum/Permethrinum

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)

0,4 ml pipetėje yra:
veikliųjų medžiagų:
40 mg imidakloprido, 200 mg permetrino.
1,0 ml pipetėje yra:
veikliųjų medžiagų: 100 mg imidakloprido, 500 mg permetrino.
2,5 ml pipetėje yra:
veikliųjų medžiagų: 250 mg imidakloprido, 1250 mg permetrino.
4,0 ml pipetėje yra:
veikliųjų medžiagų: 400 mg imidakloprido, 2000 mg permetrino.
6,0 ml pipetėje yra:
veikliųjų medžiagų: 600 mg imidakloprido, 3000 mg permetrino.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 pipetė (1 x 0,4 ml, 1 x 1,0 ml, 1 x 2,5 ml, 1 x 4,0ml, 1 x 6,0 ml)
2 pipetės (2 x 0,4 ml, 2 x 1,0 ml, 2 x 2,5 ml, 2 x 4,0 ml, 2 x 6,0 ml)
3 pipetės (3 x 0,4 ml, 3 x 1,0 ml, 3 x 2,5 ml, 3 x 4,0 ml, 3 x 6,0 ml)
4 pipetės (4 x 0,4 ml, 4 x 1,0 ml, 4 x 2,5 ml, 4 x 4,0 ml, 4 x 6,0 ml)
6 pipetės (6 x 0,4 ml, 6 x 1,0 ml, 6 x 2,5 ml, 6 x 4,0 ml, 6 x 6,0 ml)

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys

6. INDIKACIJA (-OS)

[Kartoninės dėžutės priekinė dalis]

- Naikina erkes, blusas ir plaukagraužius.
- Atbaido erkes, uodus, smėlines muses ir piktuses.
- Sumažina šunų leišmaniozės ir erlichiozės perdavimo riziką

[Kartoninės dėžutės nugarėlė]

- Naikina blusas (gydymui ir profilaktikai); gali būti naudojamas kaip blusų sukkelto alerginio dermatito (BAD) gydymo strategijos dalis.
- Naikina plaukagraužius.
- Naikina ir atbaido erkes; sumažina užsikrėtimo ektoparazitų pernešamomis ligomis (borelioze, riketsioze, erlichioze) riziką.
- Atbaido uodus ir smėlines muses; sumažina užsikrėtimo leišmanioze riziką.
- Atbaido piktuses; apsaugo nuo įkandimų sukkelto dermatito.

7. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS

Tik išoriniam naudojimui.

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Folijos maišelį su lizdinėmis plokštelėmis laikyti kartoninėje dėžutėje.



8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojant būtina perskaityti informacinį lapelį.

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 1,5 kg.

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 4 kg.

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 10 kg.

Negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 25 kg. Negalima

naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 40 kg **Negalima naudoti katėms.**



10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki/EXP

Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. *[0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml ir 4,0 ml pipetėms]*

Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 12 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. *[6,0 ml pipetėms]*

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Negalima sušaldyti.

Atidarius folijos maišelį, laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

12. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Naikinimas: skaityti informacinį lapelį.

13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, JEI TAIKYTINA

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas:

Bayer Animal Health GmbH,
51368 Leverkusen
Vokietija

Gamintojas:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel
Vokietija

16. REGISTRUOTOJO NUMERIS (-IAI)

LT/2/04/1608/001, LT/2/04/1608/002, LT/2/04/1608/003, LT/2/04/1608/004,
LT/2/04/1608/005,

LT/2/04/1608/006, LT/2/04/1608/007, LT/2/04/1608/008, LT/2/04/1608/009, LT/2/04/1608/010,
LT/2/04/1608/011, LT/2/04/1608/012, LT/2/04/1608/013, LT/2/04/1608/014, LT/2/04/1608/015,
LT/2/04/1608/016, LT/2/04/1608/017, LT/2/04/1608/018, LT/2/04/1608/019, LT/2/04/1608/020,
LT/2/04/1608/021, LT/2/04/1608/022, LT/2/04/1608/023, LT/2/04/1608/024, LT/2/04/1608/025.

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Serija/Lot



Erkė



Blusa



Uodas



Smėlinė musė



Piktmusė



Plaukagraužis



Leišmanija

Kita informacija:

- Išlieka veiksmingas šuniui sušlapus
- Veikia blusų lervas gydytų gyvūnų aplinkoje
- Galima naudoti vaikingoms patelėms ir laktacijos metu

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ

PIPETĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

100 mg/ml *imidaclopridum*

500 mg/ml *permethrinum*

3. KIEKIS (SVORIS, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,4 ml

1,0 ml

2,5 ml

4,0 ml

6,0 ml

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

5. IŠLAUKA

6. SERIJOS NUMERIS

Lot

7. TINKAMUMO DATA

EXP

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“



≤ 4 kg



> 4 kg ≤ 10 kg



> 10 kg ≤ 25 kg



> 25 kg ≤ 40 kg



> 40 kg ≤ 60 kg



MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR JUOSTELIŲ

LIZDINĖ PLOKŠTELĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS



3. TINKAMUMO DATA

4. SERIJOS NUMERIS

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“



≤ 4 kg
0,4 ml



> 4 kg ≤ 10 kg
1,0 ml



> 10 kg ≤ 25 kg
2,5 ml



> 25 kg ≤ 40 kg
4,0 ml



> 40 kg ≤ 60 kg
6,0 ml



**MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ AR
JUOSTELIŲ
FOLIJOS MAIŠELIS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix

2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS



3. TINKAMUMO DATA

EXP

4. SERIJOS NUMERIS

Lot

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“



**≤ 4 kg
0,4 ml**



**> 4 kg ≤ 10 kg
1,0 ml**



**> 10 kg ≤ 25 kg
2,5 ml**



**> 25 kg ≤ 40 kg
4,0 ml**



**> 40 kg ≤ 60 kg
6,0 ml**



Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. [0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml]

Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 12 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis. *[6 ml]*

INFORMACINIS LAPELIS

Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims

1. REGISTRUOTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Registruotojas

Bayer Animal Health GmbH,
51368 Leverkusen
Vokietija

Gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH
Projensdorfer Str. 324
24106 Kiel
Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims
Advantix užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims
Imidaklopridas, permetrinas

3. VEIKLIOJI (-IOSIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

1 ml tirpalo yra:

veikliųjų medžiagų:

imidakloprido 100 mg,
permetrino 500 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (E321) 1 mg.

1 pipetėje yra:

Vaisto pavadinimas	Pipetė	Imidaklopridas	Permetrinas	(E321)
Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims	0,4 ml	40 mg	200 mg	0,4 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims	1,0 ml	100 mg	500 mg	1,0 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims	2,5 ml	250 mg	1250 mg	2,5 mg

Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims	4,0 ml	400 mg	2000 mg	4,0 mg
Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	6,0 ml	600 mg	3000 mg	6,0 mg

Šunims, sveriantiems daugiau kaip 60 kg, reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio pipetes.

Skaidrus gelsvas arba rusvas tirpalas.

4. INDIKACIJOS

Šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides canis*, *Ctenocephalides felis*), gydyti ir užsikrėtimo profilaktikai.

Blusos žūsta per dieną po gydymo. Vienas gydymas apsaugo nuo užsikrėtimo blusomis keturias savaites.

Vaistas gali būti naudojamas kaip gydymo strategijos dalis blusų sukeltam alerginiam dermatitui (BAD) kontroliuoti tais atvejais, kai liga jau ankščiau buvo diagnozuota veterinarijos gydytojo.

Šunims, užsikrėtusiems plaukagraužiais (*Trichodectes canis*), gydyti.

Vaistas veikia atbaidančiai ir akaricidiškai, todėl apsaugo nuo užsikrėtimo kraujasiurbėmis erkėmis (keturias savaites nuo *Rhipicephalus sanguineus* ir *Ixodes ricinus*, ir tris savaites nuo *Dermacentor reticulatus*).

Žudančiai ir atbaidančiai veikdamas ligų sukėlėjus pernešančias erkes (vektorius) *Rhipicephalus sanguineus*, vaistas sumažina patogenų *Ehrlichia canis* pernešimo tikimybę ir tuo pačiu sumažina šunų erlichiozės riziką. Rizikos sumažėjimas, prasidedantis nuo 3 dienų po vaisto užlašinimo ir trunkantis iki 4 savaičių, nustatytas tyrimuose.

Ant šuns jau buvusios erkės gali nežūti per 2 dienas po gydymo, o likti prisitvirtinusios ir būti matomos. Siekiant išvengti erkių prisitvirtinimo ir maitinimosi krauju, gydymo metu ant šuns esančias erkes rekomenduojama pašalinti.

Vienas gydymas veikia atbaidančiai (neleidžia maitintis) smėlines muses (*Phlebotomus papatasi* – dvi savaites, *Phlebotomus perniciosus* – tris savaites), nuo uodų (*Aedes aegypti* – dvi savaites, *Culex pipiens* – keturias savaites), piktmites (*Stomoxys calcitrans* – keturias savaites).

Užsikrėtimo *Leishmania infantum* rizikos mažinimas per smėlines muses (*Phlebotomus perniciosus*) iki 3 savaičių. Dėl veterinarinio vaisto efektyvumo prieš vektorių poveikis yra netiesioginis.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Nesant duomenų, vaisto negalima naudoti šuniukams iki 7 savaičių amžiaus ir sveriantiems mažiau nei 1,5 kg (0,4 ml pipetė), 4 kg (1 ml pipetė), 10 kg (2,5 ml pipetė), 25 kg (4 ml pipetė) arba 40 kg (6 ml pipetė).

Negalima naudoti, esant padidėjusiam jautrumui veikliajai medžiagai ar bet kuriai iš pagalbinių medžiagų.

Negalima naudoti katėms (žr. skyrių „Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės“).

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Nedažnai klinikinių tyrimų metu buvo pastebėtas niežėjimas užlašinimo vietoje ir plaukų pasikeitimas (pvz., riebus kailis) ir vėmimas. Retai buvo pranešama apie kitas reakcijas, tokias kaip paraudimą, uždegimą ir plaukų slinkimą užlašinimo vietoje ir viduriavimą.

Labai retais atvejais, pavieniais (farmakologinio budrumo) pranešimais, šunims pasireiškė laikini odos jautrumo požymiai (kasymasis ir trynimasis) ar mieguistumas. Šios reakcijos dažniausiai praeina savaime.

Labai retais atvejais gali pasikeisti šunų elgesys (pasireikšti susijaudinimas, neramumas, inkštimas ar voliojimas), pasireikšti virškinimo trakto sutrikimų simptomai (padidėjęs seilėtekis, sumažėjęs apetitas) ir neurologiniai požymiai, tokie kaip nestabilus judėjimas ir trūkčiojimas, šunims, kurie yra jautrūs permetrinui. Šie požymiai paprastai yra trumpalaikiai ir išnyksta savaime.

Jei gydytas gyvūnas nulaišo vaisto užlašinimo vietą, apsinuodijimas yra mažai tikėtinas, bet labai retais atvejais gali pasireikšti. Tokiu atveju galima pastebėti trumpalaikius neurologinius reiškinius, tokius kaip drebulys ir mieguistumas. Taikomas simptominis gydymas. Priešnuodis nežinomas.

Nepalankių reakcijų dažnumas nustatytas vadovaujantis tokia konvencija:

- labai dažna (nepalankios reakcijos pasireiškė daugiau nei 1 iš 10 gydytų gyvūnų),
- dažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 100 gydytų gyvūnų),
- nedažna (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 1 000 gydytų gyvūnų),
- reta (daugiau nei 1, bet mažiau nei 10 iš 10 000 gydytų gyvūnų),
- labai reta (mažiau nei 1 iš 10 000 gydytų gyvūnų, skaičiuojant ir atskirus pranešimus).

Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame informaciniame lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Rekomenduojama mažiausia dozė yra 10 mg imidakloprido ir 50 mg permetrino 1 kg kūno svorio.

Dozavimo schema

Šuns svoris	Vaisto pavadinimas	Kiekis (ml)	Imidakloprido dozė (mg/kg)	Permetrino dozė (mg/kg)
≤ 4 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas ≤ 4 kg svorio šunims	0,4	ne mažiau kaip 10	ne mažiau kaip 50
> 4 kg ≤ 10 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 4–10 kg svorio šunims	1,0	10–25	50–125
> 10 kg ≤ 25 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10–25 kg svorio šunims	2,5	10–25	50–125
> 25 kg ≤ 40 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25–40 kg svorio šunims	4,0	10–16	50–80
> 40 kg ≤ 60 kg	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	6,0	10–15	50–75

Šunims, sveriantiems daugiau kaip 60 kg, reikia naudoti kelias atitinkamo tūrio pipetės.

Norint išvengti pakartotinio užsikrėtimo, rekomenduojama gydyti visus namuose esančius šunis, taip pat atitinkamomis priemonėmis nuo blusų ir jų lervų apdoroti gyvūnus supančią aplinką.


Vaistas išlieka efektyvus net sušlapinus šuns kailį, tačiau dažnai maudant, ypač kai aplinkoje gausu ektoparazitų, gali prireikti papildomų vaisto dozių, bet ne dažniau kaip kartą per savaitę. Vaisto efektyvumui optimizuoti, šunis rekomenduojama maudyti prieš vaisto naudojimą arba po gydymo praėjus ne mažiau kaip 2 savaitėms.

Užsikrėtimo plaukagraužiais atveju, praėjus 30 dienų po gydymo, rekomenduojama veterinarijos gydytoja apžiūra, nes kai kuriems gyvūnams gali prireikti pakartotinio gydymo.

Siekiant apsaugoti šunį visą smėlinių musių sezoną, gydymą atinkamai reikia testuoti visą tą laiką.

Naudojimo metodas

Išimti pipetę iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį dangtelį. Dangtelį apversti ir kitu galu vėl užsukti ant pipetės taip pažeidžiant jos sandarumą.



Šunims iki 10 kg svorio

Ramiai stovinčiam šuniui praskirti plaukus srityje tarp menčių taip, kad pasimatytų oda. Priglausti pipetės galiuką prie odos ir išspausti visą jos turinį tiesiai ant odos.



Šunims, sveriantiems daugiau kaip 10 kg

Ramiai stovinčiam šuniui pipetės turinį tolygiai paskirstyti keturiose vietose ant nugaros paviršiaus, srityje nuo pečių iki uodegos pagrindo. Kiekvienoje užlašinimo vietoje praskirti plaukus taip, kad matytųsi oda. Priglaudus pipetės galiuką prie odos, atsargiai išspausti dalį tirpalo ant odos. Negalima užpilti didelio kiekio tirpalo vienoje vietoje, nes tirpalas gali nuvarvėti šuniui per šonus.



9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Tik išoriniam naudojimui.

Lašinti tik ant nepažeistos odos.

Negalima naudoti didelio kiekio tirpalo vienoje vietoje, kad tirpalas nenuvarvėtų šuniui per šonus.

10. IŠLAUKA

Netaikytina.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Negalima sušaldyti.

Atidarius folijos maišelį, laikyti sausoje vietoje, ne aukštesnėje kaip 30 °C temperatūroje.

Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 24 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis (0,4 ml, 1 ml, 2,5 ml ir 4 ml pipetėms).

Pažeidus originalų folijos maišelį, būtina sunaudoti per 12 mėn. arba iki nurodyto tinkamumo laiko pabaigos (EXP), jei jis trumpesnis (6 ml pipetėms).

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant pipetės, folijos maišelio ar dėžutės po „EXP“. Vaistas tinkamas naudoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

12. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Specialieji įspėjimai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Naudojant vaistą, viena kita erkė gali prisitvirtinti, uodas ar smėlinė musė gali įgelti.

Dėl šios priežasties šių parazitų pernešamų infekcinių ligų pasireiškimo tikimybė, esant nepalankioms sąlygoms, išlieka. Tačiau veterinarinis vaistas pasižymi erkes, smėlines blusas ir uodus atbaidančiu poveikiu (neleidžia maitintis), taip neleiddamas parazitams pasimaitinti krauju ir tokiu būdu sumažindamas šunų vektorinės kilmės ligų (pvz., boreliozės, riketsiozės, ehrlichiozės, leishmaniozės) pernešimo riziką.

Rekomenduojama taikyti gydymą mažiausiai 3 dienas prieš numanomą *E. canis* poveikį. Tyrimais su šunimis, užsikrėtusiais *Rhipicephalus sanguineus* erkėmis, kurios buvo užsikrėtusios *E. canis*, nustatytas šunų erlichiozės rizikos sumažėjimas, prasidedantis 3 dienas po vaisto užlašinimo ir trunkantis 4 savaites.

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina stengtis, kad pipetės turinys nepatektų į gydomo gyvūno akis ir (ar) burną.

Būtina stengtis, kad vaistas būtų tinkamai naudojamas, kaip nurodyta skyriuje „Naudojimo būdas ir metodas“. Reikia ypatingai saugoti, kad gydyti ar su jais turintys sąlytį gyvūnai nelaižytų užlašinimo vietos.

Negalima naudoti katėms.



Šis vaistas yra ypač nuodingas katėms ir gali būti mirtinas dėl kačių specifinės fiziologijos, nesugebant metabolizuoti tam tikrų junginių. Vienas tokių junginių yra permetrinas. Norint apsaugoti kates nuo vaisto poveikio, gydytą šunį reikia laikyti atskirai nuo katės, kol neišdžius vaisto užlašinimo vieta. Svarbu užtikrinti, kad katės nelaižytų šuns kailio vaisto užlašinimo vietoje. Taip atsitikus, reikia nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Dėl vaisto naudojimo sergantiems ar nusilpusiems šunims reikia pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams Būtina

vengti vaisto patekimo ant odos, į akis ar burną.

Naudojimo metu negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus ant odos, reikia nedelsiant plauti muilu ir vandeniu.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas vaisto sudėtinėms dalims, turi vengti sąlyčio su veterinariniu vaistu

Labai retais atvejais galintys pasireikšti vyraujantys klinikiniai simptomai yra trumpalaikės juntamosios odos reakcijos, tokios kaip dilgčiojimas, deginimas ar tirpimas. Vaisto atsitiktinai patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniu.

Jei odos ar akių sudirginimo simptomai nepraeina, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją bei parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Negalima praryti. Atsitiktinai prarijus, reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šio vaisto informacinį lapelį ar etiketę.

Gydyto gyvūno geriau neliesti, ypač vaikams, kol neišdžiūvusi vaisto užlašinimo vieta.

Rekomenduojama veterinarinį vaistą naudoti vakare ir neleisti neseniai gydytiems gyvūnams miegoti su šeimininkais, o ypač su vaikais.

Kad pipėčių nepasiektų vaikai, iki pat naudojimo jas reikia laikyti originalioje pakuotėje, o panaudojus nedelsiant išmesti.

Kitos atsargumo priemonės

Veterinarinis vaistas yra pavojingas vandens gyvūnams, todėl 48 val. po naudojimo šunų jokių būdu negalima leisti prie paviršinių vandens telkinių.

Advantix sudėtyje esantis tirpiklis gali dažyti tam tikras medžiagas, pvz., odą, tekstilę, plastiką, apdirbtus paviršius. Prieš galimą šuns kontaktą su tokiomis medžiagomis vaisto užlašinimo vieta turi išdžiūti.

Vaikingumas ir laktacija

Galima naudoti vaikingumo ir laktacijos metu.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos Nežinoma.

Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Naudojus 5 kartus didesnes nei rekomenduojama dozes sveikiems šuniukams ir suaugusiems šunims bei šuniukams, kurių motinos buvo gydytos 3 kartus didesnėmis dozėmis, nepalankių reiškinių nepastebėta.

Nesuderinamumai Nežinoma.

13. SPECIALIOSIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Panaudojus būtina užsukti dangtelį ant pipetės.

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Advantix negali patekti į vandens telkinius, nes gali būti pavojingas žuvims ir kitiems vandens organizmams.

Veterinarijos gydytojas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais. Tai turėtų padėti saugoti aplinką.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIO PATVIRTINIMO DATA

2021-11-04

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.

Advantix, užlašinamasis tirpalas yra ektoparazitocidas, kurio sudėtyje yra imidakloprido ir permetrino.

Vaistas veikia kaip insekticidas, akaricidas ir repelentas.

Imidaklopridas veikia suaugusias blusas ir blusų lervas. Be naikinamojo poveikio suaugusioms blusoms, imidaklopridas taip pat naikina gydyto gyvūno aplinkoje esančias blusų lervas. Aplinkoje esančios blusų lervos žūsta po sąlyčio su gydytu gyvūnu.

Pakuotė: pipetės po 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml, 4,0 ml ir 6,0 ml; pakuotės po 1, 2, 3, 4 ir 6 pipetes.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.