

## PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO

ARPALIT Neo 7M 1256 mg/171 mg medikovaný obojek pro psy  
Cypermethrinum, pyriproxifenum

### 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

#### **AVEFLOR, a.s.**

Budčeves 26

507 32 Kopidlno

Česká Republika

tel.: +420 493 551 111

fax: +420 493 551 112

[aveflor@aveflor.cz](mailto:aveflor@aveflor.cz)

### 2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

ARPALIT Neo 7M 1256 mg/171 mg medikovaný obojek pro psy  
Cypermethrinum, pyriproxifenum

### 3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

Každý obojek (66 cm) obsahuje:

#### **Léčivé látky:**

Cypermethrinum 1256 mg

Pyriproxifenum 171 mg

Šedý, hnědý nebo černý obojek

### 4. INDIKACE

Antiparazitární obojek proti blechám (*Ctenocephalides felis*), klíšťatům (*Ixodes ricinus*), vším (*Linognathus setosus*), všenkám (*Trichodectes canis*), mouchám (*Musca domestica*), původcům svrabu (*Notoedres cati*, *Sarcoptes canis*).

Působí na dospělé i vývojová stádia blech. Má repeletní účinek na klíšťata.

### 5. KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u kojících fen.

Nepoužívat u štěňat mladších 8 týdnů!

Nepoužívat u zvířat nemocných či v rekonvalescenci.

Nepoužívat v případech přecitlivělosti na léčivé látky nebo na některou z pomocných látek.

Nepoužívat u koček.

## **6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Při nedodržení způsobu použití může výjimečně dojít k přechodnému podráždění v místě aplikace.

Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivý přípravek není účinný, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.

## **7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Psi.

## **8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ**

Použití na kůži. Pouze pro vnější použití.

Obojek se nasadí zvířeti na krk, přebytečný kus obojku se odstříhne a neškodně zlikviduje. Obojek má účinnost proti zevním ektoparazitům po vyjmutí z obalu po dobu 6 měsíců. Účinné látky se postupně uvolňují z obojku do srsti a kůže zvířete. Účinek nastupuje během několika dní po nasazení obojku zvířeti na krk. Zvlhnutí ani namočení obojku nezkracuje dobu účinku.

## **9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ**

Průběžně kontrolujte stav a usazení obojku na krku zvířete, a zda je obojek na krku zvířete dostatečně volný, aby ho neškrtl, ale přitom se dotýkal kůže.

## **10. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)**

Není určeno pro potravinová zvířata.

## **11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte v suchu.

Nepoužívejte tento veterinární léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu po EXP. Doba použitelnosti končí posledním dnem v uvedeném měsíci.

## **12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Zvláštní upozornění pro každý cílový druh

Zvažte použití přípravku u zvířat, u kterých bylo při předchozí aplikaci pozorováno přechodné podráždění kůže.

Protože parazitující hmyz se stává po určité době vůči účinným látkám rezistentní (odolný), doporučujeme po skončení účinné doby obojku nahradit je obojkem s jinou účinnou látkou.

Zvláštní opatření pro použití u zvířat

Zabraňte zvířeti obojek žvýkat!

Nepoužívat u koček. (piktogram – přeškrtnutá kočka)

Přípravek je extrémně jedovatý pro kočky. Přípravek může být pro kočky nebezpečný i po kontaktu s ošetřeným psem.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům:  
Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Nedovolte dětem hrát si s obojkem.  
V případě kontaktu s pokožkou či sliznicemi opláchněte exponovanou část ihned velkým množstvím vody.

Lidé se známou přecitlivělostí na cypermethrin nebo pyriproxifen by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě podráždění kůže a /nebo podráždění očí vyhledejte lékařskou pomoc.

Psi s tímto obojkem by neměli mít dovoleno spát v kontaktu s lidmi, zejména dětmi.

Po manipulaci s obojkem si důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.

#### Další opatření:

Přípravek může mít nežádoucí účinky na vodní organismy. Psům s nasazeným obojkem by nemělo být dovoleno plavat ve vodních tocích.

#### Laktace

Nepoužívat u kojících fen.

#### Interakce s dalšími léčivými přípravky a další formy interakce

Přípravek nepoužívejte v kombinaci s jinými ektoparazitiky.

#### Předávkování

Údaje nejsou k dispozici.

#### Inkompatibility:

Nejsou známy.

### **13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechny nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Přípravek nesmí kontaminovat vodní toky, protože může být nebezpečný pro ryby a další vodní organismy.

### **14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE**

Září 2019

### **15. DALŠÍ INFORMACE**

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván bez předpisu.

Vyhrazený veterinární léčivý přípravek.

Velikost balení: 1 obojek

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

**Česká republika**

AVEFLOR, a.s.

Budčeves 26

507 32 Kopidlno

Česká Republika

tel.: +420 493 551 111

fax: +420 493 551 112

[aveflor@aveflor.cz](mailto:aveflor@aveflor.cz)