

**PŘÍBALOVÁ INFORMACE = OZNAČENÍ NA OBALU**  
BIOPIROX 10 mg/ml kožní sprej, roztok

**1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE**

BIOVETA, a.s., Komenského 212, 683 23 Ivanovice na Hané

**2. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

BIOPIROX 10 mg/ml kožní sprej, roztok

Piroctonum olaminum

**3. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

Biopirox je čirý až mírně opaleskujícího kožní sprej, roztok, který obsahuje v 1 ml:

**Léčivá látka**

Piroctonum olaminum                      10 mg

**4. INDIKACE**

Léčba mykotických onemocnění kůže vyvolaných dermatofytickými houbami u psů, koček, kožešinových a drobných zvířat.

**5. KONTRAINDIKACE**

Není známa

**6. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Možnost vzniku alergických reakcí u zvláště citlivých jedinců. 10-ti násobně zvýšená dávka přípravku způsobuje lokální reakci, vznik erytémů a vypadávání srsti v místě aplikace. Ústup změn nastává po 5 - 7 dnech – erytém ustoupí, pokožka je hladká a začíná se obnovovat srst.

Ošetřené zvíře nereaguje po aplikaci přípravku celkovou reakcí.

**7. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

Psi, kočky, nepotravinová kožešinová a drobná nepotravinová zvířata.

**8. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA A ZPŮSOB PODÁNÍ**

Přípravek se rozprašuje ze vzdálenosti 10 - 20 cm na postižená místa min. 4 krát ve 2 - 4 denních intervalech až do vymizení klinických příznaků.

Způsob podání - kožní podání, rozprašováním.

**9. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ**

Nejvyšší denní dávka a nejvyšší dávka pro celou léčbu:

přípravek se doporučuje aplikovat opakovaně nejdříve za 2 - 4 dny a na maximálně jednu čtvrtinu plochy těla.

**10. OCHRANNÁ LHŮTA**

Není určeno pro potravinová zvířata

**11. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

## **12. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ**

Zabraňte kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. V případě zasažení pokožky či sliznice opláchněte exponovanou část ihned po expozici velkým množstvím vody a odstraňte kontaminovaný oděv, který je v přímém kontaktu s pokožkou. Pokud dojde k zasažení očí, vypláchněte je velkým množstvím pitné vody. V případě podráždění vyhledejte lékařskou pomoc

Je třeba se vyvarovat vdechování přípravku. Při opakované aplikaci (např. v chovných zařízeních, útulcích) se doporučuje použít osobní ochranné prostředky zahrnující neoprenové rukavice.

Pokud dojde k náhodnému požití přípravku, vypijte velké množství pitné vody a vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu ošetřujícímu lékaři.

V průběhu aplikace nekouřit, nejíst a nepít.

Nejsou známy interakce s jinými léčivými. Obecně se nedoporučuje současně s antimykotickou léčbou zahajovat aktivní imunizaci proti mykózám.

Princip aktivní imunizace spočívá v injekčním podání živých oslabených kmenů původce mykózy nebo inaktivovaných kmenů a případná současná aplikace BIOPIROXU sprej může oslabit imunitní odezvu na vakcinaci.

## **13. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechny nepoužité veterinární léčivé přípravky nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

## **14. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE**

Květen 2010

## **15. DALŠÍ INFORMACE**

**Velikost balení:** 100 ml (450 ml)

**Exp.:** {měsíc/rok}

**Šarže:** {číslo}

Reg.číslo: